

Missouri
vol 2

De' Fetti: Hald:

8 18 Tomi due

xxxv. Roe

IO. GEORGII ROEDERERI

MED. ET PHIL. DOCTORIS, ARCHIATRI REGII, MEDICINAE, ANATOMIAE,
CHIRURGIAE ET ARTIS OBSTETRICIAE PROFESS. P. O. IN ACADEMIA GEOR-
GIA AVGVSTA, PRINCIPATVS GOETTING. PHYSICI, SOC. REG. SCIENT.
GOETTINGENS. ACAD. IMPER. SCIENT. PETROPOLITANAE, SOC. REG.
SCIENT. SVECIC. ACAD. REG. CHIRVRG. PARISIN. SOC. REG. TEV-
TON. GOETTING. SODALIS, COLLEG. CHIRVRG.
GOETTING. PRAESIDIS

OPVSCVLA MEDICA

SPARSIM PRIVS EDITA

NVNC DEMVM.

COLLECTA AVCTA ET RECVSA

De Orelli

TOM. I. PARS II.

Abali

CVM - ELOGIO

ABRAHAMI GOTTHELFF KAESTNER

MATH. ET PHYS. P. P. O. SOC. REG. SCIENT. GOETTING. ACADD. REG.
SCIENT. SVEC. ET PRVSS. SOC. ELECT. SCIENT. VTIL. ERFORD. ACAD.
BEROLINENS. ET AVGVSTAE PERVSINAE, SOCC. THEOT. ET
LIBB. ART. LIPSIENS. LATINAE ET THEOT. IENENS.
SODALIS, SOC. REG. THEOT. GOETTING.
SENIORIS.

IN CONSESSV SOCIETATIS REGIAE SCIENT. RECITATO.

GOETTINGAE
APVD VICTORINVM BOSSIGELIVM
MDCCLXIV.

OF THE HISTORY OF

THE ARTS AND MANUFACTURES
OF THE KINGDOM OF GREAT BRITAIN
AND OF THE TOWN OF LONDON
IN THE SEVENTEENTH CENTURY
BY JOHN DE LAET
AMSTERDAM
1673

OPUSCULE MEDICAL

DE L'ART DE GUERRE



DE L'ART DE GUERRE

De la Guerre et de l'Art de la Guerre

ARTS AND MANUFACTURES

OF THE KINGDOM OF GREAT BRITAIN
AND OF THE TOWN OF LONDON
IN THE SEVENTEENTH CENTURY
BY JOHN DE LAET
AMSTERDAM
1673

OF THE HISTORY OF

THE ARTS AND MANUFACTURES
OF THE KINGDOM OF GREAT BRITAIN
AND OF THE TOWN OF LONDON
IN THE SEVENTEENTH CENTURY
BY JOHN DE LAET
AMSTERDAM
1673

E L O G I V M
IO. GEORGII ROEDERERI

MED. ET PHILOS. DOCTORIS ARCHIATRI REGII MEDICINAE
CHIRVRGIAE ET ARTIS OBSTETRICIAE PROFESSORIS IN ACADE
MIA GEORGIA AVGVSTA PRINCIPATVS GOTTINGENSIS PHYSICI
SOC. REG. SCIENT. GOTTINGENSIS ACAD. IMPER. SCIENT. PETRO
POLITANAE SOC. REG. SCIENT. SVECICAE ACADEMIAE R. CHIRVR
GOR. PARISINAE SOC. REG. TEVTON. GOTTINGENS. SO
DALIS COLLEGII CHIRVRGOR. GOTTINGENS.
PRAESIDIS

IN CONSESSV
SOC. SCIENT. GOTTINGENSIS
D. XVIII FEBR. CIOIO CCLXIIII

R E C I T A V I T

ABRAHAM GOTTHELF KAESTNER

MATH. ET PHYS. P. P. O. SOC. R. SC. GOTTING. ACADD. REG. SC. SVEC. ET
PRVSS. SOC. ELECT. SCIENT. VTIL. ERFORDINAE ACADD. BONONIENSIS
ET AVGVSTAE PERVSINAE SOCC. THEOT. ET LIBB. ART. LIPSIIEN
SIVM LATINAE ET THEOT. IENENSIVM SODALIS SOC.
REG. THEOTISCAE GOTTINGENSIS
SENIOR

REV. J. G. V. M.

FORGOTTEN

THE HISTORY OF THE
LIFE OF THE
LATE
J. G. V. M.
BY
J. G. V. M.

IN TWO VOLUMES

VOLUME I

THE HISTORY OF THE

LIFE OF THE

FORGOTTEN

THE HISTORY OF THE
LIFE OF THE
LATE
J. G. V. M.
BY
J. G. V. M.



Roedereri memoriam recolendam mihi
sumsi auditores, facturus quod is ipse
iusserat, cum proximo anno de Mayeri vita dis-
ferentem audiuiisset. Et hoc quidem officium
vix serio tunc vel impositum est, vel rece-
ptum. Sed quando illius praestandi tem-
pus, citius multo venit quam metuere tunc
cum aliqua ratione poteramus, liceat vel hanc
cuius exitum tam propinquum futurum non
crediderat, amici voluntatem, sanctam esse
mihi, tot coniunctorum funeribus edocto,
illam mihi sortem datam esse, quam cupressus
Phoebus dederat, ut lugeam et dolentibus
adsim.

Ab origine Roedereri, quoniam ita mo-
ris est, initium facturo, certare de illa mihi



videntur , duae maximae gentes , nostra, et quam nimium nostrae vicinam , iam non amplius Rhenus separat. Argentorati enim in lucem editum, Gallogermanum forte non iniuria dixeris, neque dedecori hoc nomen sit illi, qui virtutes vtriusque populi coniunxit, animi quidem probitatem eius populi cum quo olim libertate fruebatur patria, ingenii autem alacritatem alterius, cum quo ea iam regi obedit.

Parentum, honestatem et opes, ego quidem, in laudibus eruditi non magis posuerim, quam alia quae non fecit ipse, nisi, ut noster, adiiciat hoc de suo, ut ostendat, agnoscere se, non coecam sortem, obiecisse sibi haec bona, sed prouidentiam diuinam quo recte illis vtatur dedisse. Sic ad ipsius Roedereri honorem pertinet nominare quibus illum debemus; Patrem habuit Io. Fridericum, inclytum lapidum pretiosorum negotiatione, quae quidem, non sine magno ingenii acumine multaque peritia, et fere cum hominibus summo loco positis, ipsisque principibus
exer-



exercetur; fuerunt eius in ciuitate consiliis regenda partes aliquae, Senatui maiori adscripti. Matris Mariae Vrsulae gentilitium nomen, Froereisenium, iis qui Theologos celebriores norunt, ignotum esse non potest. (*) His parentibus, a diuorum hominumque patre die 15. Maii anno huius saeculi vicesimo sexto concreditus est. Pueri gymnasio traditi ea fuit tum ingenii felicitas tum industria, vt quatuordecim annorum ephebus in bonarum litterarum vniuersitatem quae patriam illustrat reciperetur. Hic, didicisse illa quae vel cuius eruditorum vsui ornamentoque esse creduntur, vel ad artem salutarem cui se dederat imprimis pertinent, non est quod longius recenseam, graecae vero linguae, quam quidem ignorare medico turpe est, eam etiam quam antiquior sacri codicis pars scripta est iunxisse, et theologicas scholas frequentasse, id silentio non praetereundum censeo, si forte, qui in arte quam professus est imitandum sibi proponunt,

A 3

(*) Erat filia Io. Leonh. Froereisenii ad S. Thomam Canonici et Nicolaitani christianor. gregis pastoris.



nunt, vellent et hac in re exemplum ab eo sumere. Academicis studiis coronidem imposuit Lutetiae Parisiorum, et iter eruditum per Angliam, Batauiam, Germaniam instituit, in quo, postquam a maximis viris profecerat, sensit tamen Gottingae adhuc ab Hallero doceri se posse. Summis quos vocant in arte medica honoribus, aut ornatum iam e patria abiisse, aut saltem, redūcem ex hoc itinere carere illis amplius noluisse, iurabunt, qui tribus annis, in academia quadam non omnino male collocatis, fatis caro emi hos honores existimant. Hi vero sciant, patriae redditum, chirurgicae adhuc artis, et obstetriciae scholas frequentasse, et decennio in addiscenda arte salutari, ita ut dixi consumpto, demum ad doctoris titulum adspirasse, quem quinquagesimo saeculi anno consequutus est, mereri se illum, dissertatione de Fetu perfecto edita, et habita de Variolis morbo nouo, oratione, ostendens. Scilicet iam tunc, cum primum facultatem, quae didicerat ad salutem humanam transferendi consequeretur, polli-



polliceri visus est, non saltim adultioribus aegris operam suam se destinasse, sed debitu-
tuos etiam illi qui post eum et post nos su-
perstites futuri sunt, haec duo, alterum ut
incolumes in lucem prodeant, alterum, ut
veneno non nocituro variolarum, arte admini-
strato, a naturali earum, eaque perniciosissi-
ma peste, tuti reddantur.

Iam patriae inferuire opera sua incipiebat,
sed Hallero talis iudicatus fuerat, qui Gottin-
gam ornare posset, et conditiones, ut patriam
obliuisceretur effecturas, offerebat liberalis
prouidentia, Eius, quem omnes optamus ut
quam diutissime adhuc Georgia Augusta colat,
praesentem conspicuumque tutelarem ge-
nium. Huc ergo, sub finem anni quinquage-
simi primi, extraordinarius Anatomiae, Chi-
rurgiae, artisque obstetriciae professor migra-
uit, ordinariis Professoribus anno quinquage-
simo quarto adscriptus et post Archiatri Regii
elogio ornatus. (*) Datum antea iam erat ipsi
munus, (**) in principatu Gottingensi, de iis
respon-
-no (*) 1759. Gött. gel. Anz. III. St. (**) 1756.



respondendi quae vel ad publicam curam valetudinis ciuium pertinent, vel ad iudices in caussis forensibus quarum historia a medico scribi debet docendos, *Physicum Prouincialem* vocamus cui id munus datur, nomine ex barbaris saeculis adhuc superstite; illis enim, inter alios insignes errores et hic vigeat, quem nostra tempora multo sapientiora ex animis hominum eiecerunt, medicum sine naturae cognitione esse non posse.

Dum in iis sum quibus Gottinga effecit, ut ad illam accessisse Roedererum non poeniteret, eius boni admoneor, cui nullum eorum quibus homines frui possunt comparandum censerem, si aut magis tuta esset illius possessio, aut doloris cum amittitur minor acerbitas. Intelligitis auditores, nam et vobis mollia esse pectora crediderim, de illo consortio me loqui, sine quo, vel recens creatum virum, non diu esse voluit vniuersi auctor. Et noster quidem, anno postquam hic sedem fixerat, cum Elisabetha Clara, Wahlii, inter Ictos qui Gottingam ornarunt illustris filia, iniit hoc con-



confortium, solum breuitate temporis quo durauit infelix, nam sex annis post ereptam luxit. Superfuerunt viduo amoris pignora filiae duae, et illae, merito in se conuerti totum patris adfectum, virtutibus quae in aetatem sexumque illarum cadunt omnibus comprobarunt.

Non vero vnica doctoris academici eruditi, subtilis, et disertus, medicique felix, laude Roederus florebat, sed talis iudicabatur, cuius ingenio possent scientiarum limites extendi. Igitur nostra scientiarum societas, sodalem cooptauit, extraordinarium, et quam primum secessu cel. Hollmanni locus vacaret in classe physica, ordinarium, Holmiensis, (†) et chirurgorum Parisina, (*) suum etiam esse voluerunt. Imperialis autem Academia Petropolitana, quae sodalis titulum, e Russia abeuntibus relinquit, ceterum exterius rarius tribuit, nostrum singulari quadam ex causa,

(†) G. g. A. 1757. 63. St.

(*) G. g. A. 1767. 48. St.



caussa, et quae multum faciat ad Roedereri honorem hoc elogio decoravit. Praemium annuum academia proposuerat disquisitioni de monstrorum origine, imaginationi matris aliquid se hic tribuere passa, iis tamen qui certare vellent ipsam suam sententiam impugnandi libertatem relinquens; Dedit igitur praemium (*) scripto eorum quae suam sententiam tuerentur optimo, Krausii iam Prof. Lipsiensis. Roedererus contra, imaginationis vim ad monstrorum fabricam nullam esse, argumentis anatomico, iisdemque vero philosopho dignis, demonstraerat (**). Causam quae sibi placeret, victricem esse voluit Academia, inter scriptores tamen victum sibi magis placere, sodalem recipiens declaravit (***) .

In commentariis nostrae societatis, haec edita sunt Roedereri: Sermo de mola, de communi-

(*) *d. 6. Sept. 1756.*

(**) Vtriusque scripti recensione v. G. g. *Anz. 1757. 30. St.*

(***) *Gött. g. Anz. 1756. 145. St.*



municatione vteri et placentae, de pondere et longitudine recens natorum, fetus parasitici descriptio. Quibus non saltim naturae historiam auxit, sed et causas euentuum rimatus est. Vbi accidit illi, vt antiquorum quasdam sententias, quas euertisse recentiores inuentis suis putauerant, renouandas existimaret, sed ita tamen vt vel parum firmatas nouis argumentis fulciret, vel emendatiores sisteret. Quale est: molam fieri, cum embryo lentius quam pro placentae incremento contingere deberet augetur, dumque editur ouum hoc deforme, minutus embryo cum sanguine fere effluit, sicque oculis se subducit, aut compressus vitiatur, vt agnosci nequeat (*). In ortu animalium explicando, propendebat etiam noster ad antiquorum opinionem, a feminibus commixtis eum repetendum esse. Addebat tamen, feminibus vires dare potuisse creatorem, quibus ea commixta, organicum corpus, illis vnde prodierunt simile, forment. His viribus eodem iure physicum vti posse,

B 2

quo

(*) Comm. soc. sc. Gott. T. II. p. 358.



quo grauitate, adhaesione, electricitate, vtitur, quarum caussa aequae nos latet, adeoque *plasticae* vis nomen hoc sensu acceptum, postliminio reduci in philosophiam posse, vt attractio reducta est, cuius species quaedam plasticam illam vim constituere possit. Zoologiae inprimis multa accessere, vltimis, et in commentariis qui editi sunt non reperiundis, Roedereri laboribus, plura adhuc accessura erant, si in Anatomia comparata perficere quae inceperat licuisset. Quam vero in societate nostra legit historiam noui cuiusdam et a nemine obseruati vermium intestina humana incolentium generis, trichurides a caudae figura vocauit, illa effecit, vt nomen suum, naturae scrutatoribus proximum a Trembleij, polyporum inuentoris nomine celebretur (*).

Plura quae cum eruditis communicauit, iam in opusculis prodeunt, quorum editionem ipse instituerat, nescius posthuma futura. Sed catalogum operum alio tempore legatis malo,
iam

(**) Gött. gel. Anz. 1761, 25. St.



iam utinam liceret mihi satis feliciter, Roedereri ingenium describere, unde qualia sint haec opera ipsi iudicare possitis. In obseruandi arte quae palmaria est medici, summus erat, gratusque, Hallerum praeceptorem in illa suum nominabat. Videbat igitur tum in aegris tum in cadaueribus, quae effugerent oculos, aut hebetiores aut minus exercitatos, visis vero magno et felici cum acumine utebatur. Philosophos a reliquis hominibus non eo differre, quod alias res videant, sed quod videant alio modo, acute, et vere ut pleraque dixit Leibniti-
us. Illo philosophico videndi modo inprimis pollebat Roedererus, phaenomena obseruatore oculo sed quem genius inuentor re-
geret lustrans.

Eius genii opiferi excellentiam raro intel-
legebant, qui magnitudinem auxilii ab illo ac-
cepti sentire tantum poterant, pene ut in cele-
bri illa Fenelonii fabula, nesciebat Vlyssis filius,
Deam comitem esse cui tot beneficia deberet.
Sed nos, cum de phaenomenorum causis dis-

B. 3 feren-



ferentem, aut praedicentem euentura, aut ex obferuatis, leges generales condentem, audiebamus, morborum vero vim, non consuetis remediis vtcunque minuere, sed noua et quam probaret successus audacia frangere videbamus, sublimius quidpiam esse in viro, iis duabus rebus, quibus agnoscuntur coelitus demissi ad opem hominibus ferendam, genii, fulgore, et potentia, agnoscebamus.

Post haec non leue iudicabitis auditores, si addam, cum vere esset philosophus Roedererus, hoc nomine honoris caussa compellare illum voluisse ordinem philosophorum academiae nostrae, eumque hoc nomen honori sibi duxisse. Cautum est, litterariae ciuitatis in qua ego natus sum legibus, vt ad facultatem quam gratiosam vocant, aditus nulli pateat, nisi philosophiam et artes liberales docendi ius consequuto; ea re, vt audiui a praecceptore quodam meo, admonentur medici, ne ad artem suam sine philosophia accedant, rectius adhuc facturi, si cum Roederero, totam suam artem, philosophiam corporis humani, et iusque animati, efficiant.

Vix



Vix potest egregius esse naturae scrutator, et pulcherrima creatoris opera, perpetuo ante oculos posita habere, qui ad artium naturae imitatricium pulcritudinem hebes sit. Roedererus certe, de iis omnibus quae ad ornatum elegantiamque pertinent, scite iudicabat, pictura inprimis et poesi, idoneus vtriusque arbiter, capiebatur, de suis scientiis, ita differebat, ut et doceret auditores, et delectaret. Hoc, ut testatum faceret, seueriora studia tractantes humanioribus debere, ultimo, et omnibus quos dixi honoribus auctus, accedere voluit ad societatem quae Gottingae excolendis patriis litteris occupatur, habetque in tanti viri erga se adfectu societas, quod opponat impotenti aliorum odio.

Talis Roedererus placere vel iis poterat, quibus docendo aut medendo, non prodesset. Quod ne exiguum credatis auditores, magni momenti fuit, cum gallico praesidio premeremur, nostroque magistratus academicus bis continuaretur, et, nullo adhuc exemplo, ex semestri sesquiennis fieret



ret (*) quoniam facundia, et dotibus quaecunque placent genti elegantiarum ac vrbانيتatis magistrae, plurimum effecturus apud illam iudicabatur.

Vtinam hoc solo probasset se ciuibus olim suis, neque medicus etiam illis innotuisset. Habermus, vel Roedererum ipsum, vel, si maurus erat coelo qui nondum satis vixerat terris, certe cineres eius. Multum reluctan-tem, repetitae preces Lutetias Parisiorum vocabant, vt a quo solo fere speraret auxilium, femina nobilis morbo grauissimo decumbens. Iam, qui nihil magnificentius nouit antiquorum commentis, Aesculapium mihi nominabit, a Romanis Epidauro accersitum: ego ibi video gentem semibarbaram, oraculi et somnii fide, nescio quod peregrinum numen aduehentem; hic, cultissimum populum, ad quem artis salutaris addiscendae cupidi, ex omni Europa confluunt, medicum ad se vocantem, qui cum Gallus manere potuisset, Germanus esse maluit.

Itineris

(*) Inde a d. 3. Iul. 1760, ad 2. Ian, 1762.



Itineris circa aequinoctium vernum instituti molestias, non tulit corpus, ante iam extenuatum. Nam inde ab aliquot annis, et aeger aliquoties lecto decubuerat, et saepius sub vesperam, febriculae accessus fessa demum membra relinquentis experiebatur. Hinc legere, meditari, scribere, vix nisi matutinis horis poterat, nam diem aegris et discipulis tribuebat, quod sequitur tempus, amicorum, raro sine aliquod doctrinae augmento ab ipso discendentium colloquiis. Ego quidem, hac occasione illo fruendi, ob negocia mea, multo parcius usus sum, quam vel optassem vel ipse lubens permisisset, nam: amavit nos quoque Daphnis. Sed tamen fructus quem vna illarum vesperarum ex colloquiis eius percepi, participes vos reddam auditores. Referebam illi, b. Mayerum, qui dum decumbebat, parum aut ut rectius dicam, nihil omnino, arti salutari tribuere. Tunc vero, mathematicum ea sola re peccare pronuntiabat medicus, quod arti applicaret, quae recte esset de artificibus dicturus.

C

Hoc



Hoc vitae genere, sperabat noster, cum paucis antequam abiret diebus me inuiseret, vitam se adhuc aliquot annos protracturum, cuius filum lucubrationes cito essent abrupturae. Iudicate auditores, quantus fuerit, qui ubi cum tot negociis, cum morbis, aliorum et suis conflictaretur, non noctes studiis tribuit, sed scientias ita auxit, breui illo tempore, quod fuit inter ortum diei et negocia diurna. Et agnoscas fere in scriptis viri, lumen, ad quod elaborata sunt, non triste et debile lucernae, sed laetum et viuidum aurorae.

Cum quae retuli mihi diceret, nesciebat adhuc instare iter omni lucubratione perniciosius. Argentorati subsistere coegit febris, indies ingrauescens. Aduocati medici, quales Roedererum nobis dederant, et illos, credibile est, quantumcunque in illis esset, vel hanc vnicam ob causam, vt seruarent hoc scholae suae decus, exseruisse. Vehementiam morbi, quam plures aequae potuerunt sentire, hic non describam: Praeter illam, Roedereri animum iudicabitis multa excruciasse, vt:

vt: ab iis cum quibus longa consuetudo iunxerat, absentem in perpetuum separari, in medio gloriae cursu sisti; sed inter haec, si recte virum noui, acerbissimum fuit, quod pater sensit: De illo vero, cum vt vellem loqui non possim, silentio me id oportet vt pictor olim graecus velo fecit, tegere. Hoc vnicum lenimen habuit, quod fratres et sanguine iuncti amplecterentur, et quo magis amicus et necessarius Roederero nullus fuit, sodalis noster Buettnerus, V. Cl. Horum inter planctus, nocte quae quartum Aprilis sequeretur, animam reddidit ei, quem resurrectione sua, Victorem mortis, veraeque vitae adfertorem, illis diebus adorabamus. Luxit Academia patria, et tenet iam natale solum corpus quod dederat. Nos, non inuideamus a febre continua liberato, nam talem esse vitam humanam, erat vna ex aliorum, quas ipse probaret sententiis, et, si experimur, artem salutarem, in qua tot saeculis, tot summa ingenia laborauerunt, neque mediocriter theoriam illius perfecterunt, tamen adeo parum secure et ex votis



hominum administrari, vt ne quidem maximis sui magistris multum proſit, intelligamus: Deum ſolum ſtatuerē, quamdiu in hac terra opera noſtra qualicunque in exſequendis conſiliis ſuis vti velit, noſtrum vero eſſe, vt, velut auocandi a ſtatione ſua milites, et parati ſemper, et alacres ad obediendum reperiamur.





ROEDERERI SCRIPTA
SEORSIM EDITA

Programmata.

D

I.

- De axi peluis. Gottingae d. 16. Dec. 1751*
2) *Obseru. medicarum de suffocatis satura. Gott. 1753.*
3) *Observationes de Genitalibus virorum, ad Dissert.*
D. Grund. Gott. Febr. 1758.
4) *Obseru. de Cadaueribus infantum morbosus, ad Diss.*
D. Weber. Gott. Mart. 1758.
5) *Observationes de Foetu ad Diss. D. Iesariae Iudae. Got-*
ting. April. 1758.
6) *Obseru. de Animalium calore, ad Diss. D. Grimm. Gott. 1758.*
7) *Obseruat. de Vlceribus utero molestis, ad anniuersa-*
rium. Gott. Sept. 1758.
8) *Obseru. de Cerebro, ad Diss. D. Vllmann. Gott. Sept. 1758.*
9) *Obseru. de Ossium vitiis, ad Diss. D. Bruno. Gott. Mart. 1760.*
10) *Animaduersiones de Taenia, ad Diss. D. Trampel.*
Gott. Mart. 1760.
11) *Animaduersf. de Arcubus tendineis musculorum ori-*
ginibus ad Diss. D. Stein. Gott. Mart. 1760.
12) *Continuatio animadu. de Arcubus teudineis etc. ad*
ad Diss. D. Iansen. Gott. Iun. 1760.
13) *Obseru. de Morsu canis rabidi sanato, ad Diss. D.*
Dahl. Gott. August. 1760.

C 3

14) De



- 14) *Animadu. de Febre ex intermittente continua ad anniuersar. Gott. Sept. 1760.*
- 15) *Obseru. de infantibus in partu suffocatis, ad Diss. D. Koerber Gott. Octobr. 1760.*
- 16) *Obs. de submersis aqua, ad Diss. D. Meder. Gott. Nou. 1760.*
- 17) *Obseru. de Phibisi infantum neruosa, ad Diss. D. Hempel. Gott. Mart. 1762.*
- 18) *Obs. de Cerebri scirrbo, ad Diss. D. Wendt. Gott. Iun. 1762.*
- 19) *Obseru. de Hydroke ouarii, ad Diss. D. Papen. Iul. 1762.*
- 20) *Oratio de Artis obstetriciae praestantia. Gott. Dec. 1751.*

Dissertationes

a) *Quae totae a illo factae sunt.*

- 21) *Theses medicae sub Praesidio Eisenmanni. Argentorati Mart. 1750*
- 22) *De Foetu perfecto pro gradu Doctoris. Argent. Maj. 1750.*
- 23) *De Ictero, illoque speciatim, quo infantes recens nati laborant. Gott. April. 1753.*
- 24) *De Vteri scirrbo. Gott. Aug. 1755.*
- 25) *Nonnulla motus muscularis momenta. Gott. Octobr. 1755.*
- 26) *De vi imaginationis in foetum negata, quando grauidae mens a causa quacunque violentiore commouetur, publici juris facta Petropoli. 1756.*
- 27) *Vtrum naturalibus praestent variolae artificiales. Gott. Iun. 1757.*
- 28) *De temporum in grauiditate et partu aestimatione. Gott. Sept. 1757.*
- 29) *De secretione. Gott. Febr. 1758.*
- 30) *De non damnando usu perforatorii in paragomphosi ob capitis molem. Gott. 1758.*
- 31) *De*



31) *De Partu laborioso.* Gott. Sept. 1760.

Cuius unica autem solummodo observatio typis expressa est respondente D. Muller.

b) *Quae illo non plane autore, sed suasore et moderatore enatae sunt.*

32) *De partu praeternaturali, quem sine matris aut foetus sectione absolvere non licet operatori.* Gott. Nou. 1755.

33) *De Funiculi umbilicalis deligatione non absolute necessaria.* Gott. Nou. 1756.

34) *De signis foetus viui et mortui.* Gott. Mart. 1756.

35) *De Causis necessario mortem in partu inferentibus.* Gott. Nou. 1756.

36) *De Versionis in extrahendo partu praestantia et ad-
miniculis.* Gott. April. 1757.

37) *De signorum grauiditatis aestimatione.* Gott. Mart. 1760.

38) *Tentaminum et observationum de morbo varioloso sa-
tura.* Gott. Iun. 1762.

39) *De Morbo mucoso.* Gott. Dec. 1762.

Opera.

40) *Elementa artis obstetriciae.* Gott. 1753. 8. Denuo au-
cta edita ibidem 1759.

41) *Observationum medicarum de Partu laborioso decade
duae.* Gott. 1756. 4.

42) *Icones uteri humani.* Gott. 1759. Fol. Alter fasciculus
s. actuarium dicas, iam aeri insculptus est.

43) *Opusculorum medicorum Tomi 2.* Gott. 1763. Complexi
minora scripta, partim indicata. Est etiam inter ea
commentarius de vi imaginationis in fetum negata,
Acad. Imper. Petrop. oblatus. Exhi-



Exhibita Soc. Reg. Scient. Gottingensi.

De mola. 1752.

Comm. Soc. Sc. T. II. p. 354.

De communicatione uteri grauidi et placentae. 1753.

T. III. p. 397.

De pondere et longitudine infantum recens natorum. 1754.

Ibid. p. 410.

Fetus parasitici descriptio 1754.

T. IIII. p. 136.

Sequentia, ob interruptam commentariorum editionem nondum prodierunt.

Monstri descriptio 1755.

G. g. A. 1755. 58. St.

Abdomen et cerebrum urfi descripta 1755.

G. g. A. 1755. 123. St.

Capitis vitulini monstrosi descriptio 1756.

Gött. gel. Anz. 1756. 58. St.

Urfi anatome anni praecedentis continuata.

Renis singularis ex duplici descriptio,

Monstrum ouinum sex pedum 1750.

G. g. A. 1756. 152 St.

Inoculatio variolarum Gottingae instituta impensis Soc. Reg.

Scient. et lecta dissertatio de variolar. inoculatione 1755.

G. g. A. 1757. 20 St. 137 St.

Trichuridum, vermium in hominis intestinis ante non obseruatorum descriptio 1761.

G. g. A. 1761. 25 St.

Fasciola truttae intestinalis et muris hepatica. 1762.


G. g. A. 1762. 61 St.

De acubus, ventriculis, anserino et gallinaceo sine noxa infixis. 1763.

G. g. A. 1763.

CON-





CONSPECTVS

ALTER.

XIII. *De suffocatis jatura.*

XIV. *De submersis aqua observationes.*

XV. *De infantibus in partu suffocatis observationes.*

XVI. *De signorum grauiditatis aestimatione.*

XVII. *De signis foetus viui et mortui.*

XVIII. *De funiculi vmbilicalis deligatione non absolute necessaria.*

XIX.

CONSPECTVS.

XIX. De causis necessario mortem in partu inferentibus.

XX. De versionis in extrahendo partu praestantia et adminiculis.

XXI. De partu praeternaturali, quem sine matris aut foetus sectione absolueri non licet operatori.



DEMONSTRATIONES ANATOMICAS

RELIQVASQUE LECTIONES

SEMESTRI BRUMALI

MDCCLIV-MDCCLV.

HABENDAS

INDICIT

ET

OBSERVATIONUM MEDICARVM

DE

SUFFOCATIS SATURAM



ADDIT

I. G. R.

AUR. CORN. CELSI

de Medicina Lib. II. Cap. VI. sub fin.

Conjecturalem artem esse medicinam, *ait:*
rationemque conjecturæ talem esse, ut
cum sæpius aliquando responderit, interdum
tamen fallat. — In vicino sæpe quædam
notæ positæ, non bonos, sed imperitos medi-
cos decipiunt, nec protinus crimen artis est,
si quod professoris sit. — Sed est tamen
medicinæ fides, quæ multo sæpius, perque
multo plures ægros prodest.



OBSERVATIONUM MEDICARUM

DE

SUFFOCATIS SATURA.

Puella in aqua submersa.

Popularis Medicorum opinio est, foraminis ovalis aperturam submersorum suffocationi prævertere (a), quam vero sententiam experientia convellit. Superior annus cum ad finem properaret, undæque omnem nostri campi ambitum obruerent, puella ex equo delapsa in torrente suffocatur. Secundum cadaver mihi traditur, in quo *foraminis ovalis valvulam* albicantem invenio, ad lumen pellucidam, multoque, ac reliqua septi substantia, tenuiorem, totam, sine musculari fibra, membranaceam, cum copiosis fibris intertextis, figura tendineis & reticulatis, ambitu ovali terminatam, amplitudine sua illam quæ in fetu est insigniter excedentem, arctiusque in sinu dextro cum limbo, qui minus ac in fetu eminet, concretam. Sed similia in plerisque adultorum cadaveribus observari solent. Viam autem ad hujus valvulæ alterum extremum ex sinu dextro in sinistrum patulam fuisse memorabile est. Duo enim, ceu in fetu notatur, cornicula, in sinuum septum inserta, exiguit, quæ medium hiatus intercipiunt. Ita tamen iste hiatus comparatus est, ut, si omnia sibi permittantur, positusque naturalis non vitietur, totum septi foramen a valvula claudatur. Medio autem in loco val-

N n 3

vula

(a) Conf. Ill. HALLER. *Prælect. Bærhav. T. V. P. II. p. 472.*
add. T. II. p. 222.

valvula inter cornua elevari, hocque pacto canalis, qui ex dextro in sinistram sinum tendit, diduci potest. Qua valvula limbum in dextro sinu contegit, limbi pars magis ac reliqua, quæ cum valvula coaluit, turget. Ad duarum autem linearum a limbo in sinistram sinum latitudinem valvulæ pars inter cornua septum contegit. Pars aperti hiatus superior quinque ab inferiore lineas distat. Modicus adeo inter dextrum sinistramque sinum hiatus sanguinis portiunculam ex dextro in sinistram sinum sine pulmonari circulo derivare potuisset, nisi perpetua sinus sinistri & simultanea cum dextro repletio appressam perpetim limbo valvulam servasset. Nullam adeo iste hiatus in aquam demersæ filix opem ferre potuit, quæ eam saltem a suffocatione defenderet.

Sanguinis autem a suffocatione *in venis congestio* quamvis nunquam desit, in dicta tamen puella succorum sanguisque, dum viveret, plenissima adeo insignis fuit, ut non solum maiora vasa & a corde propingua sanguine summo opere turserint, sed & minimi rami farti penitus fuerint: hinc rubens, quasi ophthalmia laboraret, vel ceracea materia optime nutrita foret, oculi albuginea: hinc fartæ adeo, quæ e musculis sese corripunt, venæ, ut, dum muscoli præparentur, incisæ sanguinis tantam, quæ vel ipsam musculorum præparationem nullam reddat, copiam fundant.

In *pulmonibus* suctus vivorum suffocationis in aqua effectus notabatur (a). Cellulares vesiculæ inflatæ & copiosæ veslientem pulmones membranam elevant. Cum inciditur pulmo aqua spumosa & sanguine tincta effluit. Homines adeo, qui vivi submersi fuerint, aquam in pulmones trahere, hæc observatio confirmat. Aquæ spumosæ nimia fere quantitas fuit, quam quæ secreto in pulmonibus liquori tribui potuerit, omnesque pulmonis lobulos replevit. Simile quid in aliis cadaveribus, aliam mortem mortuis, non observatur.

A *ventriculo* vero, quod mirum, nil aquæ, ceu ut plurimum (b).

(a) Cf. Cl. D. EVERS *Diff. sist. Experimenta circa submersos in animalibus instituta*, anno superiore conjunctiss. Collega BRENDelio *Præside defensa*. Cap. II. S. II. §. 34.

(b) fieri solet, sed copiosa massa tenacior, crassior, cinerea, quam chymum crassiorem vocare possis, comprehenditur. Nihil proinde, cum suffocaretur, aquæ puella deglutivit. Rationem ex ventriculo cibis referto reddere possemus (c), si ulla cum chymo remixtæ aquæ nota fuisset. Aliam itaque addere lubet. Puellam plethoricam animi deliquiis subinde laborasse, qui eam noverant retulerunt, subitoque eam ex equo delapsam esse constitit. Puellam itaque animi deliquio correptam decidisse, vitamque cum morte sine aqua deglutita commutasse conjectare licet. Isti autem conjecturæ ipse ex equo lapsus fidem facit. Rustica enim puella, annos quasi viginti nata, artium summo robore pollens, operum agrestium usu exercita, equo vehi sueta, & isto præcipue tempore in equi lumbis pone alium rusticum, quem ut firmiter sederet, manibus complectebatur, collocata sine peculiari symptomate vix decidisset.

Puellæ lapsus in aquam rudem quam maxime fuisse exinde colligi potest, quod tres omnino in sinistro femore musculi disrupti fuerint: longum puta bicipitis caput, semitendinosus & semimembranosus. Horum autem musculorum propria membrana licet illæsa manserit, ipsi tamen musculi laceri & per totam substantiam oblique a parte internâ ad externam deorsum fissi sunt. Rupturæ locus ob effusum sanguinem rubicundior fuit.

Aque rubellæ aliquot unciz in abdomine & notabilis copia in pericardio fluctuarunt.

2.
Ovale foramen in adultis apertum.

Liceat mihi observationi ovalis foraminis aperti similem aliam subungere (a). Ex viro sene, qui ostiatum victum quæsit, quinque

(b) Diff. cit. Cap. II. S. I. 24.

(c) l. c. §. 30.

(a) Obs. collect. v. HALLER. II. cc. add. Vir. laud. Icon. Anat. Fasc. IV. Progr. de Foram. Ovali & Valvul. Eustach. not. II. p. 9. WEITBRECHT in Commentar. Petropol. Tom. IV. p. 264. Ill. LAVR.

que superiore hyeme fecui, observatio defuncta est. Foraminis ovalis valvula pellucida est, multoque, ac reliqua sinus pars, tenuior. Foraminis fovea in dextro sinu una cum limbo conspicitur; in sinistro sinu albido, qui in sinus pariete rubellus est, valvula colore distinguitur. Totum, si naturalis positus immutatus maneat, ovale foramen clausum est, sinuumque sepimentum cornicula tegunt. Pari autem, quo in superiore observatione, modo inter quod cornicula, quæ tres lineas distant, cum sinu valvula non cohæret; sed medium, quem elevata membrana ampliare possis, canalem relinquit. Media inter cornicula liberaque membrana septi partem tres lineas latam regit. Integram foraminis circumferentiam limbus non munit, sed quarta eiusdem pars, quæ hiatus exadversum est, cum sinu in eodem plano continuatur. Sensim inde limbus exsurgit, eo tumidior; quo ab hiatus propior est, eoque profundior recessus fit, quem cum valvula limbus cavat. Recessus istius media pars in canalem aperitur, qui ex dextro in sinistram sinum pervius est. Per angustam canalis, quæ dexter sinus est, apertura lineam modo cum dimidia æquat; latior sensim in sinistro sinu ad tres lineas ultimo inter cornicula loco diducitur.

In utroque, ex quibus ovalia foramina aperta descripsi, eadem vere ductus arteriosus in ligamentum mutatus, fuetoque more clausus fuit.

Quin tertium superiore hyeme apertum foramen ovale in puella viginti quinque annos nata reperi. Canalis inter parietem sinuum intergerinum & valvulam medius duas lineas longus est, stilumque crassum, cuius diameter lineam superat, recipit. Valvulae cornicula tres lineas distant. Foraminis ovalis fossa, prouti superius descriptæ, profunda est, ipsaque valvula pari modo pellucet. Pari etiam modo arteriosus canalis in ligamentum abiit.

De-
HEISTER in *Obs. med. Helmst.* 1730. *Obs. V. Ext. in Collection. Hallerian.* T. VI. p. 721. sq. Cel. I. G. IANCKE in *not. ad I. 1.* BRUJER. *sur l'incert. d. sign. d. l. mort.* P. I. C. III. §. 2. not. 2. cf. *Comm. Liter. Novæ. Vol. VIII. p. 272. Eph. N. C. Cent. IV. Obs. CLXVI. p. 376.*

Descriptas quidem observationes eam ob causam hoc in loco recenseo, ut aliquo saltem modo, foraminis ovalis aperturam in adultis minime infrequentem esse liqueat. Ter enim parem structuram superiore hyeme observavi, in quinque licet adultorum cadaveribus solius cordis naturam rimatus fuerim. Neque etiam quarti cordis, ex edentula vetula septuagenaria majore extracti, valvula, quod cum prioribus ipsi aliqua similitudo est, rationemque, qua foramen clauditur, optime declarat, nullam hic loci explicationem meretur.

Foraminis ovalis fossa minus ac ista superiorum observationum profunda est. In sinistro sinu cornicula, quæ sex lineas distant membranaque semilunari junguntur, libera sunt. Membrana semilunaris suctum valvulæ velum est, quod sinistri sinus parietem intergerinum tegit. Istud quidem velum canalem, tres lineas longum & cœcum, cujus fundus cum intergerino pariete coaluit, cum ipso isto pariete format. Similem canalem, lineam longum, idem velum cum intergerino pariete ex dextri sinus parte aperit. Inter utrumque canalem cum parietis membrana velum cohærescit.

Prima quidem descriptarum observationum satis superque jam nos docet foraminis ovalis aperturam adultos a submersionis periculo non munire: ex collatis autem observationibus ediscere porro possurus eam isti aperturæ angustiam esse, ut exiguus sanguinis rivulus, qui ex dextro in sinistram sinum fluere, suffocationem averruncare non possit. Nulla etiam in arterioso canali clauso spes est. Quin sinuum intergerinum parietem velum, quod canalem obtendit, adeo late tegit, ut vix sanguinis totum rivulum ex dextro in sinistram sinum penetrare verisimile sit. Quamvis enim eo momento, quo submersus pessum it, in dextro corde major, quam quidem in sinistro, sanguinis copia collecta sit, majorique adeo vi in foraminis ovalis valvulam nitatur; sinistri tamen sinus unda negligi nequit, siquidem circa minorem sanguinis undam cor sinistram artius contrahitur, suaque contractione sanguini cor dextrum expandenti resistit: Velum adeo inter utramque undam medium ad intergerinum

nium sinuum parietem firmatur, canalis clauditur, nihilque cruoris, vel parca saltem portio, ex dextro in sinistrum sinum penetrat.

Neque etiam homines, qui sub aqua per aliquod temporis intervallum impune degere didicerunt, id beneficii ab aperto foramine ovali acceperunt (a). Multo sane lubentius eam prærogativam consuetudini tribuerem. A teneris enim isti exercitio assuescere debent: ita sine dubio pulmones etiam alterno motu non agitati, sed ab aëre residuo mediocriter expansi, sensum sanguinem e dextro in sinistrum cor transmittendi facultatem acquirunt. Id vero nunca-go, ut consuetudinis vim in corpus humanum evincam, quam satis evictam cognitamque esse arbitror.

3.

Laqueo suspensi.

Suspensos a vertebrarum colli luxatione fracturaque non encari satis notum esse nostris temporibus censeo (b), quare huic momento immorari nolo: illud unum intelligi volo, me nunquam, quoties elisas laqueo fauces dissecui, in colli vertebris læsionem deprehendisse. An vero, quibus laqueus vitæ finem facit aëre priventur semper, vel plenaria aëris privatio, ut vita priventur, necessaria sit, quæstio est? Aeris vero via ut penitus claudatur, neque verisimile, neque necessum esse, sine difficultate probabo, quamvis, suam respirandi difficultatem symbolam etiam conferre, inficias ire nollem. Asperæ enim arteriæ ea natura est, ut tota comprimi nequeat. Integram compressionem cartilaginei annuli impediunt. Ut plurimum vero, ceu observavi, laryngem ipsam laqueus stringit. Pondus enim corporis deorsum tractum, infra maxillam inferiorem in summam colli locum, qui laryngi respondet, laqueum mo-

vet.

(a) Cf. I. I. BRUIER D' ABLAINCOURT *sur l'incertitude des signes de la Mort*. P. I. C. III. §. 2.

(b) Cf. PH. C. FABRICII *Sciagraphia Historiæ Physico-Medicæ Butisbaci &c. de morte laqueo suspensorum*. p. 48. sqq.

vet. Multo autem minus ac aspera arteria larynx comprimitur (a); quid quod funem medio in loco inter cartilaginem thyreoidem & cricoidem, ubi mobilis est larynx & impressionis capax, magisque in puella viginti quasi annos nata & teneriore (quæ observationem subministravit), firmatum vidi; tantum tamen abest, ut tota larynx compressa fuerit nullaque pro aere aperta via manserit, ut potius mutationis in larynge nota vix ulla apparuerit. Constricto etiam collo, fetus, qui ex matre nondum soluti nihil spiritus traxerunt, quandoque pereunt.

Majore cum veritatis specie præcipua mortis in ejusmodi miseris causa non soli sanguinis per pulmones impedito circulo, sed & sufflaminato per compressas venas ex capite refluxui indeque ortæ apoplexiæ adscribitur (b). Plurima enim apoplexiæ signa in cadaveribus observantur. Omnia capitis cerebrique vasa sanguine summo-pere turgent. Reliquæ etiam corporis venæ eademque vel minimæ farciuntur. Ita in intestinis venas sanguine adeo saturas vidi, ut systema venosum de industria repletum fuisse fere juraverim, cum arteriosi trunci vacui penitus deprehenderentur. Hæc utique in pulmonibus etiam insigne obstaculum denotare non negaverim. Maculæ ea propter lividæ hic illic in corpore conspiciuntur. Serii magna copia encephali ventriculos distendit; rubicundi etiam sanguinis globuli in istud serum effusi apparent, apoplexiam satis iudicantes. Aquæ nunc rubellæ, nunc pallidioris modica quantitas in abdomine, & pericardio, quin thorace, colligitur.

Non abs re erit notasse, me in suspenso quadragenario quasi, robusto, bene nutrito, pasto & poto, sexto a morte die abdomen

O O 2

de.

(a) *A violenta compressione cartilagine franguntur.* cf. I. NIC. WEISS *Observation. Anatom. V. Febr. 1745. n. 7. p. 14.*

(b) *Cf. Collegæ conjunctissimi BRENDÉLII Schediasm. de Valvula Eustachiana. p. 10. Decimum est in Collectionis Hallerianæ Tomo II. PH. CONR. FABRICII l. c. I. I. BRUIER l. c. C. IV. §. 2. sub fin. & P. II. C. III. Contrarium sine argumenti allato patrocinio affirmat. W. CHESELDEN anatomy of the human body. C. VII. p. 176.*

demum, quod fessi dies paschales sectiones vetuerint, aperuisse, magnaue admiratione permotum integerrima adhuc vasa lactea & summopere turgentia, venæ licet jugulares ipsa mortis die apertæ fuerint) suctis in locis observasse. Per aliquot etiam dies in abdomine aperto quædam eorum conspicua manserunt.

In eodem cadavere ipsa mortis die, antequam de putredine cogitatio fuerit & suspicio encephali venas venamque jugularem æreis bullis; sanguinis columnas distinguantibus, ubivis locorum plenissimas vidi (a).

4.

Fetus in partu eliso gutture suffocatus.

Infantes in ipso partu suffocari iis, qui parturientibus inserviunt, cognitissimum est. De toto quidem argumento, qua late patet, disserere scopus vetat; quasdam vero observationes, quod ejusmodi exactius descriptæ rariores licet sint, suo tamen pro tenellis embryonibus servandis, forensisque medicinæ cognitione promovenda, usu non destituantur, accuratius describere in animum induxi. Protinus itaque de puero, quem constrictum uteri orificium procul dubio necavit, referam. Per octo omnino horas pueri caput in vagina moratum est (*). Matris perineum & reliquæ pudoris sinum quæ ambiunt carnes nimis rigidæ capitis grandioris lapsum retardarunt. Interea temporis in capite tumor excrevit, caput in oblongam sphaeram compressum est, & os uteri summopere elasticum, velut laqueus quidam, pueri collum magna vi compressit. Neque valde miratus sum. Eo enim temporis momento, quo infantis caput per oris uterini aperturam penetravit, detersum penitus, ceu alias fieri solet, non fuit, sed ejusdem limbus, durus rigidusque, ad vaginæ parietem repressus, postquam caput descendit solumque collum

(a) Cf. ILL. HALLER. *Præl. Barhau. T. II. p. 204. sq. Comm. Lit. Nor. Vol. VI. p. 91.*

(*) *Partus describitur in Obs. Med. de partu laborioso Obs. XI.*

collum restitit, resiliere, totum orificium secum trahere mollissimumque pueri collum constringere cœpit. Per quinque omnino horæ minuta prima caput, donec totus sinus dilatatus fuerit, in sinu hæsit: dilatato dein sinu, ut caput, corpusculumque protraherentur, insignis, cum operatoris defatigatione, vis adhibenda erat. Constrictum uteri orificium sine dubio restitit. Solutus a matre puer nihil vitæ, nec cordis pulsu, nec thoracis agitatione & respiratione, nec palpebrarum aliarumque partium motu probavit. Sub initium autem partus vixisse, ex capitis tumore, diaphragmatis artuumque, cum puer irritaretur, convulsione & motu, quem in utero, antequam in vaginam puer depulsus fuerit, mater sensit, rescivi.

Pueri corpusculum candidum fuit, candida facies, nullo sanguine suffusa, nullo livore notata: livida modo labia, livida zona collum cingens, nasusque pallidissimus.

Puerum in mortis agone se a meconio liberasse, effluens istud ex ano, ore naribusque, cum caput maxime comprimeretur, meconium, fœdatum pigmento viridi corpusculum, amnii liquor, qui infantem solutum insecutus est, eodem pigmento tinctus, me docuerunt. Quoniam omnis fœtor defuit, ortum a putredine pigmentum non fuit.

Ego, ut latentem forsan vitam excitarem, curavi, sueta probataque partim adminicula (a) adhibere, digito os eluere, nares plumula irritare, halitum ori inflare, acetum ori naribusque instillare, pedes setaceis scopis fricare, funiculum placentam trahentem non perscindere, per quinque horæ minuta placentam cum fetu perpetuam in utero relinquere, infantem dein calidis fovere, aliaque moliri. Ita quidem, ut artus aliquoties traheret, pedes cum setis lacefferentur

O O 3

ad

(a) *Pleraque istorum ex variis autoribus collecta sunt in BRUIERI & EVERSI Tractat. supra laudatis. Cf. illius P. I. Cap. IV. S. 3. & passim in toto libro. Hujus Sect. III. p. 28. add. SMELLIE & VON HOORN infra excitandi, & Cel. GEO. AUG. LANGGUTH Disp. de reddenda recens suffocatis adempta anima Wittenberg. 1748.*

ad corpusculum corripere, decimo a partu horæ minuto diaphragma ter convelleret, collumque tremere, effeci: sed in vitam puerum revocare frustra laboravi.

De mortis itaque causa sollicitus anatomico scrutinio corpusculum subjeci. Sectione instituta sanguinis omnem vim in thoracem coactam & encephalo subtractam fuisse cognovi. Ex utraque causa cum cordis motu vita perire debuit. Cuncta cordis vasa sanguine summo opere distenta fuerunt, auriculæ, venæ majores, & arteriæ: magis tamen venæ, quam arteriæ, turserunt. Resciso corde integrum thoracem sanguis inundavit. Cunctæ etiam thoracis membranae inflammatae splendidæque rubuerunt: thymi puta, pericardii, cordis, vasorum majorum & Pleura. Modica lymphæ copia in pericardio fluctuavit. Sinus encephali, sanguine maximam partem vacui, polyposas quasdam sanguinis concretiones rubicundas comprehenderunt. Cerebri venæ majores plexusque choroidis venæ modice repletæ fuerunt. Parciora etiam vasa rubicunda cerebri substantiam perforarunt. Nihil humoris vel sanguinis in cerebri ventriculos effusum fuit. Venosa vasa, quæ ex abdominis visceribus, intestinis v. c., omento, hepate, sanguinem revehant, majora sola modice repleta, minimæ vero venæ totæ depletæ fuerunt. Parca sanguinis copia in maximis truncis arteriosis stagnavit, parca etiam in venosis vasis extremitatum majoribus, parcissima in similibus arteriosis, nulla autem in minoribus, sive venosis, sive arteriosis, contenta fuit: musculorum itaque pallor conspicuus erat. Orificium uteri ea vi collum complexum fuisse, quæ venas non solum jugulares, sed & arterias carotides strinxerit, concludere ex dictis nobis licet. Ita factum est, ut affluens circa cor sanguinis vis collecta, parca autem per arterias vertebrales in encephalum promota fuerit. Descendens arteria aorta sanguinis copiam, quam accepit, in placentam expulit.

An nervi etiam, intercostalis, octavus, compressi cordis motum sustulerunt? Anatome nil docet. Neque enim in descripti pueri cadavere, neque in cadaveribus laqueo suspensis istos nervos mutatos vidi. Validam etiam atque a duro corpore profectam, ut to-

ta nervi actio tollatur, compressionem requiri, experimento (a) doctus sum. In cane enim vivo nervum phrenicum vossella strinxi, strictumque supra compressum locum irritavi, nullus diaphragmatis motus insecutus est. Dein eundem nervum digitis compressi, supraque compressionem lacessivi; contractum fuit diaphragma. In suspensis sine dubio fetibusque, quibus in partu collum stringitur, partes, quæ nervos ambiunt, nervos etiam perfectæ compressionis immunes servant. Ipse laqueus stringens nervos tangere nequit; musculus enim, quem sterno-mastoideum vocant, interjectus est. Neque etiam in descripti pueri cadavere, neque in cadaveribus laqueo suspensis istum musculum ruptum scissumque vidi. Solus ut plurimum in suspensis platysinamyoides læsus est vitiatusque. Ea propter autem nervorum compressionem ab omni culpa liberam esse non dixerim. In nostro saltem casu ob compressum valde elongatumque cranium cerebri etiam medullam compressam admodum fuisse dubium esse nequit. En itaque suffocationis speciem sine sanguinis in encephalo stagnatione.

Quamvis autem excitatus puer musculos commoverit, spiritum tamen non duxit: quare pulmo in vase alto: aquam continente, fundum petiit. Delapsus autem est pulmo, qui cum corde, vasis majoribus & thymo cohæsit, delapsus etiam solus & a dictis partibus resectus, quin quælibet minima pulmonum particula delapsa est. Pulmones autem in minorem molem contracti sunt, contracta pariter eorum vasa & color obscure rubicundus. Pulmones porro, cor, thymum & hepar per tres Maji mensis labentis dies, cum aër modice caleret, in aqua reliqui. Ita putredine vitiata viscera foetebant & aquæ innatabant. Notari autem velim non solos pulmones natasse, sed cor etiam thymum & hepar. Vasa quoque cordis coronaria aëre turgebant.

Meco-

(a) *Anne idem experimentum, alternum cordis motum propter alternam nervorum inter cordis vasa compressionem fieri non posse, si vel maxime nervorum inter ista vasa decursum concederemus, comprobatur?*

Meconium in ore, faucibus, œsophago & ventriculo hæsisse; ventriculum & intestina summopere contracta crassaque fuisse, colon solas meconii reliquias continuisse; rectum autem meconii fluidioris largiorem copiam; ventriculum nil præter parcissimam meconii quantitatem comprehendisse, & intestina materiam flavam, in globulos collectam, melli similem; felleam vesiculam bile plenissimam & urinariam lotio plenam fuisse; notasse non penitus infructuosum erit: neque etiam si ad tumorem capitis attentionem appellemus. Iste quidem medium ossis occipitis locum occupavit. Elatus maximam partem ab aqua albuminosa fuit, cellulosam cuti substratam distendente. Sanguinis globuli rubri cum isto sero commixti apparuerunt. Cutis quibusdam in locis livida fuit. Pericranii superficies, qua cranium est, pigmento nigro, quod cultello deradi potest, obducitur. Ossis occipitis superficies, cum particulæ pigmenti inhærentes detergæ fuerint, naturalis est, & sanguinea vasa osseas fibras distinguentia nitide apparent.

Antequam, quæ ex præcedente observatione confectaria derivari possint, exponam, similem aliam, quamlibet imperfectiorem, quod omnia momenta mihi persequi non licuerit, subjungam.

5.

Alius fetus in ipso partu denatus.

Femina triginta & duos annos nata ex partu lentiore, ad viginti & quatuor horas protracto, puellam enititur. Partus lentioris causam ignoro. Serius enim, cum mox puella extruderetur, accedens situm fetus naturalem, modicam capitis molem, nihilque peculiaris impedimenti notavi. Obstetrix, quæ coram matre confedit, obscuro sermone culpam in pubis os dextrum conjecit. Bona quidem probaque femina, sed ingenio cognitioneque rudis nec satis digna, cui committas primo partu mulierem (a). Infantem in partu demum suffocatum fuisse certum est. Sequentia ipse notavi.

Ante-

(a) *Terentii Andr. Act. I. Sc. IV.*

Antequam puella nasceretur larga meconii tenuioris copia e genitalibus effluxit, quem jam a pluribus inde horis effluxum se notasse testata est obstetrix. Insignis in capite tumor extitit. Natæ puellæ os hiavit. Candidum pallidumque totum corpusculum fuit, sola labia livida. Meconii copia os replevit, & e recto post partum egesta fuit. Nata puella neque os aperuit, neque, commota licet fuerit, suetum infantibus recens natis vagitum edidit. Cordis autem & funiculi umbilicalis vividum vegetumque pulsus notavi. Quamobrem, ut puellæ respirationem excitarem vitamque, omnem cum obstetrice lapidem movi. Scopulis fetaceis ista pedes, & aqua frigida corpusculum fricare vinumque genitalibus aspergere: quæ vero molimina per sex omnino horæ minuta prima irrita fuerunt. Interea quidem temporis cordis pulsus substitit, sed nullus infantis musculi commotus fuit. Inde plumula nares laceſcebantur, ita maxilla inferior convulsa est; naribus porro compressis halitus ori inflabatur, ita rursus convulsa maxilla est, convulsus etiam aliquoties diaphragma. Horæ quadrante elapso omnis in corde pulsus deſiit, nulla amplius convulsio inſecuta est, infans refriguit, riguitque.

Per omne hoc temporis intervallum placentam in utero, fuentemque cum puella & placenta perpetuum reliquimus.

Postridie puellæ corpusculum examino. Capitis tumor, istius ex superiore observatione similis, fontanellam dextram, inter occipitis, bregmatis, & temporum ossa medianam, occupavit. Solum vero thoracem fecare mihi licuit. Non solius quidem cordis auriculæ, venæ & arteriæ sanguine, ut in superiore observatione, ita turſerunt, ut nihil supra cogitari possit, sed pari etiam modo thoracis membranæ inflammatæ splendidæque rubuerunt, non aliter certe, ac si de industria minima etiam vascula repleta fuissent. Pulmones collapsi & contracti, pullo colore obscuriore distincti, molles, toti pone cor & thymum latent. Aquæ rubellæ parca copia, quam digitale comprehenderet, in pericardio fluctuavit. Pulmones, prouti in superiore observatione, toti non solum, sed & diſſi aquæ fundum petierunt. Mox a partu corpusculum licet palli-

dum candicansque ubivis fuerit, postmodum tamen variae cutis regiones lividae reddebantur; faciei puta cranique dextrum latus, integer colli ambitus, dorsi thoracisque pars superior, inferior alia dorsi particula & extremitates inferiores.

6.

Ex descriptis observationibus consecutaria.

Ex descriptis observationibus aliquot Medicæ artis momenta illustrantur.

I. Infantes artus & diaphragma motu agitasse, cor etiam pulsasse; ad respirationem autem vitamque revocatos non fuisse, pulmones itaque in aqua fundum petiisse, memorabile est. Multis, ni fallor, de infanticidio inquisitionibus forensibus ista observatio lucem affundit. Fatentur sæpius matres, quæ partum clam ediderunt, in quas de infanticidio inquiritur & de quibus partum expositum fuisse constat: fatentur inquam, natum infantem artus hos illosve commovisse, negant autem & pervicaciter negant se ullum aliud vitæ signum notasse, vel in propria viscera sævisse. Infantem autem sine valente vita artus commovisse & Iureconsultis & Medicis mirum ut plurimum phænomenon videtur, & vix a se impetrare possunt, ut ejusmodi feminam ab omni violentiæ illatæ culpa absolvant. Similem autem motum nihil pro constante, quæque mox sine violentia non finiatur, vita probare dictæ observationes, in quarum posteriore vel ipse cordis pulsus superfuit, demonstrant. Certissime potius liquet, fetum, ante partum qui vixit, in ipso partu quandoque ita suffocari, ut mox a partu quædam ultimæ vitæ minimæque reliquæ supersint, quæ vero, ut ultimi ignis consumto nutrimento fumus, in flammam vegetamque cum respiratione vitam restitui nequeunt. Quaecunque etiam descriptos infantes necauerint causæ perinde est: in partu eos suffocatos fuisse nobis sufficit. Earundem causarum in clandestino partu efficaciam nemo negabit. Quin, quod eiusmodi matres & recens nati infantes a nullo auxilio externo iuventur, frequentiores omnino ut sint, non est quod dubitemus.

bitemus. Externum enim in simili casu auxilium infanti nonnumquam servando par esse, infra ostendam. Primiparae plurimum sunt rusticae, vel aliae vilioris sortis feminae & laboribus exercitae, in quibus partes, quae fetus viam parant, rigidiores obstaculum opponere lentumque partum facere solent. Quodsi porro consideremus vaginæ orificii stricturam illam, ceu artis periti norunt, frequentiore non minus, ac alteram, quae ab uteri orificio fit, nisi natum caput auxiliaris manus prehendat celerique motu integrum corpusculum extrahat, periculosam esse: infantes sine matris culpa doloque in clandestino partu saepius perire non amplius demirabimur. Quis enim puellae, omnis de partu cognitionis ignarae, partus laboribus defatigatae, timore, terrore, pudore percussæ, istiusmodi operationem desert, quæ omne fere obstetricum plerarumque meritum complectitur, & de quo adeo obstetrices, (utinam & de pluribus possent) sibi plaudunt. Regeri quidem cum veritatis specie posset: dictis in casibus artis ope, externa irritatione excitatos, ut commoverentur, infantes fuisse, paria autem feminas clandestinum partum edentes moliri vix verisimile esse. Lubenter etiam fateor, ejusmodi matres minime animum ad excitandum fetum data opera appellere, inscias autem, quod minus exoptant, perficere. Dum enim fetus in terram delabitur, dum corpusculum prehenditur, dum removetur, dum in gramen conjicitur, vel succinctorio involvitur, ita, ut commoveatur, lacessitur. Neque quando conjectura huc me ducit, ingenii figmenta profero, sed quæ inquisitionem acta me docuerunt. Omnia inquisitarum asserta eo redeunt se, dum infans commoveretur, prehenderetur, projiceretur, artus commotos observasse. Istud ergo, concludo, momentum pro infanticidio nil probat,

II. Prolatis etiam ea, quæ Joannes Zeller de hoc argumento disputat *a*), minime adversari mihi videntur, quin potius fidem
facere

a) In dissertatione titulum præferente: Infanticidas non absolvit,
Pp 2

facere. Quodsi enim arctior plagularum limes ita ferret, medicasque controversias magis, quam observata complecteretur, quæque ex observatis non invita Minerva intelligi queunt; prolixius eundem id ipsum comprobare possem, Virique celeberrimi argumenta aestimare. Maltum etiam interesse arbitror, ut omne, cum de argumento adeo graui agimus, dubium remoueatur. Quamobrem specialiori disquisitioni istud argumentum seruo, in præsentiarum vero brevissimis monuisse mihi satisfacio, celeberrimum Virum signum de pulmonum infantis in aqua subsidentia impugnatum maxime iuisse; quod alieno, de vagitu uterino, infantisque recens nati ejulatu, testimonio nimis, quam argumenti dignitas grauitasque postulant, confiderit, fortioremque abdominis motum, qualis fere est equorum delassatorum, pro vera respiratione habuerit, deceptusque a præjudicata opinione, solum aëris ad pulmones accessum requiri, ut respiratio fiat, fuerit. Quæ enim infra a) dicuntur, vagina tectum vagitum, nedum utero, omnimode evertunt, fortiores vero abdominis motus, quod præsentis descriptionis observationes comprobant, irritum potius respirandi conatum, quam ipsam respirationem arguunt, minimeque, quod passim ex iisdem observationibus elucet, sola ad respirationem aëris spiritus præsentia sufficit.

III. Eadem de motu infantum sine constanti vita observatio, pertinaciam motus in musculis cordeque præcipue, quæ post mortis etiam plura pauciorave momenta stimulo externo obedit, optime in homine comprobatur, & vel ea propter notanda est, quod similes observationes, in brutis de industria excitatæ, quas experimenta vocant, frequentiores quidem sint, in homine autem rariores. b)

IV.

vit, nec a tortura liberat, nec respirationem fetus in utero tollit, pulmonum infantis in aqua subsidentia. Tubinga 1691. Ext. in Collection. Hallerian. T. V. p. 258. sqq.

a) §. 10.

b) *Huc sine dubio quadam historia spectant, quas BRUIERIUS*

in

IV. Pulmonum in aqua descensus minime fallax respirationis signum est, si modo sagax medicus delicti corpus secuerit: Neque etiam commoti infantis artus & subsidentes pulmones conciliari nequeunt; neque signum iste descensus ea propter dubium evadit, quod pulmones, qui spiritum nondum continuerunt, putridi aquæ innatant. Facilis enim distinctio est. Quando pulmones natant, & aliud viscus, cor v. g. vel hepar præceps datur, fetus spiritum duxit: pulmones vero cum natant, natat etiam cor, hepar natat, reliqua viscera natant, vasa coronaria aëre plena sunt, reliquaque putredinis signa observantur, de prægressâ infantis respiratione dubii sumus. Dictam hancce differentiam non solum ad superiorem observationem, sed ex pluribus aliis experimentis similibus didici. Putredinem autem corpora ita inflare, ut vel integrum corpus, nedum viscera aquis innatent, vel in vulgus notum est. Quæ ex re de fetus respiratione, pulmones licet examinati fuerint, ancipites hæremus, quando flumini lacuique innatans corpusculum repertum fuerit. Neque etiam a spiritu ori inflato pulmones inflantur dilatanturque, nisi aliunde fetus respiraverit. Neque adeo iste inflatus iudiciumque de pulmonum descensu dubium reddit a) neque feminam, clandestinum partum edentem, infantum excitatum aliquid experiri puto. Si adstantes id perfecerint, clandestinum penitus partum femina non enixa est.

V. Vehementer etiam vereor, ut quorundam, magni etiam nominis virorum, de prima respiratione hypothesis huiusque phænomena copula fiat b). Quod si enim ambiens infantis corpusculum

in Libr. supra laudato collegit. cf. maxime C. I. §. 2. n. 1. III. & IV. add. Cl. ZIMMERMANNI Diff. de irritabilitate. §. 48. p. 59.

a) cf. TEICHMEYER *Med. Legal. Cap. XXIV. p. 240. sq.*

b) *Unicum excitabo GE. BAGLIVUM Diff. IV. de sanguine & de respiratione. p. 454. 455. Dicit v. g. „Nam primo succedit*

lum aër propria elateris ponderisque vi pulmones inflaret, inflati-
que pulmones thoracem expanderent, cur idem non fieret in debili
fetu, moribundo, mortuoque? cur spiritus, naribusque compressis
additaque vi, inflatus id præstare nequiret? Anne potius vivus vege-
tusque fetus proprio conamine thoracem diducit, & diaphragma
deprimit? Ita enim pleuram inter pulmonesque vacuum paratur,
quod pulmonibus, ut elasticus aër gravisque irruere queat, liberta-
tem concedit.

VI. Ex descriptis observationibus cuipiam subnâsci cogitatio
posset: anne ejusmodi infantes in partu suffocati meliore artificio
in vitam revocari possent, si excitantium loco spiritusque inflatione
thorax nimia sanguinis abundantia a) liberaretur, sicque cordis
non modo contractio liberior, circulusque sanguinis expeditior fie-
ret, sed & thorax, ut moveatur aptius, pulmonesque ut dilatentur
perficeretur. Subnata mihi est cogitatio, & optimo cum successu
eadem ad refocillandum infantem usus sum.

VII. Ne quis vero existimet, descriptos infantes ex^rtumore
foran occipitis ipsa nascendi hora denatos fuisse. Ejusmodi tumo-
rem nunquam non elevatum observavi, cum vivus infans in transi-
tu obstaculo cuidam ovius sit; & non minus in iis notavi, qui vi-
vi etiam in lucem eduntur, ac aliis, qui in partu moriuntur. In
recens etiam nato infante sine difficultate lymphæ sanguisque resor-
bentur, & tumor dissipatur. Quoniam sola cranii integumenta oc-
cupat, lethum non infert.

VIII.

*„cedit aëris ingressus, deinde dilatatio thoracis. - “Fit vi-
„detur probabile, motum thoracis ab inflatis aëre pulmonibus
pendere.*

a) cf. W. SMELLIE, *Tr. of Midwifry*. L. III. C. II. S. II. n.
2. p. 327.

VIII. Neque etiam tumoris fugillationisve in capite præsentia violentam matris manum denotat. Ejusmodi errorem a medicis, (qui Physicorum titulo civitatum populorumque curam gerunt) Elogia Medica, quæ vocant, subministrantibus judici, in miserarum detrimentum vitæque periculum, committi aliquoties animadverti. Putant enim omnem in infante fugillationem omnemque livorem illatæ violentiæ indicia præbere. Capitis fugillationes tumoresve vivum solummodo infantem sub partus initium fuisse declarant, incertum autem relinquunt, utrum in ipso partu tumor natus fuerit, an a violenta matris post partum manu; quamvis illud multo sit frequentius, multoque, si unicam regionem tumor foedat, verosimilius. Raro fetus nascitur, in quo omnis a capite tumor absit. In solo infante vivo tumor nascitur, quod in isto solo sanguinis circulus, sine quo tumor efflorescere nequit, viget. Optimum adeo fetus ante partum demortui indicium præbet caput in partu lentiore quod in tumorem non elevatur. Corpusculi maculæ lividæ ex solo putredinis initio, ceu notissimum est, sine ulla violentia externa oriuntur, nullamque adeo matris violentiam probant.

IX. Suffocatos in mortis agone externorum æquæ musculorum, ac intestinorum convulsiones ut plurimum pati notissimum est in iis, quibus laqueus vitæ finem facit. Miseri enim artus contrahunt, faciei cutem vario modo torquent vertuntque, linguam ceu in cadaveribus observavi, inter dentes protrahunt, intestinum rectum vesicamque exonerant. Idem adeo in infantibus, quos partus suffocavit, fieri non demirabimur. Quamobrem in observationibus neconii excretionem effluxumque notavi, & in altero, cujus abdomen secui, fetu intestina arctiora contractioraque vidi. Vesica quidem depleta non fuit: causa vero comprimens quædam vaginam & urethram effluxum impedivisse potuit. Quo magis vero mortis timoremque anxietatem scybalorum excretionem promovere liqueat, notissimam in canicidiis observationem addam. Quum enim, ut organorum actiones in vivo conspiciantur, canum extispicia fiunt, timida animalia vel eo jam, quo, antequam lædantur, in
afferes

asseret firmantur, momento, certissime autem cum anatomicus cul-
ter accedit, fœdis suis intestini & vesicæ excrementis asseret con-
spurcant. Quin homines etiam & pleraque animalia, cum coërcen-
tur angunturque simile spectaculum præbere solent. Dicta quidem
eo scopo attuli, ut eo melius fetus in lucem edendos in mortis a-
gone meconium excernere istumque, cum fetus recte situs est, me-
conii profluxum mortuum fetum, vel saltem moribundum, debi-
lemque maxime, ceu infra patebit, indicare liqueat. Artis enim
peritos non fugere existimaverim, fetum clunibus præviis ex utero
expulsum meconium egerere, etsi nullus de morte metus adsit a)

X.

a) COSME VIARDEL *Observ. sur les Accouchem. C. IV. p.*
76. ait, se primum observasse, meconii effluxum infantis mor-
tem indicare. Suo tempore istud signum obstetricibus cogni-
tum fuisse testatur CHRISTOPH. VOELTERN. *Hebammenschul:*
C. V. n.º. 13. qui eadem cum Viardel tempestate vixit, po-
steriori nempe sæculi superioris periodo incipiente. Istud
quidem a Viardel propositum signum restrictione licet egeat,
culpari tamen nequit. Immeritus adeo Viardel ob istud si-
gnum MAURICELLI calumnias tulit, qui in *Tr. des Malad.*
d. femmes grosses &c. L. II. C. XII. p. 278. inter alia bene
multa scommata, turpia, abjecta, viroque indigna. Viar-
delii paginam, qua dictum signum præfert, Monstrum hor-
rendum, informe, ingens, cui lumen ademptum, vocat.
Restrungi autem id signum debet (1.) ad situm fetus natura-
lem. cf. DE LA MOTTE *Tr. des accouchements. L. III. Cap.*
XIII. (2.) Debilem fetum, sed in vitam revocandum æque
indicat, ac mortuum. cf. *infr. §. 8. n.º. 1. cf. & Comm.*
Lit. Nor. Vol. I. p. 155. Præter Mauricellum & alii, utut
male, istud signum negant. v. g. LEVRET. *Obs. sur les accou-*
chements laborieux. p. 100. Pluribus hoc signum illustrare
scopus vetat. cf. *obs. med. de partu laborioso Obs. XII.*

X. Solum meconium in ore, faucibus, œsophago & ventriculo, nil autem liquoris amnii, neque in dictis canalibus, neque in intestinis hæsit. Sequitur ergo; amnii liquorem non semper a ventriculo & intestinis comprehendi: massam a ventriculo contineri, pro qualitate ipsius nutritia nil probare: meconium ex amnii liquore non oriri; quamvis enim amnii liquor defecerit, copiosissimum tamen meconium rectum intestinum colonque repleuit, notabilis meconii copia licet expulsa fuerit. Fellea vesicula bile plenissima fuit, massulæque flauæ, melli similes intestina tenuia repleuerunt. Meconii ergo origo meliore iure ex bile, quam liquore amnii devatur. Magna etiam in embryonibus hepatis moles meconii copiarum par est. Me non monente liquoris amnii nutritiam qualitatem ab ejusmodi observationibus vacillare patet.

7.

Excitata, quam partus suffocavit, puella.

Infelix infantes superiorum observationum in vitam revocandi successus fuit. Minime autem de prospero successu semper desperare debemus. En observationem. Ex partu a) lento primoque puella nata mortuæ similis est. Artus sine motu laxi propendent, propendet etiam inferior maxilla, & cum elevatur sua sponte rursus decedit. Meconium corpusculum fœdat. Mortuam sine refectionis spe dixisses, ni cordis pulsus minimam vitam latentem denotasset. Ego etiam omnem vitæ spem nondum abiciens nihil intentatum

a) Ob solam in primipara genitalium resistantiam partus lentior fuit. Duravit per novem circiter horas. Per aliquot horas caput in vagina substitit: sinu vero externo dilatato protinus celeriterque corpusculum expulsum est. An ergo & cur sanguis in thorace stagnavit? An ab orificio uteri collum constri-
ctum est? Vix hoc factum mihi videtur, namque una cum

tum reliqui. Digitum itaque, ut fauces irritarem, in os ad epiglottidem usque demisi; inde fauces leviter circa digitum meum contractæ sunt. Nullum autem præterea vitæ signum edidit. Spiritum ori inflavi, ita spuma e naribus expulsa est. Naribus porro compressis spiritum ori inflavi: puellæ habitus nondum mutatus est. Interea temporis cohærens cum fune placenta in utero relicta mansit, ipsaque puella cum fune perpetua. Aliquot postea a partu primis horæ minutis præterlapsis funem perscidi, sicque, quod funiculum non deligauerim, sanguinis rivulo ex infantis umbilico effluxum paravi. Summa vi sanguis, ad dimidii saltem pedis distantiam, propulsus est, eodemque momento excitata puella artus abdomenque commovit. Nondum respirat. Propendentem ex umbilico funem, ne nimium sanguinis profluat, deligo. Abdomen deinde comprimo: ita rursus abdomen contrahitur, motuque spastico thorax agitur, nislum respirationis puella & vomitum edit. Ortum a mucosum sonum audio. Abdomini inde puellam impono, naresque aliquoties plumula titillo: ita mucus ex ore effluit, leveinque spiritum decimo & tertio a partu horæ minuto primo puella ducit. Nondum vagitum edit: tenuis modo respiratio est, & validius a mucosuspirium. Calidum theæ potum instillo; excitatur ulterius & quatuor a prima respiratione minutis præterlapsis tenuem vagitum edit. Theæ

capite celeriter corpusculum extrusum est. An ob mucum pulmones obruentem? Anne potius ob modice compressum collum in cerebro sanguis stagnavit? Hacce conjectura minus difficilis est. Forsitan enim compressum cranium, modiceque ab uteri orificio constrictum collum medullæ cerebri non solum compressionem, sed & sanguinis in encephalo congestionem effecerunt. Cum hac saltem conjectura ipsa partus ratio & præsentaneum hæmorrhagiæ auxilium optime conciliari possunt. De mucosus infra differam. Similem excitati pueri, quem mortuum esse crediderunt, observationem recenset HEISTER Diff. de partu mirabili in somno matris profundo. p. 8.

Theræ potus continue instillatur; puella aqua calida fovetur: ita sensum vires recipit. Aliis quatuor minutis interjectis oculos aperit, aliisque tribus vagitum validum, qualis a vegeto infante provenire solet, edit, inucumque copiosum rejicit. Inde recte valuit adolevitque.

8.

Ex præcedente observatione confectaria.

Plura quidem descripta observatio nos docet.

I. Quæ supra de meconii in agone mortis excretionem differui, confirmantur. Moribundam enim puellam meconio se liberasse meconii copia corpusculum foedans patefecit. Moribundum autem debilemque fetum, qui in vitam revocari potest, æque ac mortuum, ista excretio indicat.

II. Suetæ irritationes suffocato fetui vitam non semper reddere possunt a). Id superiores æque ac præsens observatio comprobant. Thorax vel cerebrum sanguinis abundantia liberari debent, quod quidem sanguini ex umbilico effluxum concedendo optime perficitur. In suffocati vicissim fetus thorace vel cerebro sanguinis copiam colligi patet. Pari auxilio suspensos refocillari constat b). Neque muci ex ore eliminatio negligi debet c). Neque aliquid pro refocillando fetu auxilii placenta ex funiculo cum fetu perpetuo pendens d) ferre potest, neque etiam si in utero placenta relinquitur. Cum primum enim infans natus est omnis placentæ virtus mox cessat, pars inuti-

a) *Me suctionem mammarum, quæ in Ephem. Nat. Cur. Decur. II. An. V. Obs. 121. An. VI. Obs. 69. & An. VII. Obs. 67. commendatur, in meis periculis neglexisse, doleo. cf. & BRUIER. lib. laud. P. II. C. IV.*

b) *cf. BRUIER. lib. laud. P. I. C. I. n. XXV.*

c) *De hoc argumento infra differam.*

d) *Ita suadet SMELLIE Tr. of Midwifery S. VI. no. I. p. 225. qui & reliquos reficiendi modos recenset.*

inutilis placenta evadit mortuaque a). Imaginatio fetus sunt & mera figmenta, qui ex placenta in fetum spiritus propagari produ-
cique, vel instaurantes sanguinis circuli putantur. Neque calidæ
aquæ, cerevisiæ vel vini spiritus demersa placenta haurit b). Ne-
que spiritus in os inflatio proficua semper est c). Thorax, antequam
pulmones expandantur, ut dilatetur, necesse est. Efficaces de-
mum, cum a sanguinis abundantia liber est fetus, irritationes ob-
servantur. Narium fauciumque titillationem cum calidi potus in-
stillatione reliquis præferrem. Has enim abdomen thoracemque
præ reliquis excitare me non monente liquet.

III. Superius §. V. n^o. I. de infanticidiis assertum confirma-
tur. Puella enim, antequam respirauerit, commota iam fuit, vix-
que, nisi varia molimina, quæ a femina clandestinum partum eden-
te postulari nequeunt, tentata fuissent, cum vita in gratiam rediisset.
Descriptæ adeo observationis fetum in vitam revocatum fuisse puel-
las, quæ infanticidii arguuntur, in maiorem commissi animo deli-
berato homicidii culpam suspicionemque conicere nequit. Ad me-
liorem autem istius argumenti intellectum certioreque plurium ca-
sum determinationem intelligi velim: casum me femina, clande-
stinum partum enixæ, in adversaria retulisse, quæ tunc demum
temporis natum infantem, sine ulteriori vitæ signo, sinistram suam
brachium ter motu agitasse asseruit, postquam rescisso funiculo mo-
dica sanguinis ex umbilico infantis copia effluxit. Qui quidem for-
tuitus casus cum meo experimento deliberato optime conspirando
mirus esse desinit.

IV.

- a) cf. *Comment. de Communic. uteri gravidæ & placenta in Socie-
tatis Gottingens. Comment. T. III. p. 397.*
- b) Ita suadet IOH. VON HOORN. *Siphra & Pua. P. II. C. IX. ubi
& alia refectionis adminicula proponuntur.*
- c) cf. *Medical Essays and Observ. T. VI. n^o. LV. p. m. 108. BRU-
IER. lib. laud. P. I. Cap. I. n^o. 28. & Cap. IV. §. 3. VON
HOORN. l. c.*

IV. Superiora etiam §. VI. n^o. IV. de prima respiratione notata confirmantur. Certissime enim, nisi omnia me fallunt, thoracis motum & respirationis nisum prius notavi, quam aër in pulmones irruerit. Expansis adeo thorax dilatandis pulmonibus facultatem concessit.

V. Ex fune umbilicali, qui non deligatur, infans utique hæmorrhagiam pati potest: ligandus adeo funis ex parte infantis est, nisi quidem hæmorrhagia ipsi pereundum sit a).

VI. Maxillæ inferioris spontaneus, elevetur licet, lapsus, mortis signum non præbet. Propter solum vero pondus, laxatis musculis elevatoribus, inferior maxilla delabi potest, quare vel nulli requiruntur musculi detrahentes, vel saltem debiliū etiam actio sufficit.

VII. Anne civium saluti satis consulitur, quando obstetrix infantem ab uteri natura propulsum excipere & fasciis involvere didicit? Anne casus incidere possunt, in quibus medici, qui morborum causas cognoscit, promptum auxilium requiritur? Anne dum obstetrix incerta molimina tentasset, Medicusque, ut infantem in vitam revocaret, arcessitus fuisset, descripta puella debilem & irrevocabilem vitam amisisset.

9.

Primæ respirationis ratio.

Frequens omnino infantum recens natorum, quæ excitationem requirit, debilitas esse solet. Optima quidem communissimæque,
qua

a) Alio loco instituta, ut hoc argumentum illustretur, experimenta recensebo. cf. interim IO. H. SCHULZE Diss. an umbilici deli-

qua infantes recens nati primo mox momento, quo expulsi fuerunt, vagitum edant, viresque demonstrent, regula est: quo quidem in casu protinus vagiunt, ita ut discernere nequeamus, an primus thorax commoveatur, an aër primus in pulmones irruat? Sæpius tamen infans recens natus mox a partu, sine aëreo spiritu mortui speciem præ se ferens, minuto demum temporis vel pluribus interjectis thoracem agitat, spiritum ducit, vagitum edit, eundemque vel spontaneum, vel artis ope excitatum. Inter quinquaginta & quinque fetuum vivorum partus, in quibus ad primam respirationem attentionem adjeci, septem decies istud certissime observavi. Ex facili etiam una alterave observatio mihi sese subducere potuit ob externa, quæ partus tempore frequentia sunt, matris, temporis adstantiumque impedimenta. Istis vero in casibus, pari ut in superiore observatione modo, sine omni fallacia animadvertere mihi datum fuit, respirandi nifus, vomendi conatus, thoracis agitationes aliorumque musculorum motus ipsam respirationem & vagitum prægressos fuisse. Thoracis utique dilatationem priorem ab aëris inspiratione posteriore optime distinguere mihi licuit. Non amplius itaque hæsitaverim primam fetus recens nati respirationem thoracis agitationi adscribere, eandemque spontaneo aëris in pulmones influxui denegare. Quin, si solus aëris elater solumque pondus pulmonibus thoracique dilatandis paria sunt, cur idem ipso eo momento, quo infantis os nasumque aër contingit, non præstant? quid temporis opus est? quid incitationis artificialis? Lubentius sane istam hypothesin a) amplecti deberemus, qua in ipso partu tota corpusculi superficies ob archissimam compressionem irritatur, eo quidem consilio, ut natus infans omnes musculos agitet. Quodsi hoc fit, non potest non thoracis musculos & abdominis simul ita movere, ut

gatio in nuper natis absolute necessaria sit: Hal. 1733. II. PH. AD BOEHMER. Diff. de necessaria funiculi umbilicalis deligatione. Hal. 1745.

a) cf. BOERHAAVE *Præl. academ. T. V. P. I. p. 162.*

ut thorace dilatato pulmones expandantur. Istorum vero motuum, cum obstaculum non obicitur, celeriter ipso partus momento sese insequentium prompta successio non discernitur, quæ vero, quando thoracis dilatationem aërisque irruptionem impedimentum moratur, obscura esse nequit. Quædam istorum impedimentorum narratione mea delibabo:

Præter graviores, mortemque, ni promptissimum auxilium feratur, certissime inducentes, suffocationes, (de quibus supra dis- serui) levior quæ a funiculo umbilicali fit, colli constrictione partus- que retardatio in culpa sæpius esse solent. Nec minus respiratio- nem a partu aliquoties sola cranii in partu compressio retardat. Isto quidem in casu venæ jugulares arctantur, sanguinis ex cerebro re- fluxus impeditur, in cerebri vasis sanguis coacervatur, cerebri me- dulla comprimitur, nervorum actio a) imminuitur, priusque re- spirationis muscoli non agunt, quam a partu, liberato collo, san- guinis copia e cerebro reflui potest. Ita liberata medulla respira- tionis muscoli contrahuntur. Musculorum autem actionem ea pro- pter impediri, cordis in ejusmodi casibus debilior, quem observavi, motus comprobatur, quique una cum respiratione incitatur demum. Sanguinem in capite coacervari, ex livore, quem in ejusmodi fe- tum facie aliquoties observavi, ulterius cognoscitur.

Quum cranium in partu compressum fuerit, medulla etiam ce- rebri comprimitur, similiaque ac a funiculi constrictione symptoma- ta oriuntur. Levia vero ut plurimum sunt ista impedimenta, sua- que fere sponte solvantur, si modo finito partu comprimens causa cesset. Quapropter etiam sine externo auxilio istiusmodi infantes refocillantur: præcipitatur modo resectio nervorumque actio incita- tur, si a partu irritans auxilium accedit.

Notasse hic loci juvabit, funiculi circa collum contorsionem
in minus

a) De nervorum in collo compressione supra disputavi §. 4.

minus pro infante periculosam esse, ac prima specie cuiusdam videri posset. Rarius omnino ex ea infantes pereunt. Unicam ante aliquot annos in adversaria mea mortui ob funiculi constrictionem in partu observationem fetus retuli. Inter septemdecim supra notatas observationes binæ modo in funiculum umbilicalem culpam conjicere possunt. Interea enim temporis, quo ad primam infantis recens nati respirationem animum appuli octies funiculum circa infantis collum constrictum observavi. Quinque infantes ipso finiti partus momento vagitum ediderunt, his per aliquot minuta ob collum in partu constrictum quieverunt, semel respiratio ab oris mucositate impedita fuit in infante, cui partus tempore funiculus collum ambiit. Præter vero binas istas funiculi compressiones ex septem decim observationibus dictis septem ad cranium compressum, partum lentiores similemve causam pertinent; una ad nates prævias, tres ad pedes prolapsos *a*), ex quibus bini gemelli eodem partu extracti sunt; alia supra exposita sanguinis partim congestionem, & tenacis partim muci repletionem debetur; tres reliquæ tenacem oris mucum incusant. Sexies in istis casibus sua sponte infantes minori temporis, horæ quasi minuti dimidii, integri unius alteriusve, a partu intervallo præterlapso respirarunt; semel nempe cum collum a funiculo fuerit constrictum, & quinque cum compressum caput fuerit. Reliquis in casibus artis auxilium accessit. In compressi quidem cranii, constrictique colli reliquis casibus sola manus profunda in os, ut fauces irritarentur, demissio suffecit. Suffecit in præviarum natum partu, quo quidem in casu nata puella non solum ante irritationem artus commovit, sed & oculos aperuit. Post irritationem demum thoracem & abdomen agitavit, istaque agitatione peracta spiritum duxit.

- a) Fetus, qui in partu præternaturali, quo nates pedesque prævii pertinent, pedibus extrahuntur, ob compressum maxime funem umbilicalem animo linqui notum est. Quin necatos inde cum artis obstetriciæ magistris punctiones observavi. Istud quidem obiter, quod cadaverum sectiones faciendi occasio non ita ferebat, indico.*

xit. In primo, quo pedes prolapsi sunt, casu lentius negotium, quod eo tempore faucium nariumque irritationem neglexi, gerebatur. Puella enim extracta mortuam specie referebat. Languidior tamen in funiculo pulsus cum leni oris motu superfuit. Debiles sine respiratione & spasmodici thoracis motus insecuti, vehementioresque a frigidae aquae lotura facti sunt. Pedes porro fricati sunt spiritusque ori inflatus. Ita puella excitata spiritum duxit vagumque edidit. Natis gemellis oris mucus expurgatus est, digitus in fauces demissus, orique spiritus inflatus, ita manifestissime cum aliis musculis thoraces conuulsi sunt, spiritusque deum insecuti. De sanguine e funiculo mittendo supradictum est. De mucos eluendo infra differetur.

10.

Fetus in Vagina respiratio.

Fetum capite nato, antequam excludatur, respirare nonnumquam, moxque emori, quorundam sententia est a). Quin idem in ipsa vagina fieri alii asserunt b). Solum enim aeris accessum, ut fetus spiritum ducat ex hypothese supra citata, sufficere putant. Aer etiam fetum capite natum vel morans in vagina caput tangere potest. Caput in vagina morari frequentissime accidit, neque obstaculum nato capite corpusculum, quod retinet, infrequens est, quin multe frequentius hoc evenire certum est, cum femina sine externo adminiculo clandestinum partum edit. Nihilo tamen secius vaginales ejusmodi capitisque nati respirationes fieri non posse censeo.

a) cf. III. TEICHMEYER. *Med. Legal. Cap. XXIV. p. 241. Anilis historia de ploratu foetus in utero est in Eph. N. C. Cent. I. Obs. L. p. 121.*

b) I. H. CROESER. cf. III. HALLER. *Method. Stud. Med. Cap. V. p. 325. & Gotting. Zeitung. von Gelehr. Sachen. A^o 1748. n. 58. p. 492.*

cenſeo. Respirationi aëris accessum solum non sufficere, sed liberam thoracis abdominisque dilatationem requiri, supra euictum est. Quamdiu vero thorax cum abdomine, post amnii liquoris effluxum, a genitalibus comprehenditur, nullus expansioni locus est: arctissime enim ista circa contentas partes constringuntur. Thorax abdomenque laxa modo sunt, dum amnii liquor suis velamentis inclusus, omnem aëris accessum arcet. Sed prodeat experientia litemque dirimat. Tantum abest, ut fetus solo capite natus, vel ad pudoris sinum propulsus respiret, ut potius, ceu supra vidimus, saepius infantes nascantur, qui mox a partu spiritum trahere nequeunt. Existis quidem tres per aliquot horae minuta capite, antequam corpusculum insecutum sit, nati fuerunt; idque propter latos humeros, puerse sitos, funiculumque collum retrahentem. Istos autem fetus debiles fuisse respondebis. Concedo, sed quid inde emolumenti in defensionem thesin redundabit? De casu legali, ubi mox a partu debilis fetus (qui ex hypothesi in vagina respirauit) emoritur, emortuique (ex eadem hypothesi) pulmones natant, quaestio est. Debiles autem fetus, quosque partus suffocat, mox a partu, nedum in partu, spiritum non ducere demonstratum iui. Omne vero, quod reliquum manere posset, dubium frequentes, a me obseruati, casus praecidant, ubi sine vilo vitae, nedum respirationis signo (ut vel adstantes mortuum esse fetum iurauerint) fetuum, qui nati extemplo cum vigore vagituque respirarunt, capita per notabile temporis interuallum ex genitalibus pependerunt. Nunquam etiam non fetus in partu haerens effluxo amnii liquore mortuum externa specie refert: integrum corpusculum compressum quiescit, nullumque eius motum mater sentit.

II. *Fetuum a muco suffocatio.*

Alia suffocationum, de quibus agendum mihi proposui, species superest. En obseruationes.

Prima

Prima. Ex partu tertio, in septimam horam protracto, puella nascitur: collum funiculus ambit; puella quidem debilis est, mox tamen respirat: respirat autem cum difficultate, suspirio ronchoque, ita ut aerem mucosum irretitum esse auribus percipiatur. Quare mucum ex ore soluo, respirationemque iuvo.

Secunda. Alia femina ex secundo partu, in septimam horam itidem protracto, puerum parit. Oculos quidem gnatus aperit, nullum autem vagitum edit: qua ex causa digito profunde in fauces demisso mucum soluo. Ita nunc vagit. Capite dein ad latus inclinato notabilis muci ex ore quantitas effluit.

Tertia supra §. 7. exposita est.

Quarta. Naturalis quidem pueri partus est, vixque quatuor horis circumscriptus: neque tamen, cum extractum est corpusculum, vagitum puer edit, neque oculos aperit. Antequam nascatur puer, nil amni liquoris effluit, cuius rapidus torrens puerum insequitur. Caput licet subito propulsum sit, difficilius corpusculum soluitur. Nati pueri, ut mucus eliminetur, in ore digitum agito. Mucosus digitus obuius non fit, digitum fauces comprimunt, ipse puer immotus caeteroquin manet. Calidae balneo puerum foveo funemque secundo. Sanguinis quidem rivulus profluit, puer autem non excitatur. Calidam ori instillo, digito aliquoties fauces stimulo: digitum fauces premunt, puer ipse sine motu iacet. Pedes frico: pedes puer retrahit, spiritum non ducit. Plumula nares titillo: cum abdomine thorax valide conuellitur agitaturque. Ita abdomine thoraceque aliquoties agitato, praeterlapsoque a partu horae quadrante primum spiritum ducit, spiritum autem debilem, sonorum, suspiriosum, quidem cum roncho moribundi trahunt, ita quidem, ut quavis expiratione suspirium edat stertatque. Vagitum nondum edit. Mucum pulmones oppleret non amplius dubito, vomitum, qui thoracem valide comprimeret, violentam abdominis agitationem, parumque expirationem exopto. Quare

plumula profundas fauces laceſſo: ad vomitum niſus licet excitetur, ipſi vomitui tamen parem non eſſe animaduerto. Lapſa a partu hora ex balneo puerum extrahi, calidis linteis inuolui, & nares faucesque plumula irritari curo, ſed fruſtra. Adſtans nicotianæ fumum, compreſſis naribus, ori inflat: ita ſine vomitu vomendi niſus excitatur. Simili ſucceſſu idem iſto fumo inteſtinum rectum replet. Continue deinde puer leniterque agitatur. Sub agitationem oculos aperit, cum quietus reponitur palpebræ clauduntur. Porro, vt nihil pro vomitu excitando reliqui maneat, calida aqua ſaccharo ſatura & oxymel ſquilliticum per internalla inſtillantur. Omne ex ore rurfus effluit, vixque aliquid deſcendiſſe videtur. Id tamen præſtat, vt vomendi conatus denuo oriantur, ſono fortiore, auſtiori & cum ſtrépitu quodam puer reſpiret. Ipſe vomitus fruſtra expectatur. Tertia quaſi a partu hora fetus in abdomen reſpoſitus hinc inde agitatur. Ita mucus ex naribus copioſus effluit, ex ore nullus. Agitatione continuata vberior mucī copia effunditur. Vt requieſcat puer, per internalla in dorſum reponitur. Tandem, puer licet agitetur, neque mucus amplius effluit, neque maior reſpirationis vis excitatur, neque ſonus ſuſpirioſus ſterrensque ceſſat, quare puerum quarta a partu hora faſciis inuolui & calido lecto iuxta matrem foueri curo. Ita integram noctem inter debilem tenuemque reſpirationem tranſegit, donec duodecima a partu hora mortuus ſit. Per breue vitæ tempus thoracis motus cordisque pulſus non obſcuri fuerunt; cutis orisque labia pallida manſerunt, calidis etiam linteis toti corpufculo calor communicari non potuit, hæc mox, mox illa corpufculi pars frigida fuit.

Mortis cauſſam indagaturus ſectionem inſtituo. Velum palatinum cum viula ad palati offeio fornicem totum reflexum hæret, dorſumque linguæ ad eundem fornicem ita eleuatum, vt aëris via per os elauſa ſit, ſolaque altera per nares aperta hiet. Qua ex re factum eſt, vt nihil mucī ex ore, inſignis autem ex naribus copia effluxit.

effluxerit. Pari ratione per solas nares tenuem suum spiritum duxit. Plumula enim naribus admota licet commoueatur, alia ante os posita immota mansit. Sed redeo vnde digressus fui. Epiglottis tota erecta glottidem apertam linquit. Larga muci copia in posterioribus naribus faucibusque haeret. Liquor etiam spumofus integram asperam arteriam bronchiaue replet. Minus hic liquor, ac ille in faucibus naribusque stagnans tenax est, fila, ceu ille, non trahit, sed aëreis bullis copiolissimis remixtus & insipidus est. Pulmones etiam integros similis spuma albicans replet, quae cum pulmo inciditur, vel aspera arteria, copiosa exprimitur. Nonnullis in locis spumae sanguis immixtus est. Integer pulmo & in frustra resectus natat. In pulmonum superficie quadrangulares lobuli distinguuntur, quorum latus lineam aequat, substantiam aër, in omnem particulam effusus, iussat. Istorum lobulorum alii ex coeruleo-lividi sunt, alii a sanguine effuso rubelli.

Aqua haescente, modiceque salsa pericardium repletur. Cor cum sanguineis vasis maioribus sanguine, in nigricantem massam coagulato, plenissimum fartissimumque est.

Mollissimum cerebrum est, humidum, seroque perfusum. Copiosissimo sanguine plexus choroides turgescit. Cerebri ventriculi aqua rubella, in qua sanguinis globuli effusi apparent, replentur, sanguinisque quantitas insignis in ventriculorum fundo fluctuat. A dissectione ortum sanguinem non fuisse certus scio.

Ventriculus insipido humore, tenaci, fila trahente ebrius est. Intestina eiusmodi humore vacua sunt. Duodeni regio, quae ductum choledochum recipit, pulpa viridis parcam copiam continet. Similis pulpa in sequenti intestino cinereo colore distinguitur, rursusque interposita aliquot pollicum distantia pallide viridis sit copiosaque. Eiusdem in sequenti intestino copia sensim augetur, color

lor intenditur massulaeque peculiare colliguntur. Intestinorum istis in regionibus parietem tenax mucus inungit. Parcissimam meconii copiam colon dextrum comprehendit, eaque lege contractum est, ut in copiosissimas rugas longitudinales plicatum sit. Pari modo dexterio transuersi coli pars se habet. Sinisterio vero pars meconio sensum magis repletur. Sinistrum colon cum recto intestino meconio, caeterum naturali, ita expanditur, ut octo saltem pedis rhenolandici lineis diameter equiparari possit. Intestina tenuia aer inflat. Cardia laxa & pluribus rugis longitudinalibus aspera est. Sinistra coli flexura, quam S. Romanum vocant, ita a sinistra regione ad dextram inflexa est, ut tota, antequam sinistra versus in peluim reflexa descendat, super dextro ilium osse haereat a). Magnum, ut esse solet, hepar & ad lienem protentum, felleam vesiculam ante suum marginem anteriorem exigit cylindricam, longam, bile viridi, mucosa maxime tenacique plenam. Ductus etiam hepatici viridem bilem comprehendunt. Vrinariae vesicae, contractae lotioque vacuae, crassissima tunica est. Vesicam natus puer leuauit b).

In ossibus bregmatis, dextro praecipue, liuidum insignis amplitudinis spatium est, quale a stagnante sanguine formatur.

12.

a) Idem fere *Gel. WINSLOW* aliquoties obseruasse videtur. cf.

Expos. Anat. de la str. du Corps humain. T. III. no. 155. p.

m. 338. cf. Fetus Parasitici descriptio in Societat. Gotting.

Commentar. T. IV. S. I. no. VII. p. 148. not. a.

b) In hoc aequae, ac aliis pueris, in partu suffocatis, scrotum

muci plenum obseruanti, tenacis, flavescentis, qui cum infi-

ma scroti cellulosa in cohaerentem gelatinam coalescit,

cf. §. 13.

Ex descriptis observationibus confectaria.

I. In descriptis observationibus mucum os, fauces, nares, tracheam, pulmones ventriculunque repleuisse certum est. Vnde vero is mucus oriatur quaestio est? Potest ex istarum partium membranis secretus, potest etiam in os fetus naresque propulsus fuisse. Prius a) lubenter existimarem, nisi summa mucii copia collecta aliud suaderet. In omni utique fetu humor membranas inungens fecernitur colligiturque, ea vero copia, quae in descriptis observationibus oblata est, rarior observatur. Nimis etiam is humor tenax est, quam qui ex mucosis embryonis folliculis secerni possit b). Parcissima eius quantitas, quae solos parietes oblinat, in intestinis reperitur c). Maiori itaque cum veritatis specie ab amnii liquore, in dictas cavitates depulso, derivari potest. Ita sane summa quantitate colligitur, ita ultra ventriculum in intestina non promouetur, ita tenacitatem, colorem reliquasque qualitates cum amnii liquore communes habet d).

II. Fe-

- a) Plura curiosa, ut mucum istum in embryonis pulmonibus secerni comprobet. PETITVS affert in Mem. de l'Acad. Roy. d. Sciences. A°. 1733. n°. I. p. 1. sqq. Ob dictas vero rationes in Petiti etiam observatione humorem spumosum amnii liquori tribuerem.
- b) Embryonis sanguinem secretosque ex sanguine humores tenuiores esse notum est. Mora quidem habitum spissat, sed quantitatem etiam minuit.
- c) Cur copiosus in ore, faucibus, naribus, trachea, pulmonibus ventriculoque mucus esset, parvus autem in intestinis?
- d) Amnii liquorem in ventriculo plures inuenerunt. cf. Prael. Boerhaau. T. V. P. II. p. 349. In embryone etiam vitulino id observavi. cf. Diff. de fetu perfecto. §. 13. ext. in Collect. Haller.

II. Fœtum adeo a liquore amnii nonnunquam suffocari colligi potest. Summa symptomatum, quæ in aqua (§. I.) submersis & suffocatis a liquore amnii fœtibus observatur, convenientia negligi nequit. Liquor in os, nares, pulmones ventriculumque descendit, hic loci subsistit neque in intestina penetrat. A liquoris etiam irrumpentis vi sanguinisque in pulmones influentis nisu simili modo in pulmonum substantiam sanguis effunditur. Ob similem ex cerebro refluxum impeditum, ceteri in aliis etiam suffocatis (§. 2.), serum sanguisque in cerebri ventriculum erumpunt.

III. Ille vero mucus, æris vias claudens, eiusdem in pulmones irruptionem impedit; quare haerens in ore solvendus est a), pulmones etiam opplens expiratione fortiori expellendus. Eiusmodi expirationem ut excitarem omni modo annisus sum. Ut thorax agitato pulmones compellat abdomen compressi vomitumque excitare studui. Similibus artificiis ii, qui in submersis præcipuam mali causam oppletis pulmonibus tribuunt, vsi sunt b). Irritus autem successus fuit. Summopere adeo verisimile fit, iis submersorum, quorum pulmones aqua farcit, parum spei reliquum esse.

IV. In submersis quidem aqua inspirandi nisu aquam in pulmones attrahit ventriculumque. Similem nisu embryoni tribuere nollen.

Nondum enixa capra est, dum ludit in ædibus hædus c).

Quare

Haller. T. VII. p. 322. add. IO. VESLINGII Syntagm.

Anatom. Cap. VIII. p. 120. IO. NIC. WEISS. Observ. Anatom.

1740.

a) cf. I. v. HOORN Siphra & Pua. P. I. C. XV. p. 61.

b) cf. Cl. EVERS Diff. laud. S. III. §. 44.

c) Αἰὲς ἐπὶ τῆτονεν, ἐπεὶ ποσ δ' ἐπὶ δώματα παλῆει. ANDR. SCHOTTI Proverbior. Zenobii Centur. I. n°. 42. p. 15.

Quare citata in dissertatione violentam, quae ab vteri contractione, musculorum fauces atque cardiacam fetus claudentium actionem superante proficiscitur, amnii liquoris detrusione fieri putavi. Quam quidem coniecturam descriptae observationes comprobant. Quodsi enim amnii liquor a fetu pro nutrimento per gestationis tempus deglutitus fuisset, cur idem in ventriculo immutatus manserit? cur in ore, naribus, faucibus haeserit? cur pulmones oppleuerit? cur in intestina promotus non sit? non perspicio. Quae enim deglutuntur, neque in ore, naribus faucibusque morantur, neque in asperam arteriam descendunt: sed in ventriculum detruduntur, detrusa mutantur, mutata in intestina promouentur. Notissimae hae veritates physiologicae mea demonstratione non egent. Nil vero ante fetum amnii liquoris effluxisse, rapidissimum autem torrentem insecutum esse utique memorabile etiam est. Simplicius adeo multo mucus iste mox ante finitum partum, quando integrum pelvis ostium fetus caput obturat, ab amnii liquore, pone fetum in vtero contento, in os naresque violenter propulso, viasque violenter, sine consilio delectuue, aperiente, oritur. Ita nulla in explicando difficultas superest. Ita qua data porta mucus irruit, in pulmones aequae, ac ventriculum. Ita immutatus reperitur. Ita noxius esse potest. Ita, ut infans spiritum ducere possit, ex ore faucibusque remouetur. Ita a recens nato infante vomitu reiecitur. Specialiorem quidem attentionem ultimum momentum meretur. In citata dissertatione istam observationem iam vrsi: nunc vero post repetita experimenta eandem summo opere confirmatam video. Prouti enim descriptis in casibus eiectus ad expediendam respirationem mucus est: ita copiosis aliis in infantibus, in quorum solos ventriculos descendit, istum mucum primo a partu die, sua sponte antequam alimentum vel medicamentum datum fuerit, vomitu reiectum notavi, incertis quidem a partu temporis intervallis, simplici alias nisu, alias repetito. Bono itaque consilio suadent solentque Medici, solco & ipse, istius expulsionem, nisi sua sponte reiectio contingat, ut

S:

malis

malis inde oriundis praeuertatur *a)*, arte promouere. Quo itaque jure, quaeso, mucus, ventriculorum vomitu subuertens, noxius, *b)* artisque ope expellendus, nutricius vocari potest?

V. Liquor, quem pulmones comprehenderunt, spumofus potius, quam tenax fuit. Ratio facilis est. Humori mixtus & agitatus aer soluta tenacitate spumam fecit.

VI. Specimen fetus, qui, respirauerit licet, longam tamen vitam, sine omni matris culpa, protrahere non potuit, descripta observatio exhibet. Quin, si suffocatum amnii liquore, fetum, per aliquot horas qui respirauit, cuius adeo pulmones natant, spumosoque fluido pleni sunt, femina clandestinum partum edens in fluuium lacumue coniecerit, omnia infantis in aquam demersi signa comparent, feminamque infanticidam sine omni dubitatione produnt. Nihilo tamen secius eiusmodi infantem, praeter matris culpam, amnii liquor suffocauit. Quanta itaque cautela variorumque casuum cognitione opus sit, ut ex facta corpusculi sectione ad commissum homicidium concludere Medicus possit, delineatus acque casus ac superiores luculentissime demonstrant. Nimis autem, pro-

a) cf. MAVRICEAV *l. c.* P. I. L. III. Cap. XXIV. p. 472. ISBR. DE DIEMERBROECK *Anatom. L. I. Cap. 31. p. 222.* CORN. STALPART VAN DER WIEL. *Obs. rarior. Medd. Chirurg. Cent. Post. Obs. 32. p. 318. ed. Belg.* BOERHAAVE. *Amphorism. de cognosc. & curand. morbis* n^o. 1340-43. p. 250. IOHN MAVBRAY *Female Physician. S. VI. Cap. IX. p. 333.* CEL. MONROO. *Medical. Essays T. II. Comm. XI. §. XIII. p. 214.* HALLER *Pracl. Boerhaau. T. V. P. II. p. 350. not. r.* IO. CHRISTIAN THEMELIVS in *Comment. Med. de nutritione fetus in utero per vasa umbilicalia* §. 26.

b) In amnio felis liquori remixtum meconium inuenit BUFFON. *Hist. Natur. P. III. Vol. II. p. m. 18.*

dolor! ignava Medicorum ignorantia, imprudensque iudicii festinatio, certum crimen ex dubiis maxime incertisque signis deriuare frequentes fatagunt, iudicique vel peritissimo falsum delicti corpus constituentes, miseram graui periculo matrem exponunt. Nec protinus tamen crimen artis est, si quod professoris sit *a*).

VII. Massae viridescens ex duodeni regione, quae choledochum ductum recipit, origo probabilem admodum, de origine meconii e bile (§. VI. no. IX.), coniecturam reddit.

13.

Fetus in partu difficili ob compressum cranium mortuus.

Femina quadraginta quasi annos nata, peluis angustia laborans, quae vix operatoris manum, eandemque graciliorem, admitteret, corpore tenuis debilisque, primum suum difficillimumque partum *b*) edit. Tempus enim octodecim saltem horarum labeatur, donec capitis forma ita in longum cylindrum duci potuerit, qui angustius istis superandis par fuerit. Ab osse saae occipitis ad frontem distantia in quinque pollicum longitudinem tracta est, altitudo licet verticis ad cranii basin tres quasi pollices aequet, & ab vna aure ad alteram latitudo cum duobus pollicibus nouemque lineis comparari possit. Interea etiam temporis, dum dolorum vis caput acueret, insignis in occipitis regione tumor excreuit, pollicem saltem altitudine excedens. Valentissimi tandem dolores puerum expulerunt. Vivum eum fore natum speravi, sed compressionis vis vitam abstulit. Sine motu iacuit, sine funis vel cordis pulsu, laxa pependit maxilla inferior, suaeque vicissim sponte, cum eleuaretur, decedit, laxi etiam reliqui artus pependerunt. Fuscus liquor mucosusque e

Ss 2

naribus

a) A. CORN. CELSVS de Medicina L. II. Cap. VI.

b) Qui describitur in Obs. Med. de partu laboriosa Obs. VIII.

naribus fluxit; maiori, ac solet, copia caseosus vel sebaceus concretus corpusculum foedavit; liuida etiam facies fuit. Ut debilem forsan animam excitarem suetorum moliminum pericula feci. Funem non diligatum perscidi, ast aliquot modo sanguinis guttulae effluerunt. Setaceis scopis pedes fricui, digito fauces laceffiui, plumula nares: nil agitationis vel leuissimi motus insecutum est. Neque magis mammarum suctio a) quae fistulae, qua nicotianae herbae fumum hauriunt, ope fit, proficua fuit.

Altero die lapso corpusculum, ut mortis causa cominus conspiceretur, dissecai. Et primum quidem abdomen aperui, ex quo aperto sanguinis tenuioris b); omnia viscerum intervalia replentis, notabilis quantitas effluxit: Tenuior quidem ac alter, quem ex venis postmodum extraxi, is sanguis fuit. Contracta apparent intestina & rubicunda, vasis eorum venosis sanguine plenissimis, cum minores arteriae vacuae essent. Coli flexura, quam S. Romanum vocant, dextrorsum mota erat. Colon nempe sinistrum dextrorsum repens, Psoaeque musculo inhaerens, ad intestinum usque rectum descendit: inde dextrum prioris intestini marginem legendo, sinistrorsum rursus ad mediam usque mesenterii originem ascendit: dextrorsum porro redeundo ad dextri usque ossis ilium cristam descendit, & sinistrorsum ultimo loco recedens in rectum intestinum abit c). Ventriculus in longum farcimen summo opere contractus, parcam tenacis pallide fusci, insipidi fere leuiterque salsi, mucii copiam continet. Contractissimus pylorus omni liquore vacuus est. Modice inflatum intestinum duodenum bile apprimè repletum est.

Ieiuni

a) cf. §. VIII. n°. I. not. a).

b) Similem observationem v. in Cel. BENEDICT. STEHELINI Tentamine medico. Basil. 1724. Thes. III, Ext. in Collect. Haller. T. VI. p. 679.

c) cf. supr. §. XI. not. c).

Ieiuni initium bile, sensim crassiori, & tenuem pultem referente plenum: plena etiam inflataque crassiori pulte biliosa & viridibus massulis remixta, reliqua ieiuni portio: ileum vero contractum magis flavescentem pultis crassioris, lineaeque diametrum aequantem striam complectitur. Vermiformis appendix crassa pulte flauaque fartus. Crassa intestina, si exiguae hic illic massulae excipiantur, vacua atque contracta sunt, rectum vero intestinum flavescente partim, partim viridescente meconio plenum, inflatumque. Quo remotior intestinorum puls est a duodeno, eo crassior apparet. Hepar, ut solet, magnum lienis dimidium contegit, purpurei coloris, magnamque sanguinis copiam comprehendens. Fellea vesica bile fusca, rubella, tenaci, amaricante modice plena. Lien colore obscurus, sanguine plenissimus. Ex omento infra inferiorem lienis apicem rotundus parvusque lien, cuius diameter lineae cum dimidia equiparari potest, pendet. Vesica urinaria lotio summo opere distenta ^{a)}. Scroti cellulosa, quam Dartos vocant, serum flavescentem expandit: expansum adeo non dissectum scrotum fuisse liquidumque me non monente liquet. Vaginalis, quae spermaticum funem comitatur, tunica in farciminis speciem, tres quatuorue lineas crassi, inflata tenuiorem sanguinem, qualis in abdomine fluctuauerat, comprehendit. In abdominis tamen cauum ista vaginalis tunica non aperitur, sed ex peritonei cellulosa continuatur. Vtrumque testiculum scrotum iam excepit.

In thorace vero grauissimae inflammationis & sanguinis congestionis signa conspiciebantur. Prouti enim maiora cordis vasa, arteriae, venae, auriculae, sinus & ventriculi sanguine turserunt, ita minora etiam vasorum retia, quae pleuram ornant, externam pulmonis membranam, similem thymi, cordis, pericardii, vasorum maiorum, diaphragmatis &c. sanguine plenissima non iniucun-

S s 3

dum

^{a)} cf. supra §. VI. no. VIII.

duin anatomes cultoribus spectaculum praeberunt, quo praestantius vasa de industria referta sistere nequeunt. Et prae reliquis partibus coronariorum rami vasorum, qui cordis superficiem ornant, vel minimi sanguineam lineam obtulerunt. Neque vero soli vasorum rami plenissimi fuerunt, sed effusus etiam in dictarum membranarum cellulosa telam sanguis ater, rotundas maculas nigras, vel sugillationes copiosissimas produxit, quas sola membranarum cellulosa tela complexa est, quaeque detractas membranas sequuntur, macularum ne quidem vestigiis, detracta membrana, in viscere remanentibus. Macularum forma zona quasi cordis basin vestit, copiosissimaeque quidem maculae thoracica viscera ipsamque thoracis ambitum distinguunt, eadem tamen rariores sunt in ambitu thoracis, qua ad anteriora spectat atque a sterno propior est. Pericardii quidem cavitas sero dilute rubicundo ebria est, nil vero humorum thoracis alunt, neque etiam pulmones vel aspera arteria, si parca tenacis muci copia, quae bronchia inungit ex folliculis suis secreta, excipiat. Prouti cor reliquaque viscera, ita & integer aequae ac in parte scissus pulmo in aqua subsidet.

Omniū vero intensissima inflammatio cerebrum occupavit. Naturalis quidem ea durae matris portio est, quae cranium vestit, quae vero sinus falciformis nomine & tentorii cerebelli inter cerebri lobos penetrat intensissime rubet liuetque, vasaque sanguine saturatione exhibet, qualia subtilissima etiam prosectoris ars fistula sua caeteraque nunquam detecta sistere posset. Spatia inter vasorum retia media tenuis, qui in cellulosa telam, sine vasorum ruptura violentaque effusione, ex vasorum parietibus extremisque exsudavit sanguis, utpote suae indolis inflammatio rubore liuoreque coloravit. Idem vasorum mediorumque spatiorum habitus in omnibus ventriculorum cerebri plexusque choroidis membranis fuit, quia sanguine non minus abundarunt omnia, quae cerebri substantiam, tum corticalem, tum medullarem, vasa perreptant, ipsamque hoc

modo

modo cerebri substantiam, exiguis modo albicantibus cinereisque arcolis mediis intenso rubore liuoreque infecerunt. Seri vero vel sanguinis, quod in cerebri ventriculos effusum sit, nil, ne minima quidem guttula, comparuit.

Externa vero, quae cranii integumenta vitiauit, ex compressione orta sanguinis serique suffusio notari meretur. Ipsa in tumoris regione cutis modice liuida fuit. Tumorem extensa & sero sanguinolento satura copiosa cellulosa tela erexit. Pericranium in tumoris supersedentis sede liuorem contraxit, cui in auersa parte, qua cranio strictum sine relictis continua fibra incumbit, pigmentum quoddam nigrum inhaeret, pertinaciter pericranii substantiae inmixtum, obiter cranio innatans & vel digiti deterfione remouendum, fibrarum, vasorum sanguinisque dubio procul ex pericranio in cranium missorum compressorumque vitiosa colluies: omnes sane, quae pericranium cum cranio ante compressionem copiosae fibrae necebant, solutae ibidem sunt, solumque cranium sine cohaesione pericranium vestit. Vitiosum vero pericranium aliquot ossium sedes tegit; ossis nempe occipitis dimidiam dextram; superiorem, sinistriorem posterioremque, quae ossis bregmatis dextri tertiam partem complectitur; dexteriolem & eandem superiorem, quae quartam ossis bregmatis sinistri partem absoluit. Ita vero compressionis vis ossa dimouit, vt infra bregmatis ossa frontis ossa & occipitis voluta fuerint: qua etiam in sede dicta ossa sibi superuoluta sunt, ad pectinatos nempe margines, similis in pericranio ecchymomatum liuor obseruatur.

In extremitatibus vero, quas vocant, tum inferioribus, tum superioribus, collo, facieque inflammationis nil apparet, venaeque maiores, praeter iugulares plenissimas, modicam maxime sanguinis quantitatem continent. Thyreoides glandula liuidi coloris, omnesque musculi pallidi fuere. Nihil penitus muci os conspurcavit,

cavit, ad fauces etiam lingua strictim appressa est. In narium autem utraque copiosus eiusmodi mucus, qualis e naribus effluxit, apparuit; idem ex posteriori apertura defluens pharyngem oesophagumque inundavit, eiusdemque promota colluvies modica in ventriculo, ceu jam monitum, haesit.

14.

Ex descripta observatione confectaria.

Plura quidem, quae exposita iam fuerunt, momenta ex superiori observatione novum robur nanciscuntur.

I. Tumoris, qui e cranii cute excrevit, descriptionem eam ob causam fusius denuo adornavi, ut eo melius istiusmodi tumoris naturam cognoscere discamus, eundemque ab aliis, quos matris forsan violenta manus excitavit, distinguere. Ita quidem in supra a) jam notatum errorem minime illabemur, quo ex omnis generis in capite tumore ad matris violentiam in sectionibus legalibus inferimus b).

II. Idem tumor, quodque mater ante partum fetus motum perceperit, sub ipsum partum fetum demortuum fuisse fidem facit c).

III. Mortis vero causam diuturnae cranii cerebrique in angustiis compressioni tribuendam esse, & ipsa partus ratio, & anatomica sectio probat. Longum enim, quo cranium in pelvis capacitate compactum fuit, temporis intervallum lapsum est; quo quidem

a) cf. §. VI. n^o. VII.

b) cf. Cel. HENR. DELII *Diff. Sugillatio, quatenus infanticidii signum*. Erlang. 1751. Eph. N. C. Cent. III. Obs. XX. p. 42.

c) cf. supra §. IV. & VI. n^o. VIII.

dein tempore cerebri prouti massa nimis coacta suam in nervos, a quibus sanguinis circuitus pendet, vim non diffudit, ita & ipsa sanguinis massa in cerebro retenta fuit. Inde necessario factum est, ut maiorem arteriæ, quæ pressioni magis resistunt, in encephalon copiam attulerint, quam venae reduxerint, atque sanguine summo pre-re vasa ita turserint, ut vel in ipsam vicinam telam cellulosa sanguis effusus fuerit. Cordis etiam motus, qui sensum cessavit, debilior sanguinem in venis congestum minus promouens eundem stagnantem reliquit. Elegans id esse mihi videtur, summam sanguinis congestionem in encephalo fuisse, minorem in thorace, minimam in abdomine, nullam in extremitatibus. Id etiam momentum praetermitti nequit, sanguinis in cerebro congestionem feri vel sanguinis in ventriculos profusionem necessario non secum ducere, quam vis frequentissime id fieri sectiones, quo et supra delineatae referri possunt, comprobent. Addi etiam debet, sectorum fetuum thoraces *a)* nunquam liquorem aluisse, pericardium licet istiusmodi plenum fuerit, abdomen atque encephali ventres. Abdominis quidem cavum seroso liquore plenum observari solet; in nostro vero casu, ob venulam sine dubio disruptam, ipse tenuior sanguis effusus, venisque subtractus, abdominis inflammationem imminuit.

IV. Nihil penitus auxilia varia, ipseque funiculus, ut sanguis profluat, apertus profecerunt. Partus, uti videtur, diuturnitas dudum iam vitam abstulit, nulla arte revocandam. Suctione etiam mammarum supra (§. VIII.) laudata sine fractus usus sum. De ipsa partus ratione differere scopus vetat.

V. Procul etiam dubio moriens embryo meconio se liberavit. Quamvis enim nihil istius excrementi ad corpusculum hæserit, excretum tamen fuisse, crassa intestina meconio vacua contractaque comprobant. Cum annii fortassis liquore & sanguine, qui post par-

a) cf. STEHELIN. l. c. p. 680.

partum effluxerunt, remixtum meconium minusque, observatione ad alias circumstantias translata, notatum fuit *a*).

VI. Mucum, quem, si ita lubet, pro amnii liquore habere possumus, in solo ventriculo moratum, pylorum contractissimum, duodenum bile plenissimum, eandemque bilem in intestinorum reliquis sensum spissiore fuisse *b*), non adeo obscurum documentum nobis præbet, meconii originem ex bile potius, quam amnii liquore repetendam esse. Simplicius enim excogitari potest nihil, quam copiosam ex magno hepate bilem in duodenum effundi, subtiliorem eius laudabilioremque partem, in sanguinem a lacteis vasis resorberi, residuamque sensum massam, donec in crassum tenaxque meconium abeat, inspissari *c*). Reliquos ex intestinis humores secretos suam etiam symbolam conferre, pallidioremque eam ob causam comprehensarum a tenuibus massularum colorem sensum fieri, negare equidem nollem.

VII. Memorabile admodum est & notatu dignum, fuscum istum mucum, quem ventriculus continuit, continuata stria in nares, minime vero in oris cavum protractum fuisse. Coniecturæ cuiusdam istud phænomenon ansam præbet. Fetus in utero situs ita est, ut thoraci valide mentum appressum sit, caputque, quam longissime fas est, propendat. Ita quidem infra laryngem mentum deprimitur, craniique basis ad posteriorem oris fundum, qua linguæ dorsum posterius est, propius accedit. Quam ob rem muscoli, qui ex mento ad os hyoides, quique ex hoc osse ad laryngem descendunt, laryngem, cuius, ut deglutitio fieri possit, elevatio desideratur, ad mentum adducere elevando non possunt. Minime adeo ve-

ra

a) cf. §. VI. n^o. VIII.

b) cf. REGN. DE GRAAF *de mulier. organ. gen. ins. Cap. XV. sub med.*

c) cf. §. XII. n^o. VII.

ra deglutitio a) embryoni, quem matris sinus fovet, tribui posse mihi videtur. Lingua faucibus appressa eandem deglutitionem, si vel maxime os apertum fuerit, impedit. Appressam vero linguam faucibus in nullis fere, quos secui, embryonibus, non reperi (b), totiesque in recens natis infantibus, quibus, ut excitentur, in fauces digitorum tuli, notavi. Magna, quæ ori proximum humorem propellat, ut ista obstacula superentur, vis requiritur: minor, qualis in nostro æque ac superiori casu accusanda videtur, per solas nares humorem depellere potest. Eadem laryngis ad cranii basin vicinitate epiglottis etiam in embryone claudi videtur, liberosque pulmones a detruso humore vindicare, nisi quidem major, quæ linguam a faucibus vel a larynge epiglottidem remove possit, violentia accedat c). Ita sane, si ventriculi latex amnii liquori tribuitur, disputandum est: sin ex oris, narium, faucium, œsophagi & ven-

a) cf. *supr.* §. XII. n^o. IV. Male itaque ex liquoris in ventriculo praesentia ad eiusdem deglutitionem nutritiamque qualitatem concludere solent. cf. §. VI. n. X. quo §. spectat excitata §. XII. n. I. not. b. observatio Weissiana, quæ, si studiosius perlegatur, amnii liquorem excrementaque a lanionum calcitratioe depressa fuisse, docet, & memorabile maxime est, in tenuibus intestinis, prouti quidem meis in casibus, solam, sine ullo amnii liquore bilem habuisse. Summopere itaque sententiam meam, contraria licet Celeberrimus auctor subscribat, ista observatio corroborat. cf. §. Cl. IO. FRID. KESSEL diff. quæ fetum in utero materno liquorem amnii deglutire defendit. §. 21. Ien. 1751. add. R. D. GRAAF. l. c.

b) Huc quam maxime facit §. XI. Observatio quarta.

c) cf. §. XII. n^o. IV.

ventriculi glandulis secerni cum quibusdam statuamus *a*), sua sponte omnis de liquoris annui nutritia qualitate disputatio cessat.

VIII. Scroti tumor in plerisque puerorum partibus, observatur. Compressæ procul dubio ex situ in angustis venæ in cellulosa serum fundunt.

IX. Quoties in partu capitis moles in cylindrum ducitur, occipitis ossa & frontis infra ossa bregmatis mota notavi.

X. In plerisque suffocatis, ceu ex hactenus dictis constat, collectus in encephalo sanguis esse solet *b*). Supra (§. IV.) tamen suffocationis speciem sine sanguinis in encephalo reslagnatione persecutus sum.

15.

An a morte pulmones ventriculumque aqua subeat?

In mortuo cane aquam pulmones ventriculumque non subire Cl. EVERS *c*) jam observavit. Idem me in recens natis infantibus expertum fuisse, intelligi velim. Superiorum (§. IV. & XIII.) observationum fetus, cum certo mortuos resciverim, in aquam, ejusdem cum aëre temperiei, illum per viginti quatuor horas, hunc per qua-

a) cf. HALLER *Prel. Boerhaav. T. V. P. II. p. 353. & supra §. XII. n^o. I.*

b) cf. *supra §. III. not. a. add. BOERHAAVE. Praelect. Academ. T. II. p. 346. Alia omnia sentit laudat. LANGGUTH. Disp. cit. §. X.*

c) *Diff. cit. Cap. I. §. 8. p. 6.*

quadraginta quatuor, eo quidem consilio demersi, ut cognoscerem, an vasorum sanguis, cum propendens funiculus apertus maneat, aqua eluatur. De eadem autem fidelia, ut ajunt, duo dealbavi parietes. Nulla enim aquæ guttula in pendentis ex infantis umbilico funiculi vasa penetravit, nullaque sanguinis guttula ex vasis in aquam effluxit: purissima itaque & intincta aqua mansit. Simili modo nil aquæ in os, fauces, pulmones ventriculumque penetravit. Parem eventum aliquoties in abortivis diversorum mensium embryonibus, per plures dies sub aqua vel vini spiritu merfis, notavi. Concludo itaque.

I. Aqua in submersi cadaveris os naresque sua sponte, ut in ventriculum pulmonesque descendat, non penetrat. In infanticidii saltem quæstione, quando infantis cadaver in aqua reperitur, negligi ista consideratio nequit.

II. Aqua, in quam mortuus fetus demergitur, sanguinem e vasis non eluit. Quodsi itaque in infantis cadavere ex aqua extracto sanguinea vasa cruore vacua reperiuntur, demersionem in aquam hæmorrhagia prægressa est. Quin mortem hæmorrhagia præcessit. Protinus enim a morte umbilici prioris infantis funiculum cum percussidissem, binæque solæ sanguinis uncie effluxissent, sua mox sponte fluxus cessans omnem in corpusculo sanguinem cohibuit, idemque in postericri etiam factum fuisse supra (§. XIII.) notavi. E funiculo ergo, quæ vasa exhauriat, hæmorrhagiam infantis cadaver non patitur. Liceat mihi hoc loco crassum, quem in elogiis Medicis aliquoties notavi, errorem indicare. Quum sine deligato funiculo infantis cadaver reperitur, ex funiculi hæmorrhagia, sine majorum cordis vasorum disquisitione (an sanguine turgant, an vero eodem vacua sint?) infantem periisse temere & præcipitanter concludunt. Quum enim vasa turgent, cessat omnis de hæmorrhagia suspicio: quum vero vacua sunt, ex viuo infante sanguis profluxit: summopere etiam id ipsum post partum factum fuisse probabile est.

Rarius enim in partu hæmorrhagia infantes pereunt. Omni tamen observatione non destituimur a). Absolute adeo fetum, cujus vasa sanguine carent, post partum hæmorrhagia periisse certam non est. Funis ligatura carens nil omnino probat. Potest enim facta ligatura decidisse, potest etiam funiculo sine ligatura relicto nulla hæmorrhagia insecuta fuisse. Longus relinquatur & aliquot demum a partu minutis, cum refriguit jam riguitque, lapsis, funis præcidatur; ita nil sanguinis effluxurum fore expertus b) spondeo.

a) cf. v. g. DE LA MOTTE *Tr. des accouch.* L. III. Cap. VIII. Obs. 211. *Debilis quidem infans refocillatus fuit. Quando autem femina clandestinum partum edit, peritus operator neque matrem juvando partum accelerat, neque debilem infantem excitat.*

b) *Alio loco de institutis circa hoc argumentum experimentis differam. Iis non contradicunt, quæ supra §. VIII. n.º V. dicta sunt.*

DECANUS ORDINIS MEDICI
ACADEMIAE GEORGIAE AUSTRIAE

J. G. R. D.

DISSERTATIONEM IN AUCTORITATE
PRAESENTIUM DOCTRINARUM ACADEMIAE

JOHANNIS HENRICI MEYER

PHARMACEUTICI
B. VII. M. S. NOVEMBER 1818
HABSBURG

PROFESSOR
F. A. E. S. I. S. I. S.

DE
S. E. M. E. R. S. I. S. A. G. U. A.
OBSERVATIONIBUS

DECANUS ORDINIS MEDICI
IN
ACADEMIA GEORGIA AUGUSTA
I. G. R. D.

DISSERTATIONEM INAUGURALEM
PRAENOBILISSIMI DOCTISSIMIQUE MEDICINAE
CANDIDATI

IOHANNIS HENRICI MEDER
DILLENBURGA NASSAVICI


D. XIV. MENS. NOVEMBR. MDCCCLX.
HABENDAM

INDICIT

P R A E M I S S I S

DE

SUBMERSIS AQUA
OBSERVATIONIBUS.



OBSERVATIONES.
DE
SUBMERSIS A QUA.

*Quam A. 1754. publici juris feci de Suffocatis Sat-
turam, ulterius refercire eo minus dubito,
quo uberiores inde in medicinam forensem fru-
ctus deportantur.*

I.

Submersa, sine pota aqua, femina.

In feminæ crapulam, spiritu vini ascitam, vix unquam exhalantis
cadavere, in aqua, medio mensis Martii a. 1760. reperto, se-
quentiaprehendi. (1) Faciem rubicundam & sanguine multum
inflatam, viventis similem. (2) Corpus nullibi læsum; sub cute
cellulosam & omentum copiosa pinguedine farta. (3) Sana visce-
ra, hepar, lienem, ventriculum, intestina, cor. (4) *Vasa fan-*
guifera Viscerum, musculorum & cutis *sanguine turgida*, & par-
tem intestinorum, quæ pelvim replet, passim inflammatam. (5)

U u

Pul-

Pulmones sanguine plenos, & maculis sanguinis nigri, tanquam totidem ecchymomatibus, tectos; omni autem *aqua vacuos*. (6) *Vacuum* etiam *aqua ventriculum* & alimentorum aliquid cum spiritu vini comprehendentem. (7) *Vacuum* pariter *os* cum naribus & faucibus. (8) Pericardii cavum parca lymphâ madidum. (9) Sanguinem ex cavis cordis, vacuis, in majora vasa promotum. Ebriam feminam in aquam delapsam esse rescivi.

2.

Vir, sine pota aqua, submersus,

Hæc altera priori observationi simillima est, quæ nempe in viri cadavere quotidianæ crapulæ dediti &, cum spiritum ingurgitasset, aqua submersi deprehenderim, recenset. Tres autem dies postquam in aqua latuerat, brumali tempore, postridie demum, cum illa extractus esset, dissectum cadaver est. Sequentia animadverti. (1) Corporis cutem albam & sanguine liberam. (2) Corpus nullibi læsum; sub cute cellulosa & omentum copiosissima pinguedine farta. Ultra pollicem crassa fuit pinguedo abdominalis, & crassum omentum in pelvim descendit. Crassa non minus pinguedo thoracis, solida & firma. (3) Sana viscera, hepar magnum cum modice stipato parenchymate. Mesenterium, mesocolon, appendices coli &c. pinguedine impense divites. (4) *Intestina* admodum *inflammata*, & partem eorum, quæ pelvim replet, gangræna totam fœdatam. (5) *Pulmones*, pleuræ pertinaciter agglutinatos, *sanguine plenos*, per omnem substantiam, & in superficie, ex collecto sanguine lividos; omni autem *aqua vacuos*: tracheæ rami aërem solum continent. (6) *Vacuum* etiam *aqua ventriculum*, parvum, contractum, parum liquoris tenacis & rubelli comprehendentem. (7) *Vacuum* pariter *os*, cum naribus, faucibus & aspera arteria. (8) Multum pinguedinis in thorace. (9) Cor magnum &, cum vicinis

nis vasis magnis, spisso sanguine turgidum. (10) Cerebri substantiam sanam & stipatam. (11) *Vasa cerebri sanguinis multum plena.* (12) Parum feri rubelli in ventriculos laterales effusi. Neque vasa lacera, neque ipsum sanguinem extra vasa vidi. (13) Reliquos cerebri ventriculos vacuos.

3.

Epicrasis.

1. Sueta suffocationis sequela, sanguinis nempe in venis, pulmonis præcipue & cerebri, notabilis congestio est. Huc & spectant feri effusiones in cerebri ventriculos.

2. Tegitur corpus pinguedine, quod spiritu vini repletur.

3. Ausim fere litem illam componere, quæ nostro aevo passim agitur, *de submersorum in aqua morte.* Olim quidem ex pota & in pulmones hausta aqua submersos perire, nemo dubitabat, donec IOH. CONR. BECKER observationibus æque, ac rationibus variis probare annis sit, sine pota aqua submersos mori. Recentissima autem in variis animantibus experimenta instituta veterum de nno sententiam corroborant. Ita vero diversa ista obserta jungo. Quando in animalibus vivis experimenta ita fiunt, ut animal bene valens vigensque in aquam vi demergatur, demersumque detineatur, per metum & inspirandi conatus laryngis pharyngisque organa ita agitantur, ut in pulmones non minus, quam ventriculum aqua trahatur, inspiretur quasi simulque deglutatur. Quod sane phænomenon sæpius ipse vidi cum Cl. EVERS circa illa pericula versante. (cf. Disp. sistens *experimenta circa submersos in animalibus instituta.* A. 1753.) Idem contingit, quum homo inter easdem condiciones in aquam præceps sit: cuiusmodi binas observationes subjungo. Evenire autem potest, ut rigeant hominis submersi cum reliquis, faucium etiam musculi, ipse mox animo linquatur & suffocatus, ex

spiritu intercluso, pereat, sine illis, per respirandi nifus & dēglutitionis, in salutem moliminibus: qui quidem subitaneus interitus faciliior contingit quum ex ebrietate aliisue causis stupor & tenebræ mentem mortisve metum alienaverint. Ita observationes, quas BECKERVS recenset, intelliguntur, binæque, quas descripsi: siquidem fere ad aquæ frigus, rigore corpora constringens & stupefaciens, atque ebrietatem redeunt. Eo valentiozem etiam frigoris virtutem censeo, quo magis spirituofo liquore corpus turget. cf. & STEPHAN. WEZPREMI *Dissert. sist. observationes medicas. Tract. ad Rhen. a. 1756.*

4. In altera observatione sanguis procul dubio frigoris vi a corporis superficie, inde exsanguis, ad internas partes compulsus & suffocatio accelerata est.

5. Stagnat facilius in obeso corpore, quam macilento, sanguis.

6. Hæ etiam observationes cum innumeris aliis probant, simpliciter ab experimentis, in animantibus institutis, consecretaria ad ea, quæ in hominibus observantur, deducenda non esse.

7. A morte pulmones ventriculumque aqua non subit. cf. *Satur. cit. n. 15.*

4.

Submersa, cum pota aqua, femina.

Ex infortunio femina, annos quasi triginta nata, in amne, qui Gottingam interfluit, demersa sub finem mensis Septembris a. 1754. periit. In dissecto cadauere notavi.

(1) (2) Corpus nullibi læsum. (3) Sana viscera. (4) *Sanguinis in venis* a suffocatione conspicuam *congestionem*: modicam ejus quantitatem, qualisque fere in omni cadavere deprehenditur, in extremis inferioribus, nihil in arteriis: modicam etiam & consuetam in majoribus venis abdominalibus: plenissimas vero, anatomice repletis similes, minores æque arterias ac venas, illas ab his florido

rido colore distinctas. (5) *Pulmonum* acinulos mihi grana mole sua æquantes, omnemque superficiem colore miniaceo tumidisque aëre membranulis distinguentes, præter quasdam obscurioris coloris sedes: maculas porro sanguinis effusi copiosas & in tota superficie dispersas, lividas, petechiis similes, dimidiam integramque lineam latas, quarum maxime ad semipollicis amplitudinem quaquaversum extensæ istas pulmonum & vicini pericardii sedes occupant, quæ a vasorum pulmonalium insertionem propiores sunt; quæque notabili sua, lineam æquante, crassitie, *sanguinis largam copiam effusam* esse docent. Sanguis quidem ex percisso pulmone non effluit, sed omnes pulmonum cellulae pigmento partim miniaceo, partim *spuma rubella factae* sunt, & sanguine vasa turgent. (6) *Ventriculum limpida puraque aqua*, cujus pondus quatuor libras superat, totum plenum & expansum. (7) *Os, nares, fauces*, asperamque arteriam cum bronchiis, *aquea spuma ita exsuperantes*, ut vel faciem conspurcarent, & compresso pulmone copiosa efflueret. (8) Pericardii cavum lymphâ flavescente plenissimum; modicam ejus copiam in abdomine, nihil in utroque thorace.

Submersa, cum pota aqua, femina.

Periit femina d. 26. Oct. a. 1754. hora undecima noctis & postridie cadaver dissectum est, in quo sequentia observavi. (1). (2). Corpus nullibi læsum. (3) Sana viscera, nominatim hepar. Intestina tenuia sueto chymo copioso, sine ulla aqua remixto, pariterque crassa scybalis, utraque vero lumbricis & tænia plena sunt. (Tæniam descripsi in Progr. ad diss. D. TRAMPEL) (4) *Vasa sanguifera*, præcipue venosa, modice plena in extremis inferioribus, *plenissima* in capite; sanguine quippe, dum partes externæ, velut musculi faciei, præpararentur, has inundante. In abdomine nihil inflammationis apparet, & venæ præcipue in intestinis tenuibus, modice sanguine livido elewantur; arteriolæ vero florido.

matio pericardium, cor pleuramve distinguit. (5) *Incisi pulmones aquam spumofam fundunt.* Vesiculæ totam superficiem, pone membranam communem, aëre plenæ, copiosissimæ, mihi granis similes, pallide rubellæ, ac si tenuis sanguis effusus esset, distinguunt. Interspersa sunt copiosissima ecchymomata, lenticularia, parva, lineam lineasve diametro æquantia; majores vero maculæ, integri quasi rivuli effusi, ad semipollicis diametrum, sunt in sedē, quæ majora vasa recipit, & in vicino pericardio. Omnes etiam substantiæ cellulas, minio quasi tinctas, copiosus sanguis floridus replet, congelatus, neque, cum ipso pulmo perscinditur, effusus. (6) *Ventriculum limpida* puraque & chyino non remixta *aqua*, cujus pondus quatuor libras superat, totum *plenum* & expansum. (7) *Os, nares, fauces* asperamque arteriam cum bronchiis aquea *spuma* ita *exsuperantes*, ut vel faciem conspurcarent, & compresso pulmone copiosa efflueret. (8) Pericardii cavum lymphæ flavescēte plenum; modicam ejus copiam in abdomine; nihil in utroque thorace. (9) Cor, cum vicinis vasis magnis, sanguine turgidum. (10) Cerebri substantiam sanam & stipatam, die licet octavo demum a morte dissectum sit. (11) Vasa cerebri, & plexus choroidis ultra consuetam in omni cadavere portionem, non repleta; copiosas in venis aëris bullas; sanguineas quasdam maculas ad sinum longitudinalem. (12) *Rorem* in ventriculis, sine ullo sanguinis vestigio, qui in paucas, in fundo guttulas colligitur: (13) In ventriculi dextri parte anteriore maculam ex transmissio sanguine natam, & in sinistro similes exsudati sanguinis strias, venarum ductum sequentes. (14) Tumorem pone occipitis cutem, sanguine suffuso & aqua refertum. (15) Nil aquæ in vagina uteri.

Epicrisis.

Copiosiore sanguine abundarunt pulmones submersorum sine pota aqua, quam in binis observationibus posterioribus; in quibus vero memorabilia sunt ecchymomata petechialia & vesiculæ æreæ.

DECANUS ORDINIS MEDICI
IN
ACADEMIA GEORGIA AUGUSTA
I. G. R. D.

DISSERTATIONEM INAUGURALEM
PRAENOBILISSIMI DOCTISSIMIQUE MEDICINAE
CANDIDATI

GEORGII AVGVSTI KOERBER
HANNOVERANI

D. XXIII. OCT. clō lō cc lxx.

HABENDAM

INDICIT

P R A E M I S S I S

DE
INFANTIBUS IN PARTU SUFFOCATIS
OBSERVATIONIBUS.

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

IN

ACADEMIA GEORGIA LUGUSTA

I. G. R. D.

DISPERSED THROUGHOUT THE

ENTIRETY OF THE TERRITORY

OF THE STATE

OF THE STATE OF GEORGIA

OF THE STATE

OF THE STATE OF GEORGIA

OF THE STATE

OF THE STATE

OF THE STATE

OF THE STATE

OF THE STATE OF GEORGIA

OF THE STATE



DE INFANTIBUS IN PARTU SUFFOCATIS.

Quæ de mortuis in partu 'infantibus', ad collustrandam maxime medicinam forensem a. 1754. in Progr. de suffocatis annotavi, novis abhinc observationibus confirmavi, quarum præcipuas ex adversariis meis recensebo, tanquam nova propositarum doctrinarum documenta.

I.

Puer in partu ex presso fune mortuus.]

De partu, quo fœtus natus est, differui in observat. de partu laborioso XVI. Periit puer ex pressione funis inter pelvis ossa & proprium caput dependentis, a cujus demum morte perforatorium applicitum est. In cadavere observata sunt. (1) Totum corpusculum, inflatum quasi, tumet; duri succis congestis artus sunt; molliusculum abdomen flatu turgere videtur. 2) Livent facies & scrotum, passimque corpusculum insignes maculæ lividæ distinguunt.

X x

3) In

3) In inguinum regione meconium, in mortis agone procul dubio effusum, cutem fœdat. Humor etiam fuscus naribus, nihil ore, effluxit. 4) *Sanguinis vis maxima in abdomen congesta est*: ita lividum hepar, qua sede ante costas pendet, & in superficie cava, molle, friabile, sanguinis plenissimum, ex facili, membranam externam dimittit; pallidius in convexa superficie, pone costas. Tota expansio peritonei, quæ etiam viscerum membranas format, atque posterior, quæ renes tegit, cunctaque vasa mesaraica sanguinis plenissima sunt, floridi arteriosa, lividi venosa. 5) *Moderatio in thorace sanguinis congestio est*; inflammata pericardium & pleura diaphragma vestiens, superiorem thoracis regionem & pulmones; levissima ad inferiorem thoracis sedem inflammatio est. 6) Cava thoracis sicca sunt: modica liquoris acris, falsi, leviter flavescens copia in pericardio fluctuat. 7) Sucto more integer & in partes divisus pulmo in aqua subsedit. 8) Distincta quasi anatomica arte in scroto vasa sunt. Inferior pars scroti gelatinæ consistentis plena est. Copiosa materies sebacea inter glandem & cutem latet. 9) Ventriculus plenus pulpæ tenacis, mucosæ, crassæ, pallide fuscae, versus pylorum rubescentis, cum remixtis exiguis massulis albis. 10) Intestini duodeni membrana villosa, in vicinia ventriculi, tota inflammata & nigris maculis picta est. 11) In duodeno similis pulpa tenax, leviter primum fusca, dein flavescens & parciore sit. Major pulpæ flavescens copia in jejunio distribuitur. Viridior in progressu intestinorum massa fit, tota viridis in ileo. Meconium crassorum copiosum vix colore ab ilei contentis differt, pallide viride. 12) Vesicula bilis modice plena, rubentis, parum amaricantis & acris, crassæ, tenacisque cum remixtis flocculis flavescens. 13, 14), 15). Ventriculus velut in farcimen vel intestinum contractus est, compressus a parte anteriori ad posteriorem.

2.

*Pueri in partu, ex presso, in angusta pelvis apertura,
superiore, capite obliquo mortui.*

(a) Partus, quo foetus natus est, ratio exponitur in *Diff. de non damnando usu perforatorii in paragonphosi ob capitis molem. obs. 2.* Observavi 1) 2) Inflammatum scrotum. Livent unguis. 3) 4) Sanguinis vis in thoracem congesta est. Lata & copiosa ecchymomata in pericardio & pleura, pericardium tegente, passim in reliquo pleurae ambitu, & copiosissima in pulmonibus disseminantur. Rami vasorum sanguinis plenissimi sunt, floridi arteriosorum, lividi venosorum. Ecchymomata etiam in cordis superficie comparent, praecipue in vasorum vicinia, quorum etiam ductu sanguis ruber in cellulosam effusus est. Lividi pulmones sunt. Parum sanguinis in arteria aorta est, paulo copiosior in pulmonaria, modica quantitas in aure anteriori, major multo in posteriori. *Plena etiam sanguinis sunt partes abdominis.* Lividus lien, sanguine refertissimus. Lividum hepar. Renes rubri & modice inflammati. Ventriculi etiam, intestinorum & vesicae urinae vasa plena sunt. Inflammata est vesicula fellea. Non multum inflammationis in pelvi est. Extremitatum arteriae vacuae sunt, plenae venae. 5) Venae jugulares & arteriae carotides sine sanguine sunt. (Perforatorio dura mater aperta, ossis bregmatis sinistri pars superior extracta, & sinistrum cerebri haemisphaerium, dextro relicto, expressum est). 6) Modica aquae flavescentis in abdomine, utroque thorace, & parca copia in pericardio est. Sueto more integer & in partes divisus pulmo in aqua subsedit. 8) Liquor gelatinosus, cinereus, cellulosam scroti distendit, cum copiosis vasculis inhaerentibus. Testiculi inflammati, cum ecchymomatibus in epididymide, sunt: tunica conjunctiva aquam flavescentem continet. Inter initium epididymidis & testem utrimque varix est. Vasa etiam spermatica sanguinis plena sunt. Liquor albus, modice crassus ex urethra premi potest. 9) Ventriculus

lus plenus muci cinerei, crassi. 10) 11) In duodeno similis pulpa tenax, usque ad insertionem ductus choledochi est, qua sede naturæ bilis particeps fit, in jejunio sensim crassior. In colo transverso parum bilis flavæ & crassæ est; vix aliquid in colo sinistro: versus intestinum rectum meconium formatur pallidum, & ex flavo-viride. 12) Vesicula bilis plena, obscure viridis, rubellæ & tenacis. 13) Copiam muci, qualis in ventriculo est, trachea & pulmones continent: quo vero œsophagus vacuus est. 14) Plenissima urinæ vesica est. 15) Ventriculus parum inflatus, intestina collapsa & contracta sunt. 16) In vasis sanguineis thoracicis & abdominalibus globulos aëreos inter sanguinis columnas vidi. Vasa etiam spermatica, cum ejusmodi globulis aëreis, sanguinis plena sunt. Natus puer. d. 27. Jun. 1757. dissectus. d. 30. e. m. Nondum autem, ut aër evolvi potuerit, computruisse cadaver, ex pulmonum pondere (n. 7.) intelligi potest.

b) Similia fere sub similibus circumstantiis observavi in foetu observationis 4tæ Diss. cit. Totum nempe corpus rubuit passim, cum inflato collo, in cujus ambitu sanguis effusus est. Livent labia oris, lingua & compressus nasus. Rubent inflatæ genæ, simile scrotum, & auriculæ. Sanguinis vis in abdomen & thoracem congesta est; arteriæ venæque umbilicales sanguine refertissimæ sunt. Modica viscerum inflammatio est, hepar ex fusco rubellum. Abdomen liquoris rubri, sive potius sanguinis, plenum & intestina contracta sunt.

2.

Puella in partu, ex presso, in angusta pelvi, capite mortua.

1) Corpusculum succulentum, bene nutritum, inflatum quasi tumet. 2) Tota cutis florida est. 3) Insignis tumor ad occipitium & posteriorem ossis bregmatici partem elevatur. 4) *Sanguinis vis*
in

in thoracem congesta est. Omnis sinuum, cordis, & arteriarum majorum superficies ita inflammata est, ut distincta quasi anatomica arte minora etiam vascula sint. Substantia pulmonum incisa in margine florida, in medio livida est. 5) *Vasa etiam viscerum abdominalium, intestinorum precipue & mesenterii, copioso sanguine turgent,* quin ipsa viscerum substantia sanguine tincta est. Per omnia etiam genitalia inflammatio diffunditur. Mirifice tument sanguine ovaria, multoque, quam in aliis fœtibus, majora sunt, in ipsam substantiam sanguine, ut videtur, effuso. In uteri etiam substantiam sanguis ita sudavit, ut refertissimus cruore sit fundus, vacua cervix & sensum cruoris copia a fundo ad cervicem minuatur. Paracior tamen in utero, quam in ovariis, sanguis est. Notabilis macula, ex inflammatione nata, anterioris labii superficiem distinguit. Sanguinis subfluidi plenæ sunt aorta descendens & vena cava, ex thorace in abdomen migrantes. Dives quoque sanguinis est utraque capsula suprarenalis. Sinistra ecchymosi sanguinis congelati & pertinaciter ipsi capsulæ adhærentis tegitur. Disruptus apex anterior in lacinias quasi defluxit, nato malo ex suffocatione, non autem præparatione anatomica. 6) In pericardii æque, ac utroque thoracis cavo aliquid feri sanguinolenti fluctuat, cujus etiam notabilis copia in abdomine est. 7) Sueto more pulmones, collapsi, compacti, obscure rubri, non spongiosi, in acinos conspicuos, lineis e fusco-nigris circumscriptos, distincti, sine ullo vesicularum aërearum vestigio, tum cordi reliquisque thoracis visceribus juncti, tum soli, tum integri, tum in partes divisi, in aqua fundum petunt. Neque percussa pulmonum substantia sub forfice strepitum illum clasticumque impedimentum edit, quod ab aëre pulmones distendente proficiscitur, neque sectionis superficies spumat. 8) Glandula thymus saturati coloris rubri est, sanguinis succorumque plena. 9) Venter plenus muci albi, tenacis, pellucis. 10) Modice inflammata est tunica villosa ventriculi. 11) In duodeno mucus sensim flavescit, & ad insertionem ductus choledochi rubet. In jejunio parum muci albi, tenacis & opaci est, qui in ileo flavescit & viri-

datur, similis lactis congelati, atque versus colon flavescente & semipellucente muco remixtus. Crassorum tunicæ flavo colore distinguuntur à meconio crasso, primum flavo, dein viridi. 12) Multum cruoris subfluidi ex magnis colli resectis vasis sanguiferis arteriosis venosisque, à parte capitis, profluit. 13) Insignis tumor superiorem occipitii partem occupat & in latere dextro ultra totum frontis os exporrigitur. 14) Resecta integumenta multum inflammata sunt. 15) Dextrum cranii latus integrum inde ab orbita ad medium ossis occipitis copiosa gelatina rubella tegitur. 16) Pericranium inde à medio occipite ad dimidiam ossium bregmatis partem & ultra inflammatum est. Ad marginem superiorem & super media parte sinistri ossis bregmatis pericranium totum sanguinolentum est; quæ etiam sede incisum facile ab ipso cranio secedit, quin passim plane non cohæret, superficie inferiore cruore, in ecchymomatis speciem effuso, vestita. 17) Ibidem pori cranii, vel media inter fibras osseas spatiola cruore, affatim, cum cranium premitur, exsudante, referta sunt. 18) Ad marginem superiorem & sinistram ossis occipitis, infra os bregmatis profunde depressum, vera ecchymomata parva, nigra disseminantur. 19) Pari modo sugillatio minor, inter pericranium & sinistri ossis bregmatis angulum, qui in loco posteriori superior est, illius facilem secessum, cum simili, ac in altero latere, exsudante cruore, fecit. 20) Modice inflammatae sunt vaginæ musculorum extensorum capitis. 21) Facile à cranio dura mater avellitur, sine cruore eam inter & cranium effuso, ipsius licet vasa, maxime in latere sinistro, reliquaque in omni superficie cerebri, etiam qua sede hæmisphæria junguntur, ventriculi formantur, & choroides plexus protrahitur, distributa, quin cuncta in cerebri massam penetrantia, velut ex copiosissimis punctis sanguinolentis, cum percinderetur cerebrum, apparuit, sanguine multum turgent; pressionis vim minus duram matrem cerebrumque, quam pericranium læsisse, documento. 22) Neque etiam in cerebri ventriculis, notabiliter, tertio præcipue, madentibus, neque ad basin cranii, qua tamen sede non minus, ac reliquis, vasa tum cerebri
tuni

tum duræ matris, sanguinis magnam vim continent, extra vasa cruor diffusus est. 23) Cerebelli habitus ex cerebro descripto æstimari potest, nisi quod ad superficiem tenuissimum sanguinis effusi stratum sit. 24) Sine sanguine, vel effuso, vel ultra consuetam copiam vasa inflante, anterior pars baseos cranii super orbitis est.

4.

Puer in partu ex appresso pelvi capite mortuus.

Cum ad extrahendum forcipe foetum velamenta discerperentur, multum meconio conspurcatus amnii liquor effluxit foetumque jam emortuum, vel saltem morti proximum, esse patefecit. Pressus est foetus in partu ad dextram pelvis partem, facie in regionem sinistram inclinata. 1) Corpusculum succulentum, bene nutritum. 2) *Modica vis sanguinis in thorace est.* Trunci arteriarum majores reti vasculoso, multum repleto, distinguuntur. Nil cruoris ventriculi cordis continent, cujus modica copia in pulmonariis vasis est. 3) Intestina tenuia ita inflammata sunt, ut elegantes & copiosæ vasorum, arbusculæ appareant. Hepatis superficies convexa obscure rubra est, ad lobum dextrum maculis lividis variegata. Concava superficies alteram colore obscuro superat. Interna etiam hepatis substantia pallide livet & ingrate rubet, obscuriori sensim ad margines livore. Vena umbilicalis, in abdomine cruoris plena, magno & crasso hepatis ponte tegitur. Livida lienis superficies nigris maculis, & parenchyma, obscure rubrum, albis massulis distinguuntur. Turgent cruore obscure rubro, fluido, venæ cava & iliacæ. Arteriæ iliacæ parum sanguinis subfluidi continent & tunica vasculis eleganter picta nitent. Sanguine fere vacuæ sunt venæ brachii & cruris. Modice plenæ sunt venæ colli & ex carotidibus incisæ aliquid cruoris subfluidi a parte capitis depluit. Apprime repleta vasa thyreoidea glandulam rubore, succis & sanguine perfundunt. Insigniter etiam rubent glandulæ salivales. Oesophagus cum pharynge & cardia inflammatus est. 4) Modicam liquoris copiam pericar-

cardium comprehendit. Madida, sine sero effuso, viscera abdominis sunt. 5) Consueta sunt pulmonis obscure rubri, ponderosi, acinosi, densi, phænomena. Dum alter pulmonum flatu expanditur, subito color in grate rubellum mutatur. 6) Nihil galatinæ in seroto est. 7) In œsophago parum muci pellucents, tenacis, crassi, lenti hæret. Ventriculus plenus pulpæ semipellucents, viscidæ, subviridis, massulis albis mucosis remixtæ. Superficies ventriculi mucro crasso, tenaci, pertinaciter adhærente ita tegitur, ut ægrius, & sola conquassatione diu continuata ventriculique agitatione in aqua, illa mucosa crusta à tunica villosa separaretur. 8) In prima jejuvi parte materies mucosa rubella fit. Sequens pars constricta ad superficiem internam mucro albo, crassissimo, vix humido, velut velamento quodam, obducitur. In reliqua tenuium parte laxa primum materies tenuis, subfusca est, quæ sensim spissior fit, tenax, obscurior, fusca, demum viridis. 9) Aliquid meconii in intestino cœco est; universum colon inde à cœco ad Stromanum usque constrictum, vacuum, album, serpentino ductu cum variis flexuris incedit. S. romanum, in amplissimam diametrum expansum, meconio crasso repletur. Prima S. romani flexura transversa, intestino cœco contecto, cavam hepatis superficiem ad dextrum lobum tagit; rursusque ad sinistra conversum intestinum & ad cristam ossis ilium sinistri flexum, in dextram pelvis partem sensim delabitur. In constricto colo plurimæ rugæ longitudinales deprimuntur. Pars coli & recti ampla & ab expansione tenuis, meconio crasso, viscido, tenaci, ex viridi flavo, repletur. 12) Longa vesicula fellea marginem hepatis ita transcendit ut, in vicinia fundi, margini hepatis extenuato, notabilem sulcum insculpat. Continet fuscum vesiculæ cavum inucum tenacem, heterogeneum, e fusco flavum. 13) *Maxima inflammationis vis in capitis partes collata est.* Dextrum faciei latus livet, & præ opposito tumet. Eminent quoque palpebræ dextri lateris, quarum conjunctivæ multum inflammatae sunt, cum modica conjunctivarum oppositi lateris inflammatio sit. Omnis pars superior capillitii apprimè complanata est, in latere dextro elatior, de-

depressior in sinistro. Sinistrum os bregmatis, cujus margines marginibus vicinorum ossium teguntur, mobile multum deprimi potest. Insignis tumor inde ab oculi dextri angulo externo ascendendo super os frontis, bregmatis dextrum & occipitis protrahitur & ad inferiorem hujus ossis angulum in sinistro latere finitur. Tumoris mobilis, cum integumentis in dextro frontis latere rugosis, inflatis, crassities in medio saltem 9. linearum est. Multum eminent inferior & posterior ossis bregmatis dextri margo; humiles anterior ejusdem & oppositi ossium temporis & occipitis margines sunt. 14) Sub crassis capitis integumentis, ad sedem tumentem, similis sanguinis congelati, subgelatinosi placenta hæret: Sola gelatina, quæ incisa in tenuem sensum liquorem destillat, cellulosam replendo, tumorem in fronte inflat: ad frontis partem superiorem & dextram sensum cruor nascitur, gelatinæ in idem coagulum admixtus. Tres saltem lineas maxima coaguli crassities ad centrum ossis bregmatis dextri æquat. Longus tumor $4\frac{1}{2}$ poll. ad sinistrum ossis occipitis marginem vergit, latus $2\frac{1}{2}$ poll. Totum os occipitis gelatina effusa, & superior bregmatis sinistri pars, juxta suturam sagittalem, sanguine congelato, pollicis longitudine, tegitur. Inde ad marginem superiorem ossis frontis sinistri ecchymosis illa à medio fonticulo 2 pollices in latere sinistro descendit. Variis quoque ecchymomatibus minoribus, quæ cum magno coagulo confluunt, os frontis sinistrum ad centrum usque oblitum est. 15) Sub livore faciei nil liquoris suffusum est. 16) Pericranium, qua sede ecchymomatibus substernitur, modice inflammatum, cum cranio quidem cohæret, sed minus, ac alibi, pertinax. 17) Ibidem pori cranii modice, dum cranium premitur, sanguinem eructant. 18) Sanguine & rubore perfusa sunt ossa cranii, quibus in sedibus ecchymomata disperguntur. 19) Nil vel fracturæ vel fissuræ cranii ossa vitiavit. 20) 21) Arcte cranio dura mater, sine medio sanguine, adhæret; omnis vero cerebri & interna duræ matris superficies tenui cruore effuso vestitur, cunctaque cerebri & cerebelli vasa superficialia sanguine turgent. 22) Parum seri in anteriore utriusque ventriculi apice & productionibus lateralibus est,

est, cujus pellucens major copia in avis rostrum defluxit. Infundibulum feri sanguinolenti plenum est. 23) Multum cruoris fluidi congelative tentorio cerebelli & basi cranii æquabiliter incumbit, atque sub tentorio cerebellum vestit. 23) Tenuēs omnis cerebri membræ sanguine perfusæ sunt.

5.

Sanguinis ab aëre color.

In descriptis æque atque aliis pluribus suffocatorum cadaveribus memorabilem maxime coloris lividarum partium mutationem animadverti, quum aliquandiu libero aëri exponuntur. Cruor enim vasis resectis effusus, ecchymomata, lividaque ex vehementi inflammatione viscera, maxime hepar, sensim in elegantem & floridum colorem coccineum expallescent, quibus sedibus nudata aëris contactui offeruntur: quæ vero viscerum partes aliis teguntur, livorem conservant. Quin pro lubitu floridam partem tegendo denuc obfuscamus, lividamque hætenus nudando collustramus. Cruor patina à venæsectione exceptus seroque liber, simili successu istiusmodi periculis subjicitur. Cf. CIGNA in Miscellaneis Philosophico-Mathematicis Societatis privatæ Taurinensis anno 1760. T. I.

Q. D.

Q. D. B. V.
DISSERTATIO INAUGURALIS MEDICA
DE
SIGNORVM GRAVIDITATIS
AESTIMATIONE

QUAM
DIVINO AUSPICIO
CONSENTIENTE GRATIOSO MEDICORUM ORDINE

IN
ALMA GEORGIA AUGUSTA

PRO
GRADU DOCTORIS
*SUMMISQUE IN ARTE MEDICA HONORIBUS
ET PRIVILEGIIS RITE OBTINENDIS*
PUBLICO ERUDITORUM EXAMINI SUBMITTIT

AVCTOR
GEORGIUS WILHELMUS STEIN
CASSELLIS HASSUS

D. XXIX. MARTII A. *clōlcclx.*

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1920

1920

1920

1920

1920

1920



DISSERTATIO INAUGVRALIS MEDICA
DE
SIGNORUM GRAVIDITATIS
AESTIMATIONE.

Sane multa sunt, quæ ROEDERERI prælectionibus, Præceptoris æterno mihi pietatis cultu venerandi, debeo studiorum emolumenta. Quare instante illo passu, quo facienda in Medicina privilegia & Medicorum honores consentiente gratioso Ordine amplexurus sum, non magis profectuum, quam grati animi specimen ex perceptis ab Eo doctrinis, propria meditatione elaborare apud animum meum constitui.

Equidem non nescio, qualis sit hodiernus rerum usus, & recepta consuetudo, ut, qui novi nihil nihilque vel inventi vel inexpectati habet, de quo agitet, ille parum dixisse videatur: Interim aliqualem scriptuli usum æstimandum esse puto, ordini argumentorum & disporum thesaurorum dispositioni dicati, atque laborem in præsentis argumento frustra non infumi. Discat, qui nescit, quam multa signorum legantur falsa; quanta sit hypothesium erronearum sylva, quantaque signorum temporum ratione graviditatis confusio. Scitu enim quam maxime necessarium est, unum, quod tenemus, signum, non per omne graviditatis tempus valere. Quædam primis mox a congressu horis diebusque fœcundum ejus arguunt successum, quin alia vicissim seriora non nisi suis temporibus probare aliquid queant.

Summam esse hujus cognitionis necessitatem summamque dignitatem, non est, quod dubitemus: Interest enim nuptæ (a), quæ prolis desiderio flagrans, ad levissimam graviditatis notam attendit atque gaudio triumphat, morbo licet nonnunquam abdominali, qualis v. g. hydrops est, aliove laboret: quo casu ipsis etiam medicis incumbit, ut, nisi veritatem exploratam habeant, in medicamentorum exhibitione cautissime agere studeant. Interest familiæ, parentum, vel etiam tutorum, ut de filiæ castitate persuasi sint: quin sunt virgines, quæ optant graviditatem, vel saltim eam prætexunt parentibus eo consilio, ut nubantur illi, a quo se compressas dicunt; sive id eo inscio & invito faciant, sive ejus adhibito consilio: quo parentes ea re ad concedendas inter eos nuptias, quæ alias irritæ forent, cogantur (b). Porro interest judicis non raro, qui medici æstimationem petit de femina capitis damnata, suppliciumque graviditatis prætextu eludente: sunt tamen feminæ, quæ carceris pertæsæ graviditatem negant (c). Denique interest medici naturæ & sanitatis ministri; quomodo enim hic succurrere, poterit, & regimini gravidarum prospicere, nisi graviditatem cognoscat, & de ea certus sit? Quam ob rem operæ pretium visum est mihi, argumentum medicum frequenter exercens, dilucidandum suscipere.

Verum

- (a) Conf. MAURICEAU *Maladies des femmes grosses*. L. I. C. III. pag. 73. seq.
- (b) Conf. SCHIMPER *Dissert. de sign. gravidit.* §. 29. p. 22.
- (c) *Exempla vid.* GUTERMANN *Anatom. für Hebammen*: pag. 37. *Angli She playth her belly.* Ita etiam SCHIMPER *Diff. de signis gravid.* §. 30. pag. 22. exemplum recenset Iudææ, capitis damnatæ, quæ omni studio & negabat & occultabat suam graviditatem, & peroptabat vna cum fœtu interire, quam permittere, ut infans, forte in lucem edendus, christianæ religionis solennibus innitiaretur.

Verum de ordine rerum maxime sollicitus, quum alia signa imprægnationis possibilitatem, alia vero factam conceptionem, alia denique ipsam graviditatem ejusque statum respiciant; non possum quin omnem tractationem in III. diducam sectiones, quarum Ima causas notasque sterilitatis muliebris, IIa factæ conceptionis signa graviditatisque statum, IIIa morbos quosdam graviditatem mentientes, quos accurata symptomatum disquisitio, quantum id fieri poterit, dijudicabit, conceptus item spurios, quibus cum vera graviditate magna nonnunquam analogia est, contineat.

S E C T I O . I.

§. I.

Naturalis ordo, quem prosequuntur sum, ita fert, ut de possibilitate conceptionis quærendum primo mihi videatur. Conceptionem, nisi accedant & ponantur debita requisita, ne cogitare quidem fas est. De ipso quidem utriusque sexus commercio, ad faciendam conceptionem utique necessario, & extra litem posito, constat. Differam saltem de illa conceptionis muliebris possibilitate, quæ fœcundam feminam requirit; siquidem feminam gravidam non esse facile persuademur, quum de sterilitate ejusdem, siue denegata concipiendi facultate certi sumus. Ne autem sterilitatis statim accusentur feminæ, quæ prole destituuntur, tenendum probe, proprie dictam sterilitatem impotentiam esse concipiendi fœtumque perficiendi in femina (d) debitæ ætatis, neque nimis teneræ, neque nimis profectæ, & viro potente ut, a propria vel organorum genitalium, vel totius corporis læsa constitutione dependentem. Ita huc non pertinent feminæ, quæ alias per naturam, propter ætatem

in

(d) HIPPOCRATES *Libro de sterilibus, utero non gerentibus*, ait:
istiusmodi feminas fructum nunquam in utero gerere.

in alterutro extremo vel infantiae vel senectutis versantur & conceptioni minus aptae sunt. Neque illae, quae non tam propria, quam alterius vel relativa culpa prole carent, sed quae viro sano conjunctae non concipiunt.

§. II.

Ex dictis facile apparet, causam tanti mali semper fere in organorum genitalium tam internorum quam externorum, maxime uteri, tanquam praecipuae conceptionis & formationis officinae, laesa constitutione varia latere. Differant licet ista vitia, maxime interna, ex signis quibusdam externis haud facile dignoscenda; conveniunt tamen, quod generationi destinatum viscus, uterum partesque annexas, vel idiopathico vel sympathico modo varie afficiant, & unum eundemque semper effectum, denegatam nempe conceptionem, exserant. Notanter dixi, segregatas non uno modo infœcunditatis causas esse, idque tam ratione loci, quam indolis. Hoc enim nomine genitalia nonnunquam occupant, quae dicuntur interna, unde sterilitas idiopathica, absoluta, occulta, vix ac ne vix quidem sanabilis, per omnem ætatem vigens, oritur. Aliæ vicissim sedem suam figunt in genitalibus externis, quae, quamvis itidem sterilitatem non raro inducant absolutam modo idiopathico, tamen apertae magis sunt, & quoad maximam partem conspicuae arteque superandae. In reliquis denique prorsus singularibus nihil peccat in genitalium organismo, sed habitus saltem debito, i. e. sano & naturali respondens desideratur, uterique inprimis intemperies ex totius corporis analogia culpanda venit (e). Inde est, ut triplicis generis tam
occulta,

(e) *Quales causas Medicorum Parens HIPPOCRATES Sect. V. aphor. 62. intellectas videtur his verbis: „Quae frigidos ac „densos habent uteros, non concipiunt, & quae perhumidos „habent uteros, non concipiunt; extinguatur enim ipsis ge- „nitura: Et quae siccus (plus aequo) & adurentes: alimenti „enim*

occulta, quam aperta vitia occurrant: omnia vero eo redeunt, ut vel primæ conformationi non sanabili debeantur, vel chirurgiam spectent, vel morbis, quos medici unice curant, adnumerari possint.

§. III.

Protinus itaque dicam de feminis eunuchis. seu quæ a prima nativitate, præcipuo generationis apparatu, utero (f), vel ovariis (g) carent. Quæ tam enormi vitio laborant calamitosæ, omnem sine dubio renunciant procreandi spem, neque est, ut unquam ipsis tantum reparetur infortunium. Pari cum illis passu ambulant, & pro absolute sterilibus habendæ sunt, quibus tubæ (h) fallopianæ dictæ in uterum penitus non sunt apertæ, seu nimis angustæ & adstrictæ. Ita hac hyeme in theatro anatomico apud ROEDERERUM vidi

*„enim inopia semen corrumpitur: Quæ vero ex utriusque
„moderatam noctæ sunt temperiem, hæ ipsæ prolifera eva-
„dunt.*

(f) Conf. COLVMB. de re anatom. Lib. XV. pag. 495.

(g) de quo defectu observationes anatomica leguntur apud COLVMB. anat. libr. XV. RIOLAN. anat. Cap. XXXV. DALECHAMPIVM in not. ad Libr. XVII. Athen. apud SCHENK. VESAL. RIVER. & BONET. passim.

(h) qualè quid præ cæteris accuratius observavit RUYSCHIUS & annotavit observ. anat. LXXXIII. p. 108. seq. ubi tubas fallopianas summe extensas & in extremitatibus suis occæcatas depingit, addita observatione, tubarum Fallopiarum clausuram haud infimam sterilitatis causam habendam esse. Et STALPART VAN DER WIEL Obs. rar. Cent. poster. Obs. 28. Sch. pag. 303. impervias adeo tubas vidisse, ut ne levissimus quidem flatus illas transiret, refert. Icone etiam exhibuit hoc vitium REGNERUS DE GRAAF. Tab. 19. fig. 3.

vidi uterum, cujus tubæ utrinque versus ovaria clausæ erant, coalitis fimbriis. Neque difficilis ratio est: siquidem ex ovario aliquid per dictam illam tubam seu ovi ductum in uterum ut ascendat, necesse est, quare desiderata hac via, vel ut transire possit minus apta, non potest non denegari conceptio: Eo minori etiam fructu aliquis huic adeo gravi & abscondito vitio mederi studeret, quo minus ex signis quibusdam externis tanti mali causa dignosci potest. Fit porro, ut seminalium vesicularum structura aberret, aut membranaciori i. e. compactiori vel carnosiori obvelata velamento (*i*), vel ipsis ovis crassioribus cinctis tunicis (*k*). Non tangam vasorum spermaticorum defectum (*l*), exilitatem (*m*), obstructionem, coalitum (*n*), paucitatem & quæ sunt alia.

§. IV.

Sequuntur vitia exterius magis locata, explorationi apta, circa uteri orificium & vaginam occurrentia. Etenim ut per vaginam in uterum virile semen deferatur, atque ita conceptionis mysterium inchoetur, vias haud præclusas esse debere, cuilibet facile erit perspectu. Denegatur adeo illis concipiendi facultas, quarum rima orificii uterini transversa vel in situ tortuoso aut perverso locatur (*o*);
vel

(*i*) Conf. DIONIS *Traité general des accouchemens* Lib. I. C. VII. pag. 67.

(*k*) vid. GARMANNI *dissertat. de ovo humano-cygnæ* 691.

(*l*) Conf. THEODOR. CRAANEN. *Tr. de homine* cap. 162.

(*m*) Conf. VESLINGIUS & GRAAFIUS.

(*n*) Conf. FRANCISCI DE LE BOE SYLVII *prax. med.* Lib. 2. Cap. 3. §. 10.

(*o*) Conf. MAURICEAU *Maladies des femmes grosses* Lib. I. C. I. pag. 61.

vel magnitudine & hiatu tum justo minori tum superante (p) peccat. Priori enim casu semen non recipitur, atque altero minus firmatur. Interim his ipsis imprægnatio subinde contingit, siquidem sunt, qui cognita vitii in orificio uterino causa, conjugis situm accommodatum suadent, quo semen versus orificium exacte ejaculetur (q).

§. V.

Præter ea cum viis clausis non possit non juncta esse sterilitas, ineptas ad sobolis procreationem esse feminas atretas, seu quæ dicuntur imperforatæ (r), facile patet. Et hoc quidem vitium, teste experientia, commune esse maribus & feminis potest, ita ut utriusque sexus infantibus recens natis anus aliquando sit imperforatus, aut parvulis urethra hoc modo in extrema parte, ubi glandem per-

(p) de quibus HIPPOCRATES *Lib. de Natur. Mulieb. § Lib. de sterilibus. In Hist. de l' academ. Roy. des Sciences. a. 1704. n. 13. observatio recensetur, qua interna vaginæ membrana super uteri orificium ita producta erat, ut duobus modo exiguis productionibus linearibus hiaret: in femina sterili lente & cum acri dolore menstruus sanguis profluere solebat.*

(q) vid. DIONIS *Traité general des accouchemens Lib. I. C. VII. pag. 68. § pag. 70. ubi singularem eius rei habet observationem his verbis: „HENRY II. fut plusieurs années marié „avec Catharine de Medicis, sans avoir des enfans. Le „Roi consulta FERNEL son premier Medecin, qui après avoir „examiné d'ou venoit le defect, lui en-seigna la posture dont „il se devoit servir en caressant la Reine, qui en eut sept „tout de suite.*

(r) *Imperforatarum exempla & observationes congeffit SCHENCK. Lib. 4. Observ. med. Obs. 12. 13 & 14.*

perforat, membranula sit clausa, de quibus passim in Ephemeridibus Naturæ curiosorum exstant observationes: interim proprie hic loci imperforatio ad feminas pertinet, & dicitur ATRESIA illud vitii genus, quo medio quodam intercedente obstaculo utcunque aditus, qui inter genitalia externa & interna esse debet, & feminis per vaginam in uterum accessus intercipitur. Est autem imperforatio duplex: alia integra, alia ex parte saltem vias claudens; atque utraque iterum vel congenita, vel ex morbo quodam chirurgico, vulnere, ulcere, tumore aliove infortunio, ut partu difficili & laborioso, oborta. Ceterum ipsi imperforationis modi varii sunt: Aliis interius orificium uteri ex conformationis errore ita clauditur, ut ne vestigium quidem rimæ transversalis appareat, sed hæc ita concreta sit, ut cavum quasi cæcum uterus referat. Hæ sunt, quæ concubitum quidem admittunt, sed frustraneum, nullo enim modo concipere possunt, nisi accedat operatio chirurgica, admodum difficilis hoc casu. Deberi hoc vitium primæ pravæque conformationi, si experientiis & observationibus (s) sua fides non est neganda, in dubium vocari nequit. Interim tenera adhuc ætate primisque a natiuitate annis non protinus ejusmodi vitia apparent, sed demum pubertatis ut plurimum termino, quo feminæ menstrua pati incipiunt. Tunc enim moliminibus menstruorum accedentibus ex plethora illa particulari ad pelvim varia oriuntur symptomata morbosa,

ea-

(s) *Natas enim nonnullas esse imperforatas recenset FABRIC. HILD. Lib. Obs. chir. Cent. II. Obs. 60 & 61. pag. 244. seq. it. DAN. SENNERTUS institut. med. Lib. 5. P. I. Sect. 2. cap. 7. quod & testatur PLINIUS Histor. Natur. Lib. 7. cap. 16. fol. 110. Puellæ IV. annorum exemplum narrat SIM. SCHULZIUS in Ephem. germ. D. I. an. III. Obs. 3. p. 5. & MAURICEAU duarum, virginis XVII & puellæ IV annorum, in qua vero operationem in profectiorem ætatem distulit, mentionem facit Tom. I. Lib. I. cap. I. pag. 60.*

eademque subinde vehementia. Colligitur enim sanguis abundans, qui sueto more eliminari nequit, in utero, cum abdominis duritie & expansione, ut hoc nomine graviditatem nonnunquam talia mentiantur (t); superveniunt porro, præter jam memorata, præsertim cum temporis mora hæc omnia possit exasperare (siquidem ipsa ejusmodi arcana muliebria satis ingeniosè celare sæpius student), ex læsa digestionem, borborygmi & crepitus ventris, appetitus irregularis vel depravatus, nausea, vomitus; inde mammarum tumor, spasmi, varia incommoda hysterica, affectus convulsivi, (qualia itidem fere sunt symptomata in illis, quæ ob corporis constitutionem morbosam suppressione mensium laborant) quin imò ipsa tandem misera mors; cujusmodi triste exemplum inter alios refert CASPARUS BAUHINUS (u), qui frustra applicatio cauterio potentiali, totum, cum vita defuncta esset matrona nobilis, uterum sanguine grumoso & atro plenum inuenit. Aliis idem orificium membranula obtegatur (x), quæ pariter imperforationem patiuntur integram, neque,

(t) *Hoc argumentum illustrari potest historia a IOH. MURALTO in Ephem. germ. D. II. an. III. Obs. 151. p. 296. recensita; „Octodecim annorum virginis imperforatæ, quæ tumore in „pudendis laborabat insigni, cum retentione & ardore vrinæ, ventris duritie circa umbilicum, & expansione ad „pubem usque, conatibus pariendi, ut de imprægnatione „nulli dubitarent; sed re propius perspecta, mox tumoris „cum pudendorum labiis undique cohesio, fluctuatio retentionis sanguinis alia docuerunt, & facta demum operatio „omnem virginis periclitantis pudicitiam vindicavit.„ Analogam fere morbi historiam atretæ cujusdam refert FABRIC. AB AQUAPENDENTE in oper. chir. pag. 279. it. in Actis Societat. Harlemens. T. V. a. D. P. SAUJE.*

(u) *in Theatr. anatom. Lib. I. Cap. 39. pag. 133.*

(x) *Conf. Cel. GEORG. HENR. EISENMANN Tabul. anat. IV. de*

que, nisi chirurgica opem ferat in edela, unquam concipiendi facultate prædita fore, æstimandæ sunt, recensitis symptomatibus pariter obnoxia. Operatio hoc casu facilior multo, quam quidem priori est. Denique imperforatæ integræ sunt, quibus hymen non perforatus ex toto obducit vaginam, sicque tum menstruis, tum membro virili viam præcludit (*y*). Quodsi igitur hoc incommodo, onere famoso æque ac commendabili, gravetur quædam, neque alia quacunque ratione, vel ipsa viri cohabitatione, perforetur hymen (*z*), illud

utero duplici in explicatione Tabula III. sub litt. (o) ubi ejusmodi, præter alia curiosa, membranam satis crassam, extremitatem cervicis uteri, qua in fundum uteri aperitur, instar valvula obturantem, in femina quinquagenaria, partum nunquam passa, se observasse testatur, ut ante cervicis dissectionem omnis in cavum fundi uteri transitus denegaretur MAURICEAU *Tom. II. Obs. 231. p. 189. & Obs. 495. pag. 409. plura exempla una cum operationibus vid. apud* HIER. FABRIC. *AB AQUAPEND. oper. chir. pag. 278. IOH. ANDREAS A CRUCE* *offic. Aur. Lib. 5. cap. 47. HENR. VAN ROONHUYSEN* *Observ. part. I. pag. 102. & 103. PAUL. BARBETTE* *chir. part. I. cap. 13.*

(*y*) *Conf. supra not. (t). DILLENIIUS etiam in Ephem. Acad. Nat. Cur. Cent. VII. Observ. 43. pag. 89. de puella sesquienni habet, cui membrana hymen totam vaginam occludebat: In puella octo nata annos* IOH. SCHMIED *in Ephem. germ. D. I. an. III. Obs. 124. pag. 198. & an. IV. & V. Obs. 157. pag. 199. totum pudendum membrana invenit obvolutum, relicto sultem minutissimo foramine. Alia exempla apud* J. DENYS *Verhandel. over het Ampt des Vraedmeesters. C. I. p. 5. sq. conferri quam maxime meretur MOSCHIO. Interpr. Latic. apud SPACH* *Gynec. p. 30.*

(*z*) *Id quod referente FABRICIO AB AQUAPENDENTE in oper. chir.*

illud vitium incisionem poscit cruciatam, operationem facilem, & ne coalescant iterum continui solutiones, turundæ applicationem. Quod attinet alteram imperforationis speciem, quæ ex parte saltem contingit, de illa, siquidem ut plurimum a partium læsione oritur, mox aptiori loco verba faciam.

§. VI.

Superfunt aliæ quædam causæ, quibus haud minus sterilitas adstringitur. Consona hæc vitia localia sunt cum prioribus, atque adeo tum partes imprægnationi dicatas, ovaria, tubas, tum conceptus provinciam, uterum, varie afficiunt, tum denique in exteriori genitalium ambitu locantur: unde est, ut aliis alia sint occultiora, alia vero sensibus usurpanda. Satis nempe compertum habent artis periti, vix aliquid, quin conceptionis statim sequantur turbæ, in tubis fallopianis mutati contingere debere: Quare fœcundæ esse nequeunt, quibus, observante DOLAEŒO, callo quacunque ratione oborto obstructæ sunt illæ tubæ (a), seu quibus calculus quidam in tubis alicubi hæret (b). Idem sane nascitur effectus, qui a tubis ex prima conformatione imperviis. Missis reliquis, ex quibus a causa externa, ut abdominis contusionibus, onerum ponderosorum gestationibus, lapsu ab alto, omnibusque in genere excessivis motibus, & quæ sunt similia, hæ partes vitium capere possunt, liceat hic saltem pauca enumerare. Tubæ fallopîi hydropem dari, compertum est

chir. fol. 278. non potuit præstari, quum accidit cuidam pedisseque, quam multi scholares frustra tentaverunt deflorare.

(a) *se aperuisse feminam sterilem, ait, cujus tubæ callo obstitæ erant; in Encyclop. Lib. 5. cap. 5.*

(b) *quin aliam, in qua tubas a calculo obstructas invenit, prouti refert loc. cit.*

est (c), quamvis valde rarus morbus sit: frequentius enim multo ipsa ovaria hoc morbo (d), cum variis vitiis, nonnunquam ad insignem satis molem usque (e) & interdum cum ascite conjunctim (*) tentantur, ut mirum profecto sit, cum in statu naturali satis parvæ molis sit ovarium (f), minorisque in eo conclusa ovula, in tantam sub morbofo statu vastitatem excrescere posse hydropicum (g), sed tan-

(c) Notavit hunc morbum BLEGNII *Zod. med. gall. an. 80. pag. 60.* & BRECHTFELD in *Act. Hafn. an. 72. pag. 194.* qualem etiam morborum in ovariis & tubarum simbriis observavit & depinxit RUYSCHIUS in *observ. anat. chirurg. Obs. 83. pag. 109.*

(d) de quo VESLINGIUS habet in *syntagm. anat. Cap. VIII.* insigniora etiam hujus morbi exempla apud BONETUM in *sepulchreto collecta legi merentur. cf. etiam ROEDERERI Progr. de Hydropse ovarii.*

(e) qualis ovarii hydropici elegantem habet figuram Ill. ALB. de HALLER fasc. I. *icon. anat. Tab. II. fig. I.*

(*) Cf. *Diss. J. J. FEHR de virgine hydropse utriusque ovarii cum ascite conjuncto laborante.*

(f) Hac tamen ovariorum magnitudo neque constans neque omnibus eadem est; sed pro individuorum diversitate modo majora modo minora observantur ovaria: etenim REGN. de GRAAF de *organ. mulieb. Cap. 12.* „maximam vero, ait, „in iis mutationem facit ætas & coitus, in junioribus namque animalibus minima sunt, ac in perfectioribus majora „evadunt. Speciatim de varia ovariorum mole conferri merentur ROEDERERI *Uteri humani icones, nominatim dimensionum ovarii tabulæ.*

(g) Conf. BONETUS *loc. cit.* SCHENCK *Lib. 4. Obs. med.* & MAURICEAU *Tom. 1. Cap. II. pag. 11.* se sinistrum speciatim ovarium mole hominis caput superans, XV librarum ponde-

tantus est in eruendis huius morbi similiumque adeo latentium signis diagnosticis labyrinthus, quanta est ipsius medicationis difficultas. Similem morbum æmulantur interdum sic dictæ hydatides (*h*), quæ sunt folliculi, lymphæ scatentes, ex ovariis vicinisque partibus pendentes, & ovulorum specie imperitos fallentes, quales frequenter in theatro anatomico Gottingensi vidi: fit enim, ut in ingentem aliquando excrescant molem, & ipsis ovulis fraudi sint, sterilitatemque pariant. Denique ovaria nonnunquam scirrhis (*i*) laborant, sive ex culpa jam præsentis scirrhi in eorundem vicinia enati malum oriatur, in mali consortium tractis ovariis, exsiccata substantia, & turgentibus alias vesiculis, succo nunc destitutis; sive ex propria quadam dispositione, orta quacunque inflammatione, non resoluta, neque in ulcus mutata, hoc malo unum alterumve afficiatur ovarium, quo casu, pro rerum euphoria fecunda nonnunquam perficitur conceptio, sæpius vero, conspirantibus præsertim aliis morborum vexis, illius spes elumbis vellicatur.

§. VII.

De uteri porro vitiis dicturus, præterire non possum illud principis medicorum HIPPOCRATIS effatum (*k*), qui pinguioreseminas

re in femina quadam vita extincta invenisse testatur, quam eandem observationem curatius exposuit Tom. II. Observations sur la grossese &c. Obs. 383. pag. 318.

(*h*) Conf. REGNERUS de GRAÆF Lib. cit. cap. 12. pag. 301. IOH. MURALTUS Colleg. anat. Lect. 2. pag. 182. & NENTERUS in physiol. cap. 2. pag. 44. seq.

(*i*) ita dextrum ovarium scirrhosum vidit OTHO HEURNIUS Obs. med. histor. 8. pag. 13. Steatomaticum aliud GOTHOF. KLAUVNIGIUS in Ephem. Acad. Nat. Cur. Cent. VII. & VIII. Obs. 64. pag. 141. observavit.

(*k*) quod legitur Sect. V. aphor. 46. his verbis: „Quæ præter

A a a

„na-

minas negat esse fecundas: sed errant, qui creduli harumque partium anatomes haud gnari, nimis, huic indulgent asserto, & cum aliis (l) potissimum omenti crassitiem, quæ uteri orificium premat, & hanc ob causam liberum virilis spermatis transitum deneget, in culpa habent, vel cum aliis ob nimiam pinguedinis copiam, circa hæc loca speciatim uteri orificium collectam, concipiendi impedimentum inepte derivant (m); siquidem nihil substantiæ pinguedinis ullo modo similis per anatonem ibidem locorum detegere valemus, & si forsan hujus pinguedinis aliquid ibi locetur, pauca tamen est, adeoque mollis, ut obstaculo vix esse queat.

§. VIII.

Fide digniora multo sunt alia sterilitatis intuitu, quæ de uteri morbis dici possunt, ita ut dubium mihi non restet, certissime illas fecundi seminis vim non percipere, quibus vel ex parte vel totus uterus scirrhusus (n) est; quomodo enim uterus obstructus, durus, steato-

„naturam crassæ existentes, non concipiunt in utero, his omentum os uteri comprimit, & priusquam attenuentur, prægnantes non fiunt”.

(l) quale quid intellexisse videtur PANAROLUS Obs. med. Pentecost. III. Obs. 10. ubi ejusmodi exemplum feminae cujusdam ceterum quoad omnem corporis habitum sanæ profert.

(m) Conf. DIONIS *Traité general des accouchemens* Lib. I. Cap. VII. pag. 69.

(n) de quo morbo ROEDERERUS exposuit in peculiari dissertatione de uteri scirrhuso, hic Gottingæ habita an. 1755. Eisdem causæ ovariorumque siccitati feminarum ætate profectiorum sterilitas naturalis adscribi debet. Conf. ROEDERERI Icon. uteri gravidi. Ita & GERARD. BLAS. Obs. med. part. 1. Obs. 7. pag. 12. septuaginta annorum virginis mentio-

steatomaticus (o), cartilagineus (p), quin lapideus fere (q) conceptionem pati, fovere, nutrire illam atque continere potest, quum tamen ad munera hæc fungenda corpus uteri requiratur absolute spongiosum cedensque. Frequens interim malum est, & plerumque ab uteri inflammatione (r), quacunque ratione, vel ex partu difficili &

tionem fecit, cujus uterus octodecim librarum pondere pinguedinem referebat cartilagineam. Scirrhosum teterrimi odoris pure repletum TUDECIUS notat in Ephem. germ. D. I. an. IX. & X. Obs. 176. & MAURICIUS HOFFMANNUS in Ephem. Acad. Nat. Cur. Cent. VII. & VIII. Obs. 127. pag. 296. & ibid. ANDR. USENBERZIUS Cent. IX. & X. Obs. 31. p. 65. de utero toto duro in substantia & scirrroso vid. Act. med. Berolin. Decad. II. Vol. 4. pag. 71. totum scirrhosum, ut cultro, quamvis acutissimo nonnisi vi discindi potuerit, SIM. SCHULZIUS refert in Ephem. germ. D. I. an. II. Obs. 60. bina adhuc similia fere exempla notavit DETHARDING in Ephem. germ. D. III. an. VII. & VIII. append. pag. 69. seq.

(o) Cujus observationem habet IOH. TACKIUS in Ephem. germ. D. III. an. VII. & VIII. Obs. 152. pag. 274. Observationes hac spectantes recenset DENYS l. c. Cap. I.

(p) Ipsius uteri substantiam totam cartilagineam refert CNOELFELIUS in Ephem. germ. D. I. an. IV. & V. Obs. 57.

(q) referente SCHENCK Obs. med. Lib. 4. pag. 608. & GEORG. HORSTIO in oper. Tom. II. Lib. 2. Obs. 2. pag. 522. De calculis matricis observationes cum judicio collegit LOUIS in mem. de l'acad. de Chirurgie. T. V. p. 1. sqq. in quibus passim sterilitas annotatur. Obs. IX. XII. XIII.

(r) testante PAULO AEGINETA de re medica Lib. III. cap. 68. „in scirrbum induratur uterus, aliquando derepente, nulla prae-
gressa causa: plerumque vero inflammatione præ-

& frequentiori abortu (s), corruptis conceptionibus (t), vel alia uteri læsione causata ortum ducit. Neque vero integrum semper uteri corpus gravi hoc vitio laborat; nunc enim unam alteramve partem, nunc fundum, cervicem aliumve locum occupat (u). Præterea facile erit perspectu, tantam causam non sine aliorum gravium symptomatum, menstruum imprimis variarum turbarum (x), esse consortio. Observationum huc spectantium sylva fere est, neque dissentiunt in eo auctores, quod hisce præsentibus, juncta esse nequeat concipiendi aptitudo (y); eoque minus in hoc argumento dubii hæremus, quum ipsa HIPPOCRATIS auctoritate hæc omnia suffulcianur (z). Quod demum respicit hujus morbitam diagnosin quam

„gressa, & neque soluta, neque in abscessum transmutata.

(s) *quorum scirrhorum meminit MAURICEAU Tom. I. Lib. III. Cap. XII.*

(t) *qualem uterum substantiæ partim scirrhusæ, partim glandulosæ, putrida & nigricante materia repletum ex corrupta conceptione vidit REGNERUS de GRAAF in Ephem. germ. D. I. an. I. Obs. 128.*

(u) *de scirrho insignis magnitudinis, a fundo uteri incipiente, & ad os uteri desinente conf. GEORG. HORSTIUS in oper. Tom. II. Lib. 2. Obs. 5. pag. 62.*

(x) *de quibus apud HIPPOCRATEM Lib. de superfætatione §. 13. & de natur. muliebri S. II. §. 30. 31. & alibi passim.*

(y) *impeditæ ex scirrho uteri conceptionis mentionem fecerunt FABRIC. HILDAN. Obs. chir. Cent. I. Obs. 65. & 66. pag. 57. BARTHOLINUS Cap. II. histor. 60. RHODIUS Obs. med. Cent. V. Obs. 65. & casum habet MAURICEAU Tom. II. Obs. 387. pag. 321.*

(z) *de natur. mulieb. loc. cit. „si indurati fuerint uteri, non „concipit, & passim de morbis mul. spectant huc etiam MAU-*

RICEAU

quam prognosin, qualis accommodata sit medicatio, qualis iustus mercurialium usus, hæc omnia atque alia melius ex laudanda de uteri scirrho dissertatione addiscuntur.

§. IX.

Graves etiam morbi uteri hydrops (a) & tympania (b) sunt. Uteri verus hydrops datur omnino (c), sed satis rarus est, atque periodicus, ut vel in cavo uteri, vel spongiosa substantia aqua colligatur, & retenta spasmis oris uteri per intervalla, mensstruis interdum periodis evacuetur, interdum vero per insigne temporis spatium contineatur, & graviditatis simulacris & peritissimos sæpe (d) decipiat.

§. X.

RICEAU *Observationes* Tom. II. 387 & 418, utrobique enim post partum difficilem obstructio uteri scirrhusa sterilitatem peperit.

(a) de uteri hydrepe proposuit KERKRING. lib. cit. *Observ.* 10. ex TULPIO, ubi utrumque uteri cornu novem circiter aquæ purisque libras continuerat.

(b) cujus morbi bini exstant casus in *Act. Haf. Vol. II. Obs.* 43. pag. 136. Conf. etiam *Ephem. germ. D. II. an. V. Append.* pag. 57. MAURICEAU Tom. II. *Obs.* 105. pag. 87. & *Obs.* 110. pag. 90.

(c) sic Augustæ in mulieris textricis utero aquæ post mortem una cum multis peritis supra sexaginta mensuras augustanas reperit ANDR. VESALIUS, nullibi circa intestina præsentem aquam, neque œdematosum in pedibus manibusve tumorem. vid. ejusd. *Anat. Lib. V. cap. 9. pag.* 394.

(d) fatente ipso DE LA MOTTE *Traité complet des accouchemens* Lib. I. *Obs.* 16. pag. 42. qualem casum etiam habet BONNETUS in *sepulchret.* Lib. III. *Seçt.* 21. *Obs.* 55. pag. 1140. &

§. X.

Neque minori iure steriles habendæ sunt, quæ uteri (e) vel vaginæ ulceribus (f) laborant; quibus polypus alicubi genitalium hæret (g); quibus obstaculum est omnis alius tumor (h), fungus circa uteri cervicem excrescens (i) & sarcoma (k) totum vaginæ ambitum occupans, forasque propendens (l); caro excrescens (m),

similia multa sub graviditatis larva annotavit ibid. pag. 1130. seq.

(e) Cujus notatu digna exstat relatio in *Ephem. germ. D. III. an. IX & X. Obs. 154. pag. 280.* ita & uteri cervicis ulcus in muliere juvencula & sterili observavit FELIX PLATERUS *Obs. Lib. II. pag. 480. & pag. 476.* ulceris uteri & vesicæ cervicis exemplum refert. de utero inflammato ex furore uterino, quæ inflammatio ad tubas & ovaria transit vid. *Ephem. germ. D. III. an. V. & VI. Obs. 124. pag. 253.* HARVEJUS de partu. p. 370.

(f) qualis ulceris in vagina virginis historia atque sanatio exstat in *Commerc. Litt. Nor. an. 1731. specim. VI. pag. 43.*

(g) cujus polypi uterini carnosissimi meminit RUYSCHIUS lib. cit. *Obs. 6. pag. 12. seq. quem æque ac alios RUYSCHIUS ibid. delineavit. de polypo exiguo in cavitate circa uteri fundum reperto conf. Ephem. Acad. Nas. Cur. Cent. IX & X. pag. 509. & 517.*

(h) vid. FABRIC. HILD. loc. cit. & MAURICEAU Tom. I. Lib. I. cap. XXV. p. 181.

(i) Conf. TULPIUS Lib. III. *Obs. med. cap. 33. pag. 247. & cap. seq. p. 251. & KERKRING specileg. anat. Obs. 53. pag. 113. seq. & Ephem. germ. D. I. an. II. Obs. 121. pag. 199. & ibid. D. II. an. II. Obs. 176. pag. 413.*

(k) cf. CELSUS Libr. VI. cap. 18. no. 11.

(l) de quibus KERKRING specileg. anat. Obs. 53. BONET. anat. pract.

(*m*), maxime carcinodes; clitoridis prominentia major (*n*) & monstrosa, quæque ejus generis alia sunt. Facile quisque, qui horum juncta symptomata, & ea, quæ inde enasci possunt, recte ponderat, persuasus erit, omnem hisce sub vitiis localibus, frequentissime saltem, denegari conceptionem; vel enim mali vis, & indoles maligna, vel morbus comes, & hinc utrumque symptomatum confortium, fœcunditatem recusant, vel & genitalium eousque, ut insequatur conceptio, commercium fieri nequit, quin atrocissimi dolores summique oriantur cruciatus. Non omnem quidem hæc mala chirurgica curationem respuunt, interim, quamvis sanetur vel tumor, vel ulcus &c. frequentissime tamen contingit, ut aliud superfit incommodum, unde olim denegetur conceptio, prouti memorabile refert exemplum DE LA MOTTE in observatione quadam, ubi per abscessum in latere orificii uteri interni, facta cicatrice, in oppositum latus distortus fuit naturalis orificii situs.

§. XI.

Læsiones præterea partium genitalium, uteri vulnera (*o*), quin
ejus

præct. Lib. III. S. 22. Obs. 7. MEEKREN Observ. med. chir. cap. 54.

(*m*) *cujus historia refertur a CASP. THEOPH. BIERLINGIO in Ephem. germ. D. I. an. II. Obs. 208. pag. 310. de excrescentia, uteri prolapsum mentiente, observationem refert THOM. BARTHOLINUS Histor. anat. Cent. II. histor. 58. pag. 239.*

(*n*) *cujusmodi steriles annotatae habentur apud PLATERUM Obs. 6. & TULPIUM Obs. med. Libr. III.*

(*o*) *Conf. Ephem. germ. D. I. an. IX. & X. Obs. 65. pag. 155. adjecta simul curatione & Ephem. Acad. Nat. Cur. Cent. V. Obs. 56. pag. 87. seq.*

ejus amputatio (*p*), non possunt non steriles reddere feminas. Superfunt læsiones, quæ sine omni culpa obstetricantis a partu difficili sæpenumero & laborioso partibus genitalium utriusque generis detrimento junguntur. Rarum scilicet non est, feminam partum perquam difficilem passam & superstitem, variis, genitalium habitum mutantibus, malis affici (*q*), cujusmodi speciatim læsiones uteri cervici, orificio atque vaginæ contingunt, quibus fit, ut laceratæ partium fibræ vel totæ concrecant, vel productis laciniis, relictisque hiatibus jungantur, atque adeo vel integra (*r*), vel partialis saltem oriatur imperforatio (*s*). Prophylaxis hujus mali cannula amplior multiforis est, ab istiusmodi partu applicata, quæ quippe coalitus optime præcavet.

§. XII.

Sed futuræ vel conceptionis vel sterilitatis respectu dispiciendum, qualis sit viarum naturalium clausura? quodsi enim atresia orta

(*p*) *Uteri resekti casus refertur a GEORG. VOLKAMERO in Ephem. germ. D. I. a. VII. & VIII. Obs. 73. pag. 102. it. conf. LUD. MICH. DIETERICH'S Rede von einem wahren Vorfall und darauf glücklich unternommenen Absetzung der Gebärmutter. Regensp. 1745.*

(*q*) *Conf. MAURICEAU Tom. I. Lib. III. cap. VIII. pag. 400. seq. & Tom. II. passim exstant observationes.*

(*r*) *Conf. FABRIC. HILD. Lib. Obs. chir. Cent. VI. Obs. 67. pag. 581.*

(*s*) *quorūsum congruentes observationes spectant, quæ passim apud DE LA MOTTE Traité complet des accouchemens leguntur, speciatim obs. 337. feminae cujusdam, cui in partu difficili vaginæ labia &c. dilacerata & coalita erant, per operationem restitutæ. Alii casus huc spectantes augustarum etiam ex naturali conformatione vaginalium in Commerc. Lit-*

ta est integra, alia non est æstimatio, quam quæ superius tradita: sin vero quoad partem facta, futuram, testantibus observationibus (t) & experientia assertrice (u), conceptionem haud impedit. Scilicet nil impedit, quo minus fœcunda vis feminis in uterum & ovaria nonnunquam penetret (x). Inter obstetricatores DE LA MOTTE (y) in explicandis hisce phænomenis hypothese de aura seminali multum tribuere videtur; sed cum alii (z) complures non desint aliter seu-

Litterar. Noric. Vol. IV. p. 20. Hist. de l' acad. R. d. Scienc. a. 1712. & 1748. p. 58.

(t) *Conf. DE LA MOTTE lib. cit. Obs. 338. ubi in femina, quamvis ex præcedenti partu laborioso vaginæ coherentiam passa fuerit, nihilominus denuo gravida, eandem instituit operationem, qua fœtus exclusio acceleretur.*

(u) *ROEDERERUS ejusmodi puellæ exemplum, ad instantem usque partum hymene imperforato adeo, ut vix calami crassitiem admitteret, præditæ, retulit. Analoga historia legitur apud MAURICEAU Tom. II. Obs. 489. pag. 405. ut & ibid. Obs. 583. p. 481. Act. Suecic. Vol. XX. p. 180. E. N. C. Dec. III. an. 28. Obs. 83. 489. cf. Præl. HALLER, in Bærbæve T. V. P. II. p. 183.*

(x) *FABRIC. HILDAN. Lib. Obs. chir. Cent. III. obs. 60. pag. 224. exempl. II. atretæ cujusdam casum refert, cui, quamvis collum matricis membrana satis valida, foraminulis tamen ad expurgandos menses pertusa, clausum esset, sexto post factam operationem mense, infantem sanum ac maturum genuit, ergo semen hoc casu exigua hæc foraminula transiit.*

(y) *Traité complet des accouchemens Lib. I. Cap. V. pag. 27.*

(z) *inter quos unice MAURICELLUM voco, uti ex ipsius observationibus Spho Diff. XII. citatis videri licet.*

sentientes, facta saltem enarrare, omnemque ceterum mittere hanc litem mecum constitui.

§. XIII.

Differt operatio pro 'mali genio: facilis admodum, si naturalium viæ media membranula inter se cohærent, decussatim incidendo illam (a), adhibitâ cautione, ne urinæ iter aliave violentur, turundam immittendo vel siccam, vel digestivo quodam inunctam, atque fascia firmando: difficilior, si ipsi parietes inter sese concreverunt; tunc enim scalpello provide incisio fieri debet ad lineam rectam, satis amplâ, medendum hæmorrhagiæ forsan supervenienti (b), & reliqua perficienda sunt ad regulas vulnerum generaliores, unde facile patet, difficiliorem etiam multo in uteri ore institui operationem, quamvis fere omnes eædem sint encheireses.

§. XIV.

Quibus gravidis hoc malum contigit, illis cautela sit, ut operationem patiantur ante instantem partum (c). Caput quidem dolorum vi compressum, exteriora versus tendens, facili hanc ipsam operationem perficere posset negotio (d); interim præstat, ut artis
ope

(a) qualis CELSI methodus est. conf. Lib. VII. Cap. 28.

(b) Conf. CELSUS loc. cit. qui linamenta in longitudinem implicita, aceto saturata immittere jubet.

(c) MAURICEAU Tom. II. Obs. 489. hoc casu monet, ut obstetrix digito hanc membranam dilaceret.

(d) cujus rei historiam recenset GUIL. HARVEIUS in exercit. de generatione & partu pag. 360. „Novi, inquit, mulierem, quæ a difficili & laborioso partu integrum vaginæ ambitum interiorem laceratum atque excoriatum habuit, adeo, ut, finito puerperio, licet gravida denuo fieret, tamēn

ope labia sejungantur, ne foetus forsan præter necessitatem vel in utero retineatur (e), vel violenter prorumpens genitalia laceret.

Quæ
 „men non solum orificii pudendi latera juxta nymphas coa-
 „lescerent, sed totius quoque vaginae cavitas usque ad in-
 „ternum matricis osculum prorsus connasceretur: unde nec
 „virili membro, nec specillo quidem ingressus patuit, ne-
 „que menstruorum fluxui egressus. Instante itaque parien-
 „di tempore, torquebatur mesella per quam miseris modis,
 „omnemque spem deponendi sarcinam abiecerat: quare or-
 „dinatis rebus suis, amicis præsentibus valedixit. Cum
 „ecce inopinato, robusti admodum foetus summo conamine to-
 „tus ille tractus dirumpitur, fitque insperatus partus; &
 „validus infans, sibi matrique suæ salutis autor existit;
 „viamque apertam aliis post nascendis reliquit. Idoneis
 „enim adhibitis remediis, mater pristinam valetudinem re-
 „cuperavit. Atque aliud ibid. addit exemplum magis me-
 „morabile, his verbis: „Serenissima Angliæ Regina equam
 „candidissimam, formæque eximie dono acceperat: ejusque
 „genitalia (ne ab equis admissariis initia corporis gratiam,
 „atque equitandi usum admitteret) equisones (ut fieri so-
 „let) anulis ferreis infibulaverant. Eadem vero, (nescio
 „quo pacto, nec custodes mihi nondum judicare poterant)
 „facta est gravida; tandemque, cum nihil tale suspicaren-
 „tur, noctu peperit, pullusque vivens mane ad matris late-
 „ra conspicitur. Id cum mihi nunciaretur, adii illico lo-
 „cum, vidique ambo vulvæ labia anulis consuta, totumque
 „pudendum versus sinistrum latus detrusum. abruptum, &
 „a dextra coxendicæ laceratum adeo; ut, soluta, per incre-
 „dibilem foetus vim, partis robustissimæ unitate, facile ei
 „per ingentem illum hiatus exitus pateretur. Tantus sci-
 „licet est maturi vegetique foetus vigor & efficacia.

(e) vid. DE LA MOTTE lib. cit. obs. 339. & 340. ubi in partium

Quæ resstant causæ externæ, levioris momenti sunt: si forsan pudendorum viæ angustæ nimis (*f*), seu vagina arida nimis veneris exercitium ob dolorum in coitu præ voluptate incommodum sperneret, his facile ex indicatione consulitur.

§. XV.

Quum vero concipiendi aptitudo ex fluxu menstruo potissimum dijudicanda sit, & ætatis discrimen semper fœcunditatis ratio sequatur, fieri aliter nequit, quin ex ætate sterilitatem, pariendique facultatem assumemus temporariam. Quem enim fugit, tenerioris ætatis cum nimis profecta ætate eadem esse phænomena: siquidem omnis puella cum vetula sterilis est, quæ media ætate utraq; sunt fœcundæ. Quas quidem causas naturales non omni attentione indignas fufius paulo attingere liceat. Lunarium autem purgationum causas explicare vix scopum impleret; hinc maxime de menstruorum termino, quatenus conceptionem & graviditatem respicit, verba facere e re erit.

§. XVI.

Menstruationis tempus pubertatis terminus est: scilicet cum puberes fiunt virgines, sanguinis congestio versus genitalia dirigitur turgescencia, ipsaque effluit. Hoc quidem contingit ut plurimum circa annum XIV-XV: interim non omnibus commune idem tempus

genitalium coherentia semper exercuit operationem, ne partus diutius moretur, sed fœtus citius eo, & minori eum matris periculo in lucem ederetur.

(*f*) de quo incommodo MAURICEAU loquitur Tom. I, Lib. I. Cap. I. pag. 59.

pus (g) est, sed excipiuntur utique, quæ dispositione præ reliquis singulari huicque naturali excretionis actui magis minusve adaptata utuntur; quin si observatorum libros (h) evolvimus, mira plane edoce-

(g) Decimo ætatis anno prorumpentes menses annotata in salacissima quadam sunt in *Ephem. germ. D. I. an. III. Obs. 151. schol. pag. 274.* Idem refert LENTILIUS in *Ephem. germ. D. III. an. V & VI. App. pag. 119.* Undecimo ætatis anno menstruatæ novisse puellas testatur DAN. SENNERTUS *Præct. med. Lib. IV. part. 2. Sect. 2. cap. I.* & plerumque salaces fuisse addit. IOH. RHODIUS *Obs. med. Cent. III. Obs. 48. pag. 144. ut & BAL. TIMAEI a GULDENKLEE. Obs. Lib. IV. Cas. 13. pag. 211.* virginis meminit, ætatis anno undecimo menstruatæ, quæ cum duodecimo anno nupserit, plurium postea liberorum mater fuit. Duodecimo ætatis anno menstruatæ exemplum refert FABRIC. HILDAN. *Obs. chir. Cent. II. Obs. 60. pag. 135.*

(h) Puellarum enim annorum novem & octo menstruatæ exstant observationes in *Ephem. germ. D. I. an. IV. & V. Obs. 23. pag. 25. & ibid. D. II. an. V. Obs. 78. pag. 184. vid. etiam BARTHOLIN. Hist. anat. Cent. III. hist. 91. MAURICEAU Tom. II. Obs. 392. pag. 230. Act. Hafn. Vol. I. an. 79. pag. 161.* Annorum septem & sex copia pariter observationum est, in *Ephem. germ. D. III. an. VII. & VIII. Obs. 140. pag. 259. Ephem. Acad. Nat. Cur. Cent. I. & II. Obs. 42. pag. 111. Journal des sçavans Tom. XI. pag. 138. Ephem. germ. D. II. an. V. Obs. 78. pag. 184. D. I. an. III. Obs. 114. pag. 185. KERKRING. specil. anat. Obs. 12. pag. 32.* Quinque quatuor annorum vid. BARTHOLIN. *Hist. anat. loc. cit. Ephem. germ. D. I. an. VI & VII. Obs. 63. pag. 91. ut & D. III. an. VII. & VIII. Obs. 149. pag. 267. Journal des sçavans Tom. II. pag. 39. 112. TULP. Obs. med. Lib. III. cap. 36. pag. 256. A-*

docemur: partim vero hi casus præternaturales & morbose (i) sunt, partim, quamvis naturales, rari satis, ut valeat hic omnino: *quæ maxima ex parte fiunt, ea maxime secundum naturam sunt.*

§. XVII.

Quibus itaque sueto tempore menstrua contigerunt, iis, ut prolem concipiant, corpus dispositum esse, & cessante fluxu menstruo concipiendi facultatem cessare (k), recte judicamus: quamvis alia nonnunquam, sed rarior, doceat experientia. Juniores autem quasdam, antequam menstruatæ sint, concipere, non est, quod miremur: siquidem non adeo stricte requiritur, ut menstrua semel & pluries apparuerint, sed sufficit ad concipiendi facultatem, jam adesse dispositionem ad menstrua (l), uterum esse spongiosum, & nisum

tate trium & duorum annorum in Ephem. germ. D. I. an. III. Obs. 114. pag. 185. & ibid. an. IX & X. Obs. 27. pag. 84. STEPHAN. BLANCARD. Collect. med. physie. Cent. I. Obs. 81. Unius anni puella menstruatæ exstat casus in STALPART. VAN DER WIEL Obs. rar. Cent. 1. Obs. 77. Recens natarum exempla leguntur apud KERKRING Lib. cit. Obs. 87. BOHNIUM Circul. anat. physiol. Progynin. 16. pag. 243.

(i) Quorsum puellæ historiam refero recens natæ, quæ menstruum fluxum passa, convulsionibus demortua est. vid. Commerc. Litt. Nor. an. 1734. hebdom. XLIV. pag. 347.

(k) Quod confirmatur a GEORG. ERNEST. STAHL Theor. med. physiol. Sect. I. membr. 8. pag. 384. his verbis: „Excretio sanguinis menstrui habet illud peculiare, ut cum pubertate feminina sese exferat, quo conceptioni idoneæ sunt femellæ, & desinat iterum & evanescat, quo tempore femina concipere desinunt.

(l) Quorsum spectat observatum BINNINGERI Lib. Obs. & curat. Cent.

nifum illum adesse, qui præcedere solet menstrua primum erumpentia: id quod exemplis illarum, nimis fertilium, quæ vix peracto puerperio, denuo concipiunt durante lactationis stadio antequam menstrua erumpant, adeoque in perpetua quasi graviditate versantes, hanc excretionem impediunt, illustratur.

§. XVIII.

Incertus autem ultimæ menstruationis finis est, prouti primæ eruptionis vacillans limes: Vulgo quidem menstruationis terminus circa ætatis annum XLV absolvitur, sed pro temperamenti, naturæ virium, similiumque circumstantiarum varietate & hoc naturæ negotium

Cent. II. Obs. 55. pag. 188. Mulieris cujusdam, quæ juvenis, decimo quarto circiter ætatis anno viro nupsit, mox concepit & peperit, quum teste marito ipsaque affirmante, antea nunquam fluxu menstruo tentata fuisset. Similem femina XVI. annorum nondum menstruata, tamen gravida, observationem habet MAURICEAU Tom. I. Lib. I. Cap. X. pag. 54. & Tom. II. Obs. 393. pag. 326. Et femina XIII. annor. quamvis nondum menstruata, tamen gravida meminit DE LA MOTTE Trait. complet des accouch. Lib. I. Cap. IX. Obs. XXIII. pag. 52. seq. & ibid. Obs. XXIV. pag. 53. idem refert de femina XVIII. annor. Conf. etiam Ephem. N. C. Vol. I. pag. 293. de HAHN. Diss. de morbillis variolarum vindicibus, & IAC. DENYS Verhandeligen over het ampt der Vræd-meesters en Vræd-Vrouwen Cap. IV. pag. 79. notat, in asia feminas nonnunquam ante menstrua concipere, & in universum menstrua rariora esse & parciora. KLEIN in Libr. de aëre, aquis & locis agri Eibacensis, memorat plures ibi dari feminas, quæ nunquam lunarem ex vulva expertæ sunt purgationem, non impedita fertilitate. S. II. pag. 250. S. III. p. 184.

gotium differt (m), ut vix regulas tradere, & omnem rem curatius determinare quis valeat. Interim hoc probe tenendum est, citius eo lunare tributum cessare, quo ocyus puella fluxum experta fuerit; In Hispania enim ubi mature satis hunc fluxum experiuntur virgines, cito etiam desinit, ita ut XXX. ætatis anno tota frequenter periodus absoluta sit. Quo etiam sæpius femina edidit partum, eo maturius semper cum fluxu menstruo cessaturam in ipsa fœcunditatem esse: unde etiam fit, ut virgines quam diutissime mensibus gaudeant, seque illos pati adhuc, quamvis adscnescentes, sæpius, nisi dolus sit, affirmant.

§. XIX.

Ultimum æque finem, ac primam eruptionem variæ molestiæ comitari solent. Minuitur sensim sensimque ultimis periodis fluxus, tandem propter vasorum & fibrarum strictiones penitus non amplius apparet. Quamvis vero uterus tum ita comparatus sit, ut vias claudat, sanguinique irruenti præpediat iter, plethora tamen peculiaris illa

(m) *Miræ admodum apud auctores exstant observationes. Ita sexagenariæ adhuc menstruatæ casum refert RHODIUS Obs. med. Cent. III. Obs. 48. pag. 144. In femina sexagesimum septimum annum agente menses observatos habet LENTILIUS in Ephem. germ. D. III. an. V & VI. App. pag. 118. septuagenariæ mentionem facit SIM. SCHULZIUS in Ephem. germ. D. I. an. III. Obs. 151. pag. 274. Septuaginta sex annorum uxoris adhuc menstruatæ meminit BRUCKELIUS in Ephem. germ. D. I. an. IX. & X. Obs. 9. pag. 46. Et conferri adhuc merentur Ephem. Acad. Nat. Cur. Cent. I. Obs. 42. pag. 110. & ibid. Obs. 115. pag. 239. ut & Cent. VI. Obs. 74. pag. 333. Femina, quæ ab anno ætatis XIV. ad annum ætatis LXXII. mortemque menstruum sanguinem profudit, mentio fit in Gazette salulaire a. 1761. n. X.*

illa ad pelvim nondum una sublata est, quare feminae valetudinariae fiunt vario modo; protrahuntur enim congestiones, ibique locorum facile stagnantes, non uno modo symptomata morbosa illis gravidarum analogae, bonas vetulas vana spe decipientia (n), abdominis, mammarum inflationem, nauseam aliaque pariunt: sed dum in vigore versatur hic morbus, ultima scena, haemorrhagia uteri, critice supervenit, succedaneas humorum collectiones expurgans, omnemque ex improviso bonae causae spem conterit, quo demum peracto stadio, aut fausta valetudine fruuntur & obesiores ut plurimum fiunt, aut naturae viribus destitutae, recurrentibus praesertim haemorrhagiis phthisicis in ipsam phthisin incidunt (o) vel apertam vel latentem; aut varii alii morbi subnascuntur.

§. XX.

Quamvis autem menstrui sanguinis quantitas pro individuorum natura, integris nihilominus concipiendi pariendique viribus, varia esse possit; excipiantur tamen proprie sic dictae viragines (p). Praeter illud enim, quod ad virorum naturam fere accedentes (q), coloris aliquando sint fusci, corporis compacti, mammarum solidiorum, minorum, vocis gravis, fortiores, hirsutiores, quin barbatae interdum fiant, vel nullos plane menses patiantur, vel parcissime saltem menstruatæ sint, quamvis ceteroquin sanæ, uterum habent

natu-

(n) Conf. MAURICEAU Tom. I. Lib. I. Cap. VI. pag. 25.

(o) Conf. ANDR. PASTA Diff. sopra i menstrui delle Donne Bergamo. 1759.

(p) de quibus FELIX PLATERUS Prax. Tom. I. Cap. 14. pag. 504. loquitur: Quibus menses, quod tamen rarum est, nunquam fluxerunt, ideo, quasi virilem naturam induissent, viragines dicuntur.

(q) Teste jam AETIO Serm. 26. Cap. 51.

naturali modo induratum & quasi scirrhosum, ut hoc nomine concipere nequeant, quamvis & hic non fideant observationes in utramque partem (r): omnium instar illud autem tenendum est: rarioribus

(r) Ita factæ conceptionis exempla sine ullo fluxu menstruo antea passo legimus in Ephem. germ. D. II. an. IV. Obs. 126. pag. 249. matris secunda annorum XXVII, quæ quamvis durante virginitate fluxu menstruo laboraverit, per totum matrimonii tempus illo nunquam tentata fuit, licet aliquot peperisset liberos: & ibid. D. II. an. I. Obs. 41. pag. 114. rarus itidem casus exstat trium filiorum matris, nec cum virgo esset, neque in matrimonio, neque per, neque post partum menses aut lochia passæ. Sic etiam de matre omni anno secunda nunquam menstruata refert DOLÆUS in Ephem. germ. D. I. an. VI & VII. Obs. 64. pag. 92. & ibid. D. I. an. III. Obs. 265. pag. 479. femina quædam XXX. annorum sex liberos feliciter enixorum mater evasit sine ullo fluxu menstruo & ne quidem lochia fudit. & ibid. Obs. 132. pag. 243. de femina loquitur, quæ nunquam habuit menses, quum tamen bis utero tulcrit; & FRAUNDORFERUS mulieris cujusdam XXXV. annum agentis in vita sua nunquam menstruata, quamvis fecundæ, meminit in Ephem. germ. D. III. an. VII & VIII. Obs. 19. pag. 38. & ib. Obs. 41. pag. 65. similis fere exstat casus: bina etiam factæ conceptionis sine ullis mensibus præviis exempla habet LANZONUS in Ephem. germ. D. III. an. I. Obs. 23. pag. 47. seq. Alia multa congestit SCHENKIUS Obs. med. Lib. IV. plura etiam legi possunt apud RIEDLIN. Lin. med. an. 1699. mens. Octobr. 1636. REUSNER Obs. med. pag. 99. apud VEESCH pag. 55. & notabilem adhuc historiam refert FABRIC. HILDAN. Lib. Obs. chir. Cent. V. Obs. 41. pag. 427. femina, quæ septem feliciter peperit liberos, quamvis nunquam fuisset menstruata. Contra viragi-

bus hisce frequentiora toto die non fisti observata.

§. XXI.

In causas hujus menstruorum defectus dum inquiremus, attendendum, num a dispositione connata ortum traxerit malum, an vero morbus quidam imi ventris potissimum obstructorius præcesserit, qui, nisi jam adsit, facile subsequitur, & quibus omnibus pro rerum facie morbique euphoria ex suis indicationibus consulendum. Nonnunquam etiam mariti cohabitatione vel conceptione menstruorum clausi fontes aperiuntur (s). Hic multum potest vitæ genus & clima-

raginum jure sterilium exstant casus apud SIM. SCHULZIUM in Ephem. germ. D. I. an. VI & VII. Obs. 159. pag. 224. feminae cujusdam XXVII. annorum, nunquam menstruata, neque cum virgo esset, neque in matrimonio, quæ veronunquam etiam genuit prolem. Ita & LENTILIUS in Ephem. germ. D. III. an. VII & VIII. App. pag. 139. in muliere mensium defectum una cum perpetua sterilitate observavit; quod & simile videre licet in Miscell. medic. pract. pag. 249. HAESBAERT habet historiam mulieris sterilis, cui neque durante virginitate, neque cum viro nupta esset, menstrua fluxere. Alia multa refert exempla RHODIUS Obs. med. Cent. III. Obs. 47. pag. 144. MAURICEAU Tom. II. Obs. 232. pag. 189. feminae sterilis refert casum nunquam menstruata, hydropem demum extincta. Sc. etiam frequenter feminarum viraginum, quæ ad conceptionem per omne matrimonium ineptæ fuerunt, casus observasse retulit ROEDERERUS.

(s) Conf. PECHLINUS Obs. med. phys. Lib. I. Obs. 35. pag. 33. seq. FRANCISCI PAULLINI Obs. med. phys. Cent. IV. Obs. 35. pag. 452. seq. habet de ancilla rustica XL. annorum, quæ nunquam antea menstruata, mox primo cum marito concu-

climatis differentia. Laborum enim industria sub cœlo præsertim calidiori secretionem reliquas omnes auget, & plethoram ita consumit, ut particularis illa in uterum vel insensibilis vel parca satis sit. Ita enim notum est, feminas rusticas, laborioso vitæ generi assuetas, multum sudantes, vel plane non, vel parum menstruatas esse.

§. XXII.

Verum enim vero, cum ad fœcundam conceptionem ejusque in utero confirmationem menstruorum mediocritatem requiri, doceat experientia; aliæ vicissim dantur fœminæ, quibus menstrua adeo copiosa sunt, ut hæmorrhagiarum nomen potius mereantur (r). Ejusmodi fœminæ, cum variis viscerum officinæ chylicæ vitiis laborent, eademque de causa variis symptomatibus spasticis haud careant, hysteriæ plerumque sint, hypochondriacæ, animi pathematibus facile obnoxie, latenter phthiicæ, steriles simul habendæ sunt. Quum enim hæc menstrua nullum servant periodum, paucis diebus plus minus, quantitate vero semper justo majori redeant (u),
non

bitu menstruata facta est, atque duas dein peperit filias. DE LA MOTTE Lib. I. Cap. IX. Obs. XXIV. pag. 53. fœminæ XVIII. annorum casum refert, ante conceptionem nunquam menstruata, ea vero facta, menses, mox apparuere. HENR. a DEVENTER in oper. chir. Part. I. Cap. XV. pag. 54. refert, fœminam nunquam menstruatam fuisse, nisi fœcundatam; & in Ephem. Acad. Nat. Cur. Cent. VI. Obs. 75. pag. 335. fœmina ceterum optime valuisse dicitur & virgo fuisse menstruata, post matrimonium menstrua cessasse & solum ab ab imprægnatione diisse, cujus signa fuerint.

(r) DE LA MOTTE Lib. I. Cap. VI. Obs. IX. pag. 17. utriusque generis natura excedentes feminas annotavit steriles.

(u) Testantibus hac & similia BARTHOLIN. Lib. cit. Cent III. Hister.

non modo nervorum varias imbecillitates patiuntur, & hinc lente contabescunt, sed & conceptionem factam forsan, & per breve tempus retentam, recurren- te illo fluxu hæmorrhagiæ uteri æmulo, quasi per abortum, inter primum alterumve mensem ut plurimum factum, profundunt, ut hac ratione per complures annos aliquando conceptionis & abortus alterna series sese excipere possit.

§. XXIII.

Similes harum prope modum sunt feminæ, quæ largiori laborant fluore albo (x), maxime uterino a partu difficili oborto. Alius enim est fluor albus uterinus, alius vaginalis: Ille in congestione consistit mucosi humoris, albidi, satis diluti, & nisi a partu difficili inductus, metastasi cuidam in hæc loca originem debet, atque ex ipso utero destillat, conceptionem potissimum impediens, quia una cum hoc stillicidio sperma mox ablutum foras elabitur; Hic nulli ætati parcens (y), penis catarrho analogus, uberius muci ex vaginæ sinibus secretio est, iterum ex metastasi quadam, vel ex contagio venereo ortus, plerumque cum variis circa genitalia symptomatibus, excoriatione aliisque conjunctus: Quod tamen malum, nisi majori in gradu adsit, conceptionem vix vetat (z).

§. XXIV.

Histor. 8. pag. 22. & Cent. II. Histor. 42. pag. 206. seq. RIVER. Obs. med. Cent. IV. Obs. 86. pag. 57. aliisque.

(x) MAURICEAU Tom. I. Lib. I. Cap. I. pag. 58. & ibid. Lib. III. Cap. XXII. pag. 460. *Sterilitatem a fluore albo una cum melancholia uterina feliciter curatam notat MURALTUS in Ephem. germ. D. II. an. I. Obs. III. pag. 274.*

(y) MATHIAS NESTERUS enim in Ephem. germ. D. I. an. VIII. Obs. 25. pag. 46. casum refert puellæ octennæ fluore albo laborantis. Septem & novem annorum puellarum exempla refert MAURICEAU Tom. I. Lib. III. Cap. XXII. pag. 457.

(z) Ita apud MAURICEAU II. Obs. 178. pag. 141. legimus, mu-

§. XXIV.

Horum omnium si nulla in feminam cadit culpa, & nihilominus viro nupta matrimonium transigat infœcundum, in relativam inquirendum est sterilitatem; etenim non alterius saltem conjugis, sed utriusque requiritur fœcunditas (a). Uterque quidem per se spectatus fœcundus esse potest, minus autem in relatione ad se invicem, quo interdum fieri potest, ut mulier ex alio concipiat viro, maritus aliam imprægnat uxorem.

S E C T I O II.

§. XXV.

Quamvis ardua satis & cognitu difficillima res sit, prædicere, num femina sit paritura, nec ne; remotis omnibus contraindicantibus, supra consideratis, omnem in hanc rem figam operam; ut, quoad ex genitalium, uteri potissimum mutationibus, una cum aliis con-

licrem per totam graviditatis suæ periodum fluore albo laborasse. Et ibid. Obs. 195. pag. 156. fere idem. Et Obs. 218. pag. 175. gemellorum partus meminit, matre per omne graviditatis tempus fluore albo laborante. Verum in Ephem. germ. D. II. an. I. Obs. III. pag. 279. refertur casus mulieris, quæ per triennium sterilis vixit ob fluorem album, quo laborabat.

(a) *Id quod videri licet apud DE LA MOTTE Lib. cit. Obs. X. pag. 17. Et alia refertur historia priori similis ibid. pag. 18. Ita Et FORESTUS in oper. Lib. 28. Obs. 57. refert de femina, quæ, cum ex primo viro non concepisset, postea alteri valde fœcundo nupta, neque tunc imprægnata fuit; verum tertio marito cum copularetur, tunc demum concepit.*

conspirantibus, vera graviditatis signa eruere licitum sit, indicem, eo quidem ordine, ut totam mutationum vicissitudinem a conceptione ad finem graviditatis usque juxta tempora hujus seriei ventilem.

§. XXVI.

Antequam vero graviditatis criteria exponam, dicendum paucis erit, quod conceptionis opportunissimum tempus sit. Quo loco notandum, feminas quidem omni tempore, quod secus est ac in brutis, concipere posse: maximam tamen concipiendi dispositionem observari tempore verno, circa finem aprilis & mense majo (b), atque adeo medio hieme partuum numerum maximum (c) esse: quin, si ita volupe est, illud animadvertere non absolum erit, amplexum inter conjuges matutino potius quam vespertino tempore fœcundum esse, digestionem nempe absolutam, atque certiore spermatis efficacia. Imo & hæc fœcunditatis lex tenenda est, rarissime sub ipsius fluxum menstruum concipere, difficillime ante illum instantem, optime autem finito menstruum fluxu imprægnationi aptas feminas esse (d). Quorum omnium ratio facile patet, siquidem priori in casu conceptio una cum menstruis plerumque eliminatur, quod idem facile contingit subsequente mox muliebri purgatione; cum potius menstruis profusis, & quiescente utero, ulterius perfici possit generationis opus. Quibus rite perpensis, intelligi potest, quid sibi velit divina lex, quæ jussit, ut menstruationis tempore cum suis uxoribus mariti per septem dies non cocant (e); nihil nimirum, nisi hominum multiplicationem.

§. XXVII.

(b) Conf. MALOVIN *Mem. de l'acad. Roy. des sciences* a. 1751.

(c) In *Nasocomio Gottingensi*, in quod egene gravida recipiuntur, quotannis hanc observationem annotavit ROEDERERUS.

(d) Conf. MAURICEAU *Tom. I. Lib. I. Cap. I. pag. 61.* DIONIS *Traité general des accouchemens Lib. I. Cap. VIII. pag. 73.*

(e) vid. *Bibl. sacr. Levit. cap. XV. v. 19.*

§. XXVII.

Ipsa autem factæ conceptionis signa varia sunt, neque in omnibus eadem observantur. Probabilis ejusmodi nota a compluribus habetur utriusque sexus sensus quidam peculiaris voluptatis (*f*) sub ipso coitu (*g*) ad extasim nonnunquam accedens, quique in feminis major putatur & (*h*) a copiosiori in hæc loca humorum orgasmo, a genitalibus turgescuntibus, uteri & vicinarum partium rigore derivatur (*i*). Gradu differt hic sensus, quin feminarum quædam animo linqui solent. Quo vero gratior in viro est perceptio, eo majorem seminis fœcundi vim innuit. Verum non est, ut soli huic signo tribuamus fidem; fallere enim potest ob conjugum ignorantiam.

(*f*) *Conf. MAURICEAU Tom. I. Lib. I. Cap. III. pag. 68. DIONIS Traite general des accouch. Lib. I. Cap. VIII. pag. 73. DE LA MOTTE Lib. cit. Cap. XVII. pag. 89.*

(*g*) *Qualis sensatio in sua praxi haud ignota fuit Poëta OVIDIO, qui ita cecinit:*

*Ad metam properate simul, tunc plena voluptas;
Cum pariter victi fœmina virque jacent.*

(*h*) *Num gratiorem titillationem sentiat femina an vir, controversi sunt auctores. Majorem maris quam femine in congressu affirmat HIPPOCRATES de genitur. oper. sect. 3. fol. 12. „multo minus delectatur femina quam vir, sed diutius ipsa perdurat in voluptate: & idem judicat MARCELLUS DONATUS de med. histor. mir. Lib. 4. Cap. 17. pag. 369. alique. Contrarium vero autumant cum GALENO & AVICENNA PAUL. ZACCHIAS in Quæst. med. legal. Lib. 3. Tit. I. quæst. 7. no. 14. seq. WEDELIUS in Disput. de venar. medic. & morbifer. 1684. habit. Cap. 2. pag. 13. & omnes fere recentiores.*

(*i*) *RUYSCHIUS observavit illam turgescuntiam & veram quandam*

rantiam & feminarum quarundam sensationis hebetudinem (k); & contra ob nimiam clitoridis sensibilitatem sine facta conceptione quædam ejusmodi voluptatem sentiunt; quum aliæ vicissim sine istiusmodi grata perceptione concipiunt (l).

§. XXVIII.

Veteres, qui sedem spermatis muliebris in vestibulo ante hymenem posuerunt, quo tamen loco ex sinibus in æstu venereo cum voluptate profunditur humor faltem mucosus, de simultanea utriusque sexus feminis ejaculatione multa jactarunt, ut exinde congressus fieret fœcundus (m); sed hi audiendi vix sunt.

§. XXIX.

dam genitalium internorum inflammationem, in mox post concubitum occisa femina. cf. Ill. DE HALLER Præl. in BOERHAAVE T. V. P. II. p. 113. sq.

(k) *Conf. FELIX PLATERUS Obs. Lib. I. pag. 260. ubi cujusdam meminit, quæ ne quidem a primo matrimonialis concubitus actu ullam jucunditatem sentiebat. Interim de duabus sterilibus, citra ullum voluptatis sensum congressum patientibus, in quibus internum uteri orificium coalitum, & in ejus collo nulla deprehendebantur rugæ exstat in Histor. morbor. Vratislaviens. an. 1702.*

(l) *Conf. MAURICEAU Tom. I. Lib. I. Cap. III. pag. 68. vid. etiam NICOL. VENETTE Tableau de l' amour conjugal ou de la generation de l' homme Tom. II. Part. III. Cap. IV. Art. III. pag. 60.*

(m) *Conf. MAURICEAU Tom. I. Lib. I. Cap. II. pag. 64. & DIONIS Traité general des accouchemens Lib. I. Cap. VIII. pag. 73. Huc pertinet OVIDIANUM Odi concubitus, qui non utrinque resolvunt.*

§. XXIX.

Fallere etiam possunt, quæ veteres hypothese HIPPOCRATIS (*) innitentes de feminis in utero retentione senserunt, ita ut illud non modo quoad omnem massam in uterum delatum, sed & per tempus quoddam asservatum voluerint (n): Omnis enim feminis quantitas ut in uterum deferatur & retineatur non opus est (o), siquidem semper effluit illius quædam pars, sufficitque si pars liquoris MAURICEAU, credendum non esse, effusa quadam feminis portione, fore ut fœtus nasceretur imperfectus, cui vel hoc vel illud deficiat membrum (p): quamvis in eo erret, quod viri siccitatem, quæ feminis in utero moram arguit, (hinc saltem adjungenda conceptioni) pro signo

(*) *Lib. de genitura.* „Postquam autem coivit mulier, si quidem conceptura non est intra seipsum, pro more foras procedet genitura ab utrisque, ubi femina volet. Si vero conceptura est, non procedit foras, sed manet in utero genitura.

(n) *ARISTOTELES in Histor. animad. Libr. VII. Cap. 3. ait:* „si semen in septimum diem intus permanserit, conceptum jam esse, certum est. *RODERICUS a CASTRO de Natur. Mulier. Lib. III. Cap. 14. pag. 150. terminum illum breviorum multo præfinivit, quando ait:* „Cum semen virumque in utero constiterit, neque intra septem post ejaculationem horas fuerit effusum, sed uteri calore conservatum, feminam concepisse credendum est, & tunc gestationem ac fœtus formationem incipere.

(o) *Conf. DIONIS Traité general des accouchemens Lib. I. Cap. VIII. pag. 74. id quod idem apud DE LA MOTTE Traité complet des accouchemens Lib. I. Cap. V. pag. 27. & 29. seq. legitur. Ceterum hypothese auræ seminalis indulgere videtur.*

(p) *vid. EIUSDEM Tom. I. Lib. 1. Cap. II. pag. 65.*

signo nimis probante habeat (*q*); quum tamen fallere hoc indicium possit, quod vaginæ rugæ & corporis situs moram illam mentiri valeant.

§. XXX.

Ceterum phaenomena paucis a conceptionis tempore minutis elapsis, nonnisi a sagacioribus feminis observata sunt. Dolor quidam quasi levioris colicæ circa umbilicum (*r*), abdominis inflatio, spastica tensio & repletio, motus & calor vagans in infimo ventre, quem excipit horror totius fere corporis, artuum tremor, insequente levioris frigoris sensu: Quin languent paulo post feminæ, morosæ fiunt & animo dejecto, propter artuum lassitudinem, quietem, otium & vitam tranquillam amant; in utero motum quendam inflationis quasi per aliquot temporis minuta percipiunt, vel ac si borborygmi in eodem vagarentur; imo studiosiores paulo feminæ ipsum quendam, in inferiori abdominis sede, motum transversum versus unum alterumve latus, ex ovario ad uterum tendentem nonnunquam obscuro modo distinguunt; aliæ vero borborygmis a novo stimulo & spasmo universali ex insueta irritatione & sanguinis influxu inductis, vexantur (*s*). Quæ omnia, uti facile est censendum, tanquam subtiliora, feminarum vulgus vix notat.

§. XXXI.

(*q*) *it.* EIUSDEM Tom. I. Lib. I. Cap. III. pag. 68. qua de re illum inculpat DIONIS Lib. cit. Cap. VIII. pag. 73.

(*r*) De hoc signo conferendi sunt AMBROSIIUS PARAEUS Lib. XXII. Cap. V. VAN HORN *Siphra und Pua im IV. Capit. des ersten Theils* pag. 13. DE LA MOTTE *Traité complet des accouchemens* Lib. I. Cap. XVII. pag. 89. HÜCKEL *diss. de vomitu gravidarum. Francof. ad Viadr. an. 1733. §. 4. 5 6. 5* MAURICEAU Tom. I. Lib. I. Cap. III. pag. 68. illum dolorem ita describit, ut quasi sit un broüillement du bas-ventre.

(*s*) *Conf.* ROEDERERI *Elem. art. obstetric. §. 138. pag. 60.*

§. XXXI.

Manifestiora hæc licet sint, vix tamen nisi ab illis, quæ corpus habent teneſioris fabricæ, mobilioribus nervis, & adeo majori ſenſibilitate præditum, recte obſervantur. Factam porro conceptionem fœcundus amplexus arguit, ſi poſtridie femina moroſa de anxietate quadam inſolita conqueritur, ut ſe morbi cujuſdam prodromis tentari credat, abdomen ſimul ſpaſtice tumet, & tactui duriusculum ſe præbet, quo tempore ſibi maxime cavent; ne forſan valide nimis contra illud impingant (t), nihil enim ponderis ne quidem incumbentiſ ferre tunc poſſunt.

§. XXXII.

Verum quærendum hic loci eſt, num oriſicium uteri clauſum factam conceptionem denotare valeat? ſunt quidem auctorum multi, qui HIPPOCRATIS (u) auctoritate inſiſtentes hanc notam inſallibilem æſtimare conantur. Sed notandum, uteri quidem gravidæ a virgineo vel non gravidæ mutationes (x) non paucas ſatisque notabiles eſſe; interim de HIPPOCRATE præſertim illud tenendum eſt, explorationem illis temporibus nondum moris fuiſſe, neque ipſum illam exercuiſſe; ſed ex ſola hypotheſi natum ſignum eſſe. Putarunt

(t) Conf. ROEDERERI *Elem. art. obſtric.* §. 138. pag. 60.

(u) *Seçt. V. aphor. 51.* ait: „Quæ in utero gerunt, harum os uteri clauſum eſt.“ Prouti nec majorem invenio veritatem *ibid. in aphor. 41.* „Mulierem ſi velis cognoſcere, an prægnans ſit, ubi dormitura eſt, (incanata) aquam muſſam bibendam dato: Et ſi quidem tormen habeat circu ventrem, prægnans eſt: ſi vero minus, prægnans non eſt.

(x) Conferri merentur de hoc argumento, quæ ROEDERERUS in iconibus uteri humani exhibuit.

runt nimirum, uteri os recipere sperma virile, quo cum feminino commisceatur; unde illud semper avidum spermatitis hiansque atque apertum crediderunt; (quin imo, obviam ire membro virili descendendo adhuc recentiorum nonnulli (y) asserunt) post conceptionem vero & sitim veneream quasi extinctam clausum esse orificium defenderunt. Verum clausum æque est orificium ante ac post conceptionem, exceptis ultimis graviditatis hebdomadibus, instante partu. Partium in congressu rigor propter irritationem procul dubio aperit orificium, a conceptione rursus claudendum. Sed in femina etiam virgine non gravida semper clausum dici potest hoc orificium, quare nihil probat. Neque externa orificii apertura clausa est in illis gravidis, quæ ad medium usque graviditatis terminum nonnunquam observantur menstruata; neque in illis quæ partum jam aliquoties ediderunt, exacte clausum est, ita ut circa rimam transversam reflexa labia observentur, quin exploratoris quandoque digitus in ipsum uteri cavum ultimâ periodo penetrare, atque fœtus caput tangere aliquando possit.

§. XXXIII.

Inchoata autem conceptione novus ille stimulus (§. XXX. seq.), seu systematis nervosi mutatio, varia feminis, præsertim tenellis, symptomata parit morbosa, maxime ex abdominalium genere, quibus vehementer nonnullæ laborant; aliæ vero robustiores & validiores minus a nova ista nervorum mutatione afficiuntur, neque prius quidquam patiuntur, quam menstrua desierunt, quin in hysteriis & hypochondriacis, si facta fuit conceptio, silente quasi, quem ante gra-

(y) vid. MAURICEAU Tom. I. Lib. I. Cap. I. pag. 57. & ibid. Cap. II. pag. 64. DIONIS Trait. gen. des accoult. Lib. I. Cap. VIII. pag. 73. DE LA MOTTE Trait. compl. des accouch. Lib. I. Cap. V. pag. 27.

graviditatem expertæ sunt, morbo, priora symptomata plerumque vel minuuntur vel penitus cessant (z). Indicandum hic omnino est, an forsan aliæ horum phænomenorum lateant causæ, atque larvis suis speciem conceptionis mentiantur, quæ tamen ipsæ morbum propriè sistunt, nosque fallunt, siquidem hæc ex morbosis affectionibus desumpta signa nonnisi probabilia sunt. Sane illud non infrequens omnem artis etiam versatissimi poscit attentionem, ut vix hisce similibusque fides tribuenda sit, nisi in illis feminis, quas crebro repetita observatio certiores fecit: imo certiores aliæ nonnullæ evadunt, quibus hoc vel illud signum quamvis paradoxon satis contingit (a). Ita aliæ iteratis observationibus innitentes se gravidas esse colligunt. si assumptum quoddam purgans effectum denegavit; aliæ vicissim, si solito fusius virtutem suam exsequutum est.

§. XXXIV.

(z) *Ejusmodi exemplum VOELLTERN refert neucræffnete Hebammen-Schule, &c. pag. 11. quin miræ Epilepsia hoc modo sanantur, quibus feminae & pro demoniacis habentur. Conf. Ephem. Acad. Nat. Cur. Cent. I. Obs. 23. pag. 80. item Cephalæa chronica. Ephem. Acad. Nat. Cur. Cent. III. Obs. 13, pag. 297.*

(a) *Ita in Ephem. Acad. Nat. Cur. Cent. I. Obs. 45. pag. 114. mentio fit cujusdam feminae, cui hæmorrhagia ex bregmate sinistro singulis vicibus certo graviditatis signo fuit, ubi & plura alia exempla collecta sunt. GEORG. HOYER in Ephem. Acad. Nat. Cur. Cent. V. & VI. Obs. 75. pag. 335. feminae meminit, quæ menses quidem in virginitatis adhuc annis ordinarie, nunquam vero post matrimonium contractum, nisi tempore graviditatis & inchoatæ conceptionis observavit. Similem observationem DEVENTER recenset. In Gazette salulaire. n. 11. 1762. annotatus casus, quo femina quatuor priores menses quolibet undecim gestationum hydrophoba fuit eo gradu, ut vel visum auditumque soni vel murmuris*

§. XXXIV.

Verum quæ vulgo observantur symptomata ante menstruorum cessationem, quorum quædam circa ventriculum, alia partim circa hypochondria, partim circa ipsum uterum nascuntur, alia vero totum corpus afficiunt, solent esse, nausea, vomitus, appetitus prostratus, immodicus, varie irregularis, pica, carniū fastidium, iracundia, mœror, tristitia, ad labores pigritia, virium languor, quin fractura, animi deliquia, somnolentia, affectus melancholici, viri fastidium, oculi retracti, lividi, turbidi, dolentes, palpebris languentibus, a musculis vix sustentis, cum circulo circa easdem livido seu flavescente, dentium dolor, salivæ copiosa excretio, faciei pustulæ; &c. quæ omnia excipit suo tempore menstruorum emanatio, unde oborta plethora oriri solent cephalagia, faciei rubor & inflatio, dentium dolor, vertigo, artuum tremores, ardores volatici circa superiora imprimis; in aliis vero pallores, ephelides, pustulæ item in facie & collo, imprimis autem circa ipsam frontem, imo nasus quasi flava vernice tinctus. Et temporis successu accedere solent alvi segnities, quin ejus obstipatio cum variis tenesimorum incommodis ab incumbente gravius uteri sarcina in ipsum intestinum rectum. Ita & ultimis graviditatis mensibus umbilici elevatio, ut quasi deletus appareat, pedum tumor œdematosus a pressione vasorum iliacorum & circulo humorum impedito, ut & eorum stupor quasi cum singulari lassitudine, unde & ingressus difficilis, crurum pedumque spasmi tempore nocturno potissimum summo interdum dolore juncti (b), inguinum & lumborum dolor, renū etiam, qua-

muris aquosi ferre nequiverit. Sua sponte malum qualibet vice rursus evanuit. De potu vel alimento liquido ne cogitationem quidem fovere poterat.

- (b) Madame BOURGEOISE Part. I. Cap. IV. pag. 64. edit. germ. de se ipsa dicit, se gravidam acerbissimum ex spasmis pedum dolorem sensisse.

quales a nephritide, quin quibus abdomen multum propendet, ponderis quasi circa pubem molesta sensatio; varices non minus in valvularum præcipue sedibus, lividæ maculæ, fugillationum instar circa crura, urinæ reddendæ difficultas cum summo stimulorum incommodo (c), vel ejus incontinentia, pectoris angustia, respirandi molestia (d), ventriculi dolores, intestini recti prolapsus aliaque.

§. XXXV.

Summo jure factæ conceptionis & incipientis graviditatis signum menstruorum cessatio habetur. Quum vero natura non faciat saltum, inde non sequitur: Menses emanare; ergo concepit: quamvis hac ratione sæpius cæteris paribus concludere valeamus, & feminæ terminum, unde calculi initium sit, inde sibi ponant (e). Notandum enim est, menstrua primo mense sæpe non sisti (f), quin in gravidis plethoricis & ætate junioribus cum euphoria fluere possent (g), ita tamen, ut sensum sensimque copiâ decrescant. Imo in dubiis

(c) *Conf. MAURICEAU Tom. I. Lib. I. Cap. XV. pag. 138.*

(d) *Conf. EIUSD. Cap. XVI. pag. 141.*

(e) *Conf. ROEDERERI Diff. de temporum in graviditate & partu estimatione §. III. Gotting. an. 1757.*

(f) *Menstruorum naturalium fons ipse uterus est. Hæc ergo in graviditate locum habere non possunt. Quodsi vero nihilominus primis fluunt mensibus, ex spongiosa nunc cervicis uteri substantia, & speciatim ejus sinibus mucosis, dilatatis oriuntur. Ipse ROEDERERUS sæpius observavit, ex cervicis liquorem rubellum in gravidis profluere; ergo non est, cur denegare conemur cervici, verâ profundere posse menstrua, siquidem ab isto humore saltem gradu differunt.*

(g) *MAURICEAU Tom. II. Obs. 168. pag. 132. & ibid. Obs. 388. pag. 322. ut & Obs. 606. pag. 498. in Ephem. germ. D. I. an. IX. &*

dubiis constat observationibus, fluxum illum in valde plethoricis ad medium graviditatis terminum usque nonnunquam sine ulla noxa protrahi (b), quin ultra (i), & inde sæpius evenit, ut præmaturus aliquando habeatur partus, qui justam noni mensis solaris explevit periodum. In aliis vero ejusmodi serotina menstruatio non caret aliquando gravioribus symptomatibus (k), fœtus periculum subest (l), atque abortus (m) minatur.

§. XXXVI.

X. Obs. 29. pag. 86. exstat casus de ejusmodi stillicidio uteri in gravida tam matri, quam fœtui innoxio.

(b) Conf. MAURICEAU Tom. I. Lib. I. Cap. III. pag. 72. quo loco notat, feminam re vera gravidam ob superstitem menstruationem talem non indicatam, supplicio traditam fuisse. it. DE LA MOTTE Lib. I. Cap. IX. Obs. 26. pag. 56. & ibid. Obs. 24. pag. 53. casum refert gravidæ, nondum antea menstruatæ, elapsis aliquot mensibus, quibus in utero gesserat, menstruatæ factæ.

(i) Conf. MAURICEAU Tom. I. Lib. I. Cap. XX. pag. 155. ubi, se feminam novisse, narrat, quæ ad sextum usque graviditatis mensem suctis periodis menstrua adhuc profudit. & DE LA MOTTE Lib. I. Cap. IX. Obs. 25. pag. 55. femina gravidæ septimo adhuc mense menstruatæ casum refert.

(k) Qualem fluxum in gravida gravissimis cum symptomatibus, virium prostratione, tussi, respirandi difficultate, doloribus dorsi, lumborum, una cum metu abortus notatum legimus in Ephem. germ. D. II. an. I. Obs. 110. pag. 271.

(l) Monente HIPPOCRATE Sect. V. aphor. 60. „si mulieri in utero gerenti purgationes prodeant, fœtum sanum esse impossibile.

(m) de menstruis in gravida & aliis gravissimis symptomatibus cum abortu vid. FABRIC. HILDAN. Lib. Obs. Cent III. Obs. 59. fol. 243.

§. XXXVI.

Porro & illud æstimandum est, utrum ex alio causarum morbosarum fonte menstrua substiterint, ubi semper circumstantias quasdam morales ponderare necesse est. Medici enim & ingenium iudicium vigilet hoc casu, ne femina sumum sibi vendat, vel nullius momenti causas afferat, quibus suppressionem menstruorum attribuere molitur; suspecta fane res est, si forsan ipsa arbitretur, emmenagoga fortiora sibi optime convenire: quum vero arbitrio medici sese relinquat, remediaque ab ipso appetat sine methodi cujusdam præscriptione, de vera menstruorum suppressione potius suspicari medicus potest, attendendo simul, an in illis symptomata nervosa, hysterica, abdominalia versus finem imprimis cujuslibet periodi augeantur vel, minuantur; Priori enim casu plerumque status morbosus subest, usque dum, nisi menstrua recurrant, per crises speciem solvatur morbus metastasi quadam vel in chronicum, vel in acutum morbum: posteriori yero, cum illis menstruorum defectus contigerit absque apparente quadam causa, neque ulla superveniente crisi, sed remissioribus omnibus, quæ paulo ante adfuerant symptomatibus, imo evanescentibus tandem, consentiente jam divino sene (n), major gestationis suspicio est.

§. XXXVII.

Medicus vero dubius forsan, & feminarum placitis indulgens, sedulo attendat, ne ex altera parte embryonem, latentem forsan, lædat, ex altera vero parte, ne morbum negligat. In præscribendis medicamentis mitissima eligat, ex evacuantium genere leniora
sal-

(n) Conf. HIPPOCRATES Sect. V. aphor. 61. „si mulieri purgationes non prodeant, neque horrore, neque febre superveniente; cibi autem fastidia ipsi accidant, hanc in utero gerere putato.

saltem, & ejusmodi in universum remedia, quibus aliquamdiu sine alia noxa usis, vel menstrua revocentur, vel veram mali causam dijudicandi spatium sibi acquirat.

§. XXXVIII.

Mirum porro uteri & mammarum commercium est. Quamprimum enim menstrua cessarunt, mammarum mox futuræ foetus nutritionis apparatus præmoliuntur. Notabile scilicet capiunt incrementum, dum simul elevantur, & earundem venæ cœruleo colore conspicuæ magis efferuntur. Papilla turgens, adspectu quasi inflata crassescit, colore naturali (ex albido rubello) obscuriori distincta, & discus papillam ambiens in latiore expansus peripheriam, simili colore notatur, parvis eminentiis, quasi totidem papillulis, quarum numerus plerumque ad XV-XVII. accedit (o), tegitur.

§. XXXIX.

Dolent tunc temporis mammarum, & papillarum fissuræ cum acerbissimis doloribus subinde contingunt: plerumque vero omnibus gravidis, termino quodam incerto, ut plurimum circa medium graviditatis tempus, quin serius, humor quidem tenuis mammarum exprimi potest; ubi notandum, primiparas hujus liquoris parciolem fundere quantitatem, in feminis vero jam aliquoties partum expertis lympham copiosiore profluere. Lympha ista siriis lacteis, quasi totidem vermiculis distincta, ultimis præcipue mensibus uberiori copia lecernitur, aucta adeo versus finem gestationis, ut vel sponte nonnullis effluat. Verum enim lac neque in virgine, neque in femina nupta hoc tempore observatur, sed demum absoluto partu, superveniente sic dicta febre lactea, quæ critico modo lac in mammas deponit, nisi forsan in illis lactis vestigia superesse deprehendas, quæ

(o) *Conf. MAURICEAU Tom. I. Lib. I. Cap. III, pag. 69.*

quæ sub ipso lactationis stadio denuo concepere (p). Non omnium tamen dubio hoc signum caret. Siquidem rara licet, virginum etiam lactantium exempla leguntur (q); & per complures sæpe annos nutricum, quæ infantem dudum ablactarunt, mammae liquore quodam turbido, lacteo profluunt, menstruum maxime tempore.

§. XL.

Nonne igitur, quæ ab uteri incremento & orificii interni mutatione deprimuntur notæ, graviditatis certissima signa sunt? Negari quidem nequit, explorationem omnium tutissimam investigandi veritatem esse viam, qua nempe uteri alterationes optime percipiuntur. Quum majus sensim spatium uterus post conceptionem occupat; simulque primis tribus circiter mensibus in pelvim descendit, ut hac ratione abdomen complanetur (r), uteri autem cervix in vaginam paululum detrudatur, commodius paulo exploratoris tactui se offert. Nempe ante imprægnationem integer digitus orificii altitudinem explorat; secundo autem tertiove a conceptione mense, duæ saltem digiti phalanges in vaginam demissæ optime illud attingere valent. Verum non omnibus eadem est cervicis naturalis distantia, altiori aliis orificio, aliis profundiori. Quare constans signum haberi nequit, nisi orificii naturalis altitudo jam antea cognita fuerit: quin & fallere potest omnis habitus corporis præternaturalis, vagina brevior, ejusque prolapsus, orificium uteri secum trahens; hydrops, ute-

(p) *Haec mammæ signa frequenter ipse, in Nosocomio, quod Gottingæ floret, observavi.*

(q) *Conf. NICOL. VENETTE Tableau de l' amour conjugal Tom. I. Part. II. Cap. I. art. III. pag. 100.*

(r) *Gallis inde dicere moris est: qu'en ventre plat enfant y a. vid. MAURICEAU Tom. I. Lib. I. Cap. III. pag. 69. BOESSEL Gründlegung zu der Hebammenkunst pag. 181.*

uterum deorsum premens, tympania, seu aëris in intestinis morbosa resolutio, qua uterus inferiora petere cogitur; uteri denique prolapsus cachexia, laborantium, propter fibrarum laxitatem omnium frequentissimus affectus & alia.

§. XLI.

Elapsis his, embryonis incrementum sequitur uteri, nunc extra pelvim hærentis, expansio, hanc vero parili ratione abdominis intumescencia. Superiora versus nimirum post tertium mensem uterus recedit, & pelvim ascendendo deferens, abdomen inflat, illudque in dies notabilius expandit. Verum, quum morbis nonnullis abdominalibus, graviditatem mentientibus, sæpius eadem fere abdominis expansio aliaque competant gravidarum symptomata, ut hoc nomine peritissimi etiam nonnunquam decipiantur, pro arguenda graviditate circumspicienda alia sunt, quibus hoc abdominis incrementum discernitur. Tumor enim continuatus esse debet, pedetentim magis magisque increscens, adeoque constans, nunquam vagus vel remittens; æquabiliter assurgens, & versus cordis scorbiculum sensum ascendens: quæ omnia ut optime constent, visus unusquisque testis esse nequit, sed tactus simul confirmet oportet, ut externa & hic loci de internis testentur. Ipsam hujus actus rite instituendi rationem huc transcribere non absolum putavi. *Femina jeiuna, differit ROEDERERUS: urinam & alvum deponat, supina cubet, lumbis depressis, capite pedibusque elevatis, calcibus ad nates retractis, ita ut abdominis regio laxetur. Tunc medicus abdomini palmam imponat transversam, auricularem digitum versus os pubis tendat, pollicem ex adversum ad umbilicum. Valida respiratione femina abdomen concutiat, atque medicus sub ipso expirationis nisu idem leniter imprimat. Quodsi eo momento duram, globosam, atque super osse pubis hærentem resistantiam tangit, de utero tumido certus esse potest. Sicubi vero alius tumor abdomen elevat, alio loco is deprehenditur, vel & totam abdominis regionem equalis atque*

perpetuus quidam tumor occupat (s). Quæ exploratio in macilenta femina bene succedit (t).

§. XLII.

Restat ex optimis notis foetus in utero materno motus, veræ graviditatis testis omni major, quique prioribus adnumeratus, ultimum quasi pondus addit. Incertum quidem tempus est, quo primum mater foetus sui existentiam atque vitam percipit. Primis enim mensibus foetus multo amnii liquore innatat, quo etiam tempore, eum non nisi mollioribus adhuc membris instructus sit, vel nullum, saltem non adeo perceptibilem edit motum, sensim vero robustior, pariori liquoris copia comprehensus, artubus suis ad domicilii sui parietes impingit, matri molestus fit, quin imo, vehementioribus tandem motibus dolore inimicus. Plerumque vero primam sui agitationem in matrici medio graviditatis termino communicat, unde etiam computare matres consueverunt, quot adhuc pariendi temporis illis

(s) *vid. in Element. art. obstetric. §. 150. pag. 66.*

(t) *Conf. Ephem. Acad. Nat. Cur. Cent. III. Obs. 74. & WEITBRECHT Comment. nou. Acad. Petrop. Tom. I. pag. 340. describit hydropem ovarii, & quomodo tumor inde natus a graviditate distingui possit. Nempe tumor uteri gravidi ascendit ab ipso osse pubis versus umbilicum; sed in cadavere feminae, quæ hydropem ovarii laboravit, tumoris centrum umbilicus erat, & tumor medius solitarius tanquam fessa quadam cinctus, ita ut in hypogastrio & super pubem baserit. Casus etiam mentionem fecit ROEDERERUS sibi visi, quo tumor quidem mox super pube, sed motus fuit ex uno latere in alterum sua sponte & plura symptomata morbosa juncta. cf. Progr. de hydropem ovarii.*

illis restet (*u*); sed male quidem, quippe ocyus aliæ, aliæ ferius primum embryonis motum sentiunt (*x*), quæ temporum discrepantia erroribus matrum & neglectæ feminarum otiosarum attentioni tribuenda procul dubio videtur. Medius enim terminus inter decimam nonam vigesimamque secundam hebdomadem, repetendo calculum a partu ad primam motus perceptionem, cadit (*y*), atque si justo citius nonnullæ motum istum sentire, inde forsan factum est, ut quamlibet abdominis agitationem, sæpe alienam satis motui foetus, istum esse putaverint.

§. XLIII.

Ergo ante tertium mensem certum graviditatis signum tradi temere nequit; quæ enim de uteri descensu, ventris complanatione, menstruis suppressis, mammarum tumore aliisque dicta sunt, omnia decipere medicum possunt, nec nisi probabilia haberi debent, quippe graviditatem æmulantium morborum communia symptomata sunt. A tertio ad omnes subsequentes usque menses exploratio fide certiora docet, atque non sine ratione instituitur. Quodsi enim tunc, omnibus successive relatis phænomenis, mensium, mammarum, abdominis, motus embrionis, respectu, uteri status accomodatus & conveniens accedit, successiva, quod præcipuum est, symptomatum morbosorum, si quædam adfuerunt, remissione, vehemens omnino gestationis suspicio est.

§. XLIV.

(*u*) *Conf. ROEDERERI diss. de temporum in graviditate & partu æstimatione §. III. & §. XV.*

(*x*) *vid. EJUSD. laudatæ dissert. Tabula pagina 34. sqq.*

(*y*) *Testantur hoc quam plurimi ex dissert. paulo ante citata, observationum nosocomii nostri tabularum numeri, quin quantum ego illis interfui, id fere semper hac ratione repertum fuit.*

§. XLIV.

Quinto demum, & post quintum mensem, signa cervicis & mutati orificii uterini optime petuntur. Uterus superior paulo quam est pelvis superior apertura, fere in axi ejus locatur, & antequam venter subsideat, orificium digito assequi vix licet. Uteri autem orificium tunc tangitur mollius, crassius, quod antea durum erat & quasi cartilagineum, una cum cervicis tumore. Sub initium vero septimi mensis eoque medio optimum signum innotescit, caput infantis mobile digito exploratoris ita offertur, ut impulsui illud facile cedat, moxque relabatur, quod phænomenon ascensus descensusque alternas vicissitudines servans, lusus instar aliquoties iteratum satis jucundum est, aliquot vero ante partum hebdomatibus capitis delapsi notabilius pondus est, pone pelvis aperturam superiorem figitur, illam explet, neque amplius tanta mobilitate gaudet, abdomen subsidet, & appropinquantis partus signa pedissequa instant.

§. XLV.

Ex omnibus colligitur abdominis tumorem omni gestationis tempore non esse eundem. Quo itaque de statu graviditatis medicus recte judicet, ad sequentia momenta attendat, necesse est. Sexto mense uterus inter os pubis & umbilicum ascendit, septimo ad ipsum umbilicum; octavo mediam inter umbilicum & scrobiculum cordis regionem occupat, usque dum nono demum mense ad ipsum hunc scrobiculum contingat (*). Quoties vero venter propendet (z), eadem ex ejusdem altitudine, nisi simul ad decessum respiciat, æstinatio non valet.

SECTIO III.

(*) cf. DENYS l. c. C. III. p. 63.

(z) de quo argumto conf. MAURICEAU passim.

S E C T I O III.

§. XLVI.

Morbi, qui graviditatis aliquam speciem æmulantur, suisque symptomatibus Medicos æque decipere possunt, ac matres frequenter spe destituunt, sunt menstruorum præternaturalis suppressio, a vitio maxime genitalium locali, uteri, vel vaginæ; Hydrops, & tympanites, tam abdominis, quam ipsius uteri.

§. XLVII.

Quoties uterus imperforatus est, validior membranula vaginam præcludit, vel tumore quodam præternaturali illa laborat (a) seu alio, quocunque, menstrua retinente, malo afficiuntur genitalia (b), quibus fit, ut illorum utriusque generis intercipiatur via, & menstruorum rivuli siccentur; toties fere, menstrui sanguinis itinere præpedito, phænomena oboriuntur, gravidarum symptomatibus haud multum aberrantia. His omnibus menstruorum periodis major sanguinis portio congeritur, uterum gravans, eumque distendens, quibus integumenta mox in mali consortium trahuntur, abdomen expanditur, inflatur cum notabili duritie. Præter affectiones ex hystericarum genere, spasmos aliaque, digestio depravatur, unde tot viscerum chyli officinæ vitia, appetitus irregularis, deficiens ut plurimum cum nauseis, vomendi conatibus, quin ipsis ex ordine vomitibus oriuntur. Temporis successu mammæ intumescunt, imo pressæ ipsum humorem nonnunquam (ejusdem fere, qualis gravidarum est indolis) fundunt (c): Nec aliæ interdum defunt

(a) *Conf. §. dissert. V. pag. XVIII. seq. cum notis (t. x. y.)*

(b) *it. §. X. pag. XXXII. not (c) &c.*

(c) *Quam sententiam annuit HIPPOCRATES Sect. V. aphor. 39.*

„si mulier, quæ nec prægnans est, nec peperit, lac habeat,

sunt veræ gestationis notæ, ut ipsum motum embryonis sensisse quædam sibi persuadeant, atque adeo summa graviditatis suspicio sit: quin maior adhuc. quibus ipsa partus molimina, dolores quasi ad partum accedunt (d). Verum præter moralia momenta, quibus vel spei vel suspicionis multum profligatur, ventris inspectio, & studiosa uteri exploratio (non neglectis circa uteri incrementum cautelis §. LXI. traditis) omnem facile litem finiet.

§. XLVII.

Ipsa etiam morbosa, (e) vel ob ætatem provecctam naturalis men-

„ei menstrua defecerunt. Conf. etiam DIONIS Traite general des accouch. Lib. II. Cap. I. p. 123. MAURICEAU Tom. I. Lib. I. Cap. VI. pag. 92.

(d) *Ipsas has notas non infrequentes esse, plures testantur observationes apud DE LA MOTTE Traité complet des accouchem. Lib. I. Cap. VIII. DIONIS Traité general accouch. Lib. II. Cap. I. pag. 127. MAURICEAU Tom. II. Obs. 275. pag. 227.*

(e) *ejus rei memorabilis historia exstat in Com. Litt. Nor. an. 1734. hebdom. I. pag. 2. femine ejusdam XXIV. annorum. Hæc post primum puerperium mensum fluxu laborat inordinato, mox penitus sufflaminato; interim bona methodo ita tractatur, ut duæ menstruorum periodi iusto statoque tempore recurrant; sed postea denuo supprimuntur, venter & mammae intumescunt, sanitas optima (quod mirum) superstes est. Hinc omnes graviditatem subesse putant, tantoque magis, quum medio gestationis tempore motum sibi percipere visa, imo a vetulis ministris persuasa est, quod ipsum situm foetus vel manibus palpare manifeste liceat. Sed euentus alia plane docuit; plura enim accedunt incom-*

menstruorum suppressio (§. XIX.) paria fere producere valet (f). Ejusmodi vero utriusque generis feminae ex corporis dispositione & habitu, ætate, supervenientibus hæmorrhagiis, abdominis duritie, ejusque inflationis singulari ratione, orificii uterini attenta exploratione, - citra omnem signorum aliorum persuasionem, haud difficile dijudicantur.

§. XLVIII.

Hydrops & tympania analogi propemodum morbi sunt, eorumque symptomatibus, mutatis mutandis fere eadem specie, nisi totum graviditatis schema notum sit, facile decipientes (g), ut certissime tantæ signorum similitudini confidentes, fallantur, qui ho-

incommoda, artuum gravitates, præcordiorum anxietates, & hæmorrhagia tandem uteri cum virium prostratione: adhibitis debitis medicamentis paululum omnia remisere, nisi quod quovis mense fluxus uterinus eadem copia redierit: tandem elapso decem mensium spatio cum moru sensim evanescente, evanuerunt omnia, & ipsa quamvis mole latentis omnium esset suspicio, certissime nihil quicquam, quod carnosum aut membranaceum concrementum referret, cum sanguinis per uterum concussionibus excreta est, sed adhibitis dein convenientibus remediis postea bene valet. Conf. it. MAURICEAU Tom. II. Obs. 255. p. 212. Obs. 579. pag. 487. & Obs. 675. pag. 559. quibus similes fere referuntur casus.

(f) Observationes legi possunt apud DE LA MOTTE Lib. I. Cap. VIII. Obs. XIX. XX. & XXII. pag. 48. seq. & Obs. XXI. ibid. quo casu ipse, cum femina motum satis validum vel manibus percepit, dolores simul, illorum ad partum non dissimiles observavit. vid. etiam, MAURICEAU Tom. II. Obs. 369. pag. 306. & Obs. 566. pag. 468.

(g) Conf. §. Dissert. IX. cum not. (d).

rum etiam morborum signa pathognomonica neglexerunt (b), quorum tamen cognitione firma rite imbuti sint, qui chirurgiam colunt, necesse est, ne forsan revera gravidam putent hydropicam, & hoc nomine ignominiae maculam sibi inurant, (i) tantoque magis, quum hydropicae ipse non desint interdum, quamvis rarius, quae in utero concipiant (k).

§. XLIX.

In hydrope universali, anasarca, ubi sub cellulosa tela per omnem corporis superficiem efusa est aqua, facile discrimen petitur. Expansi totius abdominis tumor aequalis est, mollis, umbilico retracto, quasi in scyphi conici formam mutato, & digitorum pressio foveas relinquit subsidentes. Quas corripit hic morbus, iis plerumque pedes primi tument, femora dein, tandem abdomen. In gravidis vero hic ordo perversus observatur; graviditatem enim

- (b) *Casum refert MAURICEAU Tom. I. Lib. I. Cap. VI. pag. 95.*
- (i) *in Commer. Litt. Nor. an. 1731. specim. XV. pag. 117. imperiti cujusdam chirurgi mentio fit. qui matrem trigeminis gravidam pro hydropica habuit, quique, ut culiello abdomen aperiretur, quo ferum hydropicum emanaret, puniendum dedit consilium. it. Ephem. Acad. Nat. Cur. Cent. V. Obs. 67. pag. 114.*
- (k) *referente MAURICEAU T. I. Lib. I. Cap. III. pag. 73. cujus historiam ulterius prosequitur Tom. II. Obs. 70. pag. 59. quatuor scilicet durante ipso morbo peperit liberos. Analogum casum feminae cujusdam hydropica trium infantum matris legimus ibid. Obs. 249. pag. 204. conf. etiam PHIL. PEU Pratique des accouchemens Cap. XI. pag. 119. seq. Ephem. Acad. Nat. Cur. Cent. I. Obs. 44. pag. 112. Medical Essays Tom. VI. pag. 137. VANDERMONDE Recueil. febr. 1756 IOH. PHIL. BERKELMAN de hydrope ascite in gravida cum febre quartana conjuncto. Giessae 1753.*

pedum tumor post jam tumidum abdomen prodit. Hydropicis urina rubella est, eoque magis, quo majus incrementum ipse morbus capit, (phænomenon facile explicatu) gravidis vero citrina. Hydrope laborantem feminam præ grávida vehementior sitis vexat. Hydrops nunquam symptomatibus morbosus caret, eaque simul sumpta pro morbi incremento quotidie fere exasperantur, (mammarum simul decrescunt, flaccescunt, neque lympham, neque strías lacteas fundunt) si contra quædam adfuerint facta conceptione, illa sub gestatione, nisi penitus dispareant, saltem imminuuntur; uteri enim gestatio summum sæpe revellens est. Ascitidem melius vix dignoscimus, quam si ad latera applicatis manibus, concutiendo una, liquoris incarcerati fluctuatio percipitur; Aegrae de molesto in regione ossium pubis pondere conqueruntur, ipsa moles, in quodcunque femina incumbit latus, eo dirigitur. Quodsi vero quoddam saltem viscus hoc morbo laborat, ut peculiari cystidi aqua inclusa sit, neque fovea imprimi potest, neque fluctuatio percipitur, pedesque vix fiunt tumidi, hinc unicum explorationis artificium (§. LXI.) hanc speciem distinguat. In tympanitide abdomen æqualiter tensum est cum duritie, pressum dolet, elasticum foveam non admittit, quin protinus exsurgat; contrectatum potius sonum edit, conjuncta sunt multa variaque symptomata. Quoties demum hydrops, vel abdominis tympanites cum graviditate uniuntur, toties uteri exploratio graviditatem dignoscat.

§. L.

Conceptus spurii aquam (l) vel flatum (m) in utero nunc
Fff 3 majori

(l) *Casum vid. in Commerc. Litt. Nor. an. 1734. hebdom. IX. pag. 68. it. DE LA MOTTE Trait. compl. des accouch. Obs. XVI. pag. 42. & alibi passim.*

(m) *Conf. Ephem. germ. D. I. an. VI. & VII. Obs. 45. pag. 79. DE LA MOTTE Lib. cit. Obs. XVIII. pag. 45. & alibi passim, varias*

majori nunc minori copia comprehendunt, æque ac molæ cognitu difficillimi sunt, nunc simul & femel cum strepitu & fragore (n)¹, nunc sensim & per intervalla prorumpunt, quin insensibiliter nunquam eliminantur (o), atque illo feminae beneficio fruuntur, quod tempestive ut plurimum & citius, quam est terminus pro fœtu, excernantur: raro ipsis membranis ovi instar inclusi sunt (p), quo casu verum partum mentiuntur, vesica enim dolorum vi compressa, vel integra exteriora versus protruditur, vel disrupta aquas fundit, sed edendi fœtus vana spes est.

varias conceptuum spuriorum species collectas vid. in Ephem. germ. D. I. an. I. Obs. I. pag. 11.

(n) *Conf. MAURICEAU Tom. II. Obs. 110. pag. 90.*

(o) *vid. Ephem. Germ. D. II. an. II. Obs. 138. pag. 306. Passa est vomitum, nauseam, horrorem. Venter intumescibat. motus aderat satis fortis. Sed accedit tempus pariendi cum cephalalgia, cardialgia, extensione abdominis dolorifica, angustia pectoris & metu suffocationis, & applicatis internis externisque omnia evanescunt, spesque pariendi cum prole aufugit.*

(p) *de quo DE LA MOTTE Lib. cit. Cap. VII. Obs. XVII. pag. 44.*

DISSERTATIO MEDICA INAUGURALIS
DE
SIGNIS FOETUS VIVI
ET MORTUI

QUAM
SUB PRAESIDIO DIVINO
POTENTISSIMO PRINCIPE AC DOMINO
DOMINO
GEORGIO II.

MAGNAE BRITANNIAE FRANCIAE ET HIBERNIAE REGE
ELECTORE AC DUCE

BRUNSVICENSIIUM AC LUNEBURGENSIIUM ETC. ETC.

CONSENTIENTE GRATIOSO ORDINE MEDICO
PRO SUMMIS IN ARTE MEDICA HONORIBUS
ET PRIVILEGIIS RITE OBTINENDIS


D. XVII. MART. MDCCCLVI.

PUBLICO ERUDITORUM EXAMINI SUBIICIT
WILHELMUS LUDOVICUS CHÜDEN
LUNEBURGENSIS.

PRAENOBILISSIMO ET DOCTISSIMO
V I R O
WILHELMO LUDOVIC. CHUDEN

S. P. D.
I. G. R.

Non equidem laudatum TE venio, VIR PRAENOBILISSIME! id enim propriae TUAE virtutes officii mihi surripiunt: sed TIBI istisque agrorum gratulatum, qui TIBI se committent. Omnibus enim, quæ clinicum medicum ornant, TE instructum video subsidiis atque virtutibus. Inter nos studiis innutriti diligentiam TUAM & in litteris assiduitatem nunquam non miratus sum; solidam in examine cognitionem prodidisti ore; & nunc quam sis cautus, quamque tamen strenuus in opere, dissertatione edoces. Age, VIR SUAVISSIME! ista studia, istos labores negligere noli. Aegros sane deludunt, qui dubia trepidatione & anxia expectatione eosdem sanari putant. Tyrannis autem, medicos etsi fortes se dicant streuosque, atque furiosis propemodum assimilabis, qui Magnorum in arte Virorum, tirones & inexperti, audacia quidem sed magni facienda gesta, temerario nec satis culpando ausu, imitaturi, sine discrimine, sine iudicio, in agrorum corpora seviunt, ligna foco vel addentes, vel machinam turbantes destruentesque, vel succorum fontes exsicchantes; immemores, sibi cum Magnorum Virorum armis non insimul brachia esse commodata. Istos TE scopulos vitaturum animadverto. Ita & agere & mihi favere perge. Göttingæ d. VIII. Mart. MDCCLVI.



§. I.

Vix in universa naturæ cognitione observationis, experimentorum & ratiociniorum subsidiis magis distituimur, quam in mirando generationis opere. Neque sane illi laudandi sunt, qui adeo de sua cognitione in isto argumento gloriantur. Honorificentius multo ignorantiam nostram & obscura lumina fateremur. Neque est, quod recentiores adeo subsidiis suis mathematicis, physicis, chemicis, anatomicis, microscopicisque superbiant, lupumque auribus se tenere sibi aliisque persuadeant, cum phantasia comite, & præjudicio duce in naturæ arcana oculis manibusque penetrare satagunt, ne quidem in confiniis versantes.

§. II.

Non tamen penitus inutilis vel superflua est opera, quam in isto argumento indagando ponimus. Ipsæ illæ difficultates, ipsi hiatus atque defectus eo magis ardorem nostrum & diligentiam incitare debent. Sunt etiam inter ista momenta adeo necessaria cognitu, ut ab eorundem proleteria cognitione ipsa hominum salus & integritas patiantur. Veluti quidem omnes, quæ partum circumstant, varietates huc spectant, ita vel maxime illa cognitio, vivatne fœtus nascendus, sitne defunctus? Ista enim intelligentia cautos non reddit, ne unquam, nisi quidem ultimum discrimen nos urgeat, imbelli embryoni violentas manus injiciamus: & animum tamen addit manusque istis vinculis solvit, ut intrepidi inutili pondere, quolibet etiam artificio, comprehensionis & dissectionis, matrem liberemus.

§. III.

Equidem ignarus non sum ipsius foetus in partu parciore, si quidem ulla, esse munera. Cum enim graviditatis periodus absoluta est, inferiorisque uteri segmenti extenuati sensum & diducti obstacula fracta sunt, opposito fundo robur accedit. Uteri etiam fibræ olim crispæ, nunc in rectitudinem expansæ, & ulterioris extensionis impatientes ingrato sensu nervos efficiunt. Ita dormientes quasi uteri fibræ motrices excitantur, excitatæ constringuntur constrictæ contentam in uteri cavo molem versus levissime vincendum obstaculum, segmentum videlicet inferius, propellunt. Hæc ipsa moles depressa comprimit ulterius & diducit uteri inferiora, inter hians os uteri insinuatur, omnique tandem orificii ambitu divulgato atque dimoto in uteri vaginam delabitur, delapsamque uteri fundus ex proprio elateris nisu insequitur & impellens totam excutit.

§. IV.

Ista quidem omnia solis uteri viribus absolvuntur, siue contentæ moli aliquid auxilii tribuas, siue minus. Tanquam grave quoddam pondus propellitur massa, propullaque ex solius massæ ratione inferius uteri segmentum mutat, visque istius, quæ ipsi ab uteri fundo communicatur. Commodissime itaque atque præter omnem insolitam difficultatem perfici partus potest, siue contenta moles, id est embryo cum sua secunda, vivat, siue minus. Ne quis venerabilem experientiam objiciat & antiquitatem. Si vera sunt ratiocinia refragari observatio nequit. Sæpius profecto partus observavi, quoad reliqua partus ratio permisit, facillimos, foetus licet mortuus, quin dudum iam, fuerit.

§. V.

Venerabilis autem antiquitas cum Magnò suo duce Hippocrate, cujus laus cum ipsa salutis arte morietur, inani sæpius metu trepi-

trepidavit, frequenti illo errore decepta, quo effectus causasque permiscemus & commutamus. Observarunt enim utique matrem, sine huius illiusve partus solutione, nisi violenta manu foetus trahatur, languere. Istiusmodi in casibus post plures tandem labores defuncti pueri vel excutiuntur, vel laniata cadavera exfoliuntur. En dixere quam difficile est parere mortuum (a), quam violenter tractandum est cadaver! Minime cogitarunt longam ex difficili aliunde partu moram foetum interfecisse, manusque ut plurimum violentas ferroque munitas farroque inunitas vitam foetui cum ergastulo abstulisse. Potuissent toties, si ad violentiam lentiores fuissent, si foetum in pedes componere didicisset foetum servare. Brevis autem ars fuit. Horruit mater, diu iam protractus est partus, sine succussu varia medicamenta exhibita sunt, elapsa manus, (b) mortuus pronuntiabatur embryo, ad instrumenta properabatur (c), instrumenta autem foetum vivum necantia.

Ita,

- (a) HIPPOCRATES L. I. de Morb. mulier n. 50. „Est autem
 „& hæc magna causa, ut non facile exeat puer, si mortuus
 „aut syderatus aut duplicatus fuerit. n. 109. & 122 & 128.,
 „medicamenta commendat ad eiiciendum foetum mortuum,
 „cujus ergo partum soli naturæ committere non audet.
- (b) Confer. HIPPOCR. liber de exsectione foetus, n. 2. „Manus
 „foetus (loquitur præcipue de oblique prolapsis) prominens
 „mortui foetus signum est.
- (c) Conferri hic quam maxime meretur HIPPOCRATES, vel
 quisquis est autor antiquioris libelli, vulgo inter Hippo-
 craticos relati, de superfætatione n. 4 & 5.) æque enim
 veterum mentem nobis explicat). „Si porro foetus intus ma-
 „neat mortuus & non possit neque sponte, neque per medi-
 „camenta juxta naturam excidere, manu cerato maxime
 „lubrificante uncta, deinde in uterum intrusa, humeros a
 „collo magni digiti conamine deducito. Oportet autem ad
 „huiusmodi etiam unguem instrumentum in magno digito
 „habere, & distractione facta manus educere, deinde rur-

Ita, puto, defunctus embryo extractus est. Alias vitam foetus sperantes violenter matrem agitarunt (d) & concusserunt, donec viribus

„sus immissa manu, ventrem diffindere, & ex diffisso intestina sensum eximere: deinde his exemptis latera confringere, quo confidens corpusculum levius ac expeditius fiat, & facilius exeat, non tumidum existens.

(d) Confer. HIPPOCRATES L. I. de morb. mulier n. 93. 94. 95. 96. „Quicumque abortus facti discedere non possunt, dum „aut toti, aut partes foetuum sunt majores, aut minores, „& obliqui ac impotentes, tales si quidem secundum naturam sit fuerint, phatmaco aliquo dato ex his quae ego referam expellito, ubi multa calida praelaveris. Et si prodire volentes non facile exeunt, quum siti sint secundum naturam, talibus sternutatorium admoveo. Apprehendito „autem nasum & os comprimito, ac sic sternutet, quo sternutatio quam maxime efficax sit. Utatur item concussionibus. Sic autem concussionem facito. Lectum altum robustum ac instratum sumito, & mulierem supinam reclinato; pectus vero & axillas, ac manus fascia, aut molli lato loro ad lectum alligato ac cingito, & crura incurvato, & malleolis apprehensam detineto. Quum autem sic disposueris, sarmentorum mollium fascem, aut aliquid huic simile parato. tantum quantus sufficit, ut lectum non negligat excipiendo ipsum, dum in terram projicitur, quo non pedibus iuxta caput terram contingat. Postea „vero ipsam manibus lectum apprehendere iubeto, & lectum „ad caput sublimem habere, ut declinis sit in pedes animadversione habita. ne pronus sit homo ipsa. Ubi vero haec „facta fuerint, & lectus sublimis fuerit, retro sarmenta supponite maxime autem dirigito, quo pedes terram non contingant, dum lectus projicitur & ut sint intra sarmenta. Elevent „autem

bus fractis, doloribusque cessantibus interea temporis embryo perierit, atque ad instrumenta deveniendum fuerit. Quis non videt, facilem

„antem duo viri ex utroque pede hinc atque illinc, quo in di-
 „rectum lectus cadat plane, ac equaliter, & convulsio ne
 „fiat. Concutiendum est autem maxime una cum partus
 „dolore. Et si quidem discedant statim quiescendum; sin-
 „minus, interstitio facto rursus concutito, & in lecto ge-
 „statam atollito, ac agitato. Atque hæc quidem sic facien-
 „da sunt, ubi recte & secundam naturam discedant. O-
 „portet autem cerato liquido prius illinere, quod in omni-
 „bus huiusmodi circa uterum affectionibus optimum est, &
 „malvæ aquam affundere & fenigrævi, aut potius ptisanæ
 „triticeæ succum. Oportet autem usque ad inguina, sedem
 „& pudendum fovere & insidere, ubi partus dolores maxi-
 „me infestarint, & nihil aliud mente versare, eam vero,
 „quæ medicatur, oscula mollibus aperire oportet, & leuiter
 „hoc facere. Umbilicum vero una cum fœtu attrahere.
 „Quicumque vero duplicati complicantur, & in osculo ute-
 „rorum incumbunt, eos, sive vivi fuerint, sive mortui,
 „rursus retro protrusos vertere oportet, quo secundum na-
 „turam in caput exeant. Quum autem retrudere voles,
 „aut vertere, supina ipsæ reclinatæ molle quiddam sub co-
 „xas substernere oportet, & sub lecti pedes, quo alciores
 „sint bi a pedibus, semper aliquid supponere. Sed & coxæ
 „alteriores capite sint, & ut nullum cervical sub capite sit,
 „provideto. Quum vero retrursus fuerit fœtus, & hinc
 „atque illinc obvolvitur, ut secundum naturam constitua-
 „tur, & quicquid sub lecti pedes supposuisti, ac lapides,
 „& quicquid sub coxas subdidisti, subtrahito. Capiti
 „vero pulvinar subicito. Atque talia hoc modo curato.
 „Quicumque vero focus vivi manum aut crus foras præmit-
 „tunt,

facilem istorum temporum difficultatis partus cum morte embryo-
nis sympathiam?

§. VI.

„tunt, aut etiam ambo, eos oportet quam celerrime, ubi
„exitum significarint, predicto modo intra retrudere, &
„in caput vertere, & ad viam reducere. Et quicumque
„fœtus complicantur ad lateris mollitudinem, aut coxam in
„partu collapsi, eos dirigere, ac vertere oportet & in
„aquam calidam desidere facere, donec mulier refocilletur.
„Quicumque vero fœtus mortui aut crus, aut manum foras
„protendunt, eos optimum quidem fuerit, si id fieri posset,
„intro retrudere, & ambas has partes in caput vertere.
„Si vero hoc fieri non poterit, verum intumescit, secare hoc
„modo- Dissectum per scapellum caput cum contusorio in-
„strumento, ut ne in ramenta findatur, contundito, &
„ossa per osium volsellam aut tractorium instrumentum jux-
„ta claviculam immissum, prout habuerint, extrahito,
„non multis simul, sed paullatim exemtis, ac rursus ab-
„latis. Quum vero hæc foras extraxeris, & in ipsis hu-
„meris fueris, ambas manus in articulis cum ipsis humeris
„secato. Et ubi hæc extraxeris, si quidem fieri poterit,
„ut exeant, etiam reliqua facile extrahito. Si vero non
„obediant, totum pectus usque ad iugulum findito. Verum
„caveto ne in ventrem seces & aliquid de intestino denudes.
„Exit enim venter, & intestina & stercus. Si vero ho-
„rum quid excidat, majores negotii jam res fit. Contun-
„dito autem costas, & scapulas contrahito. Et facile po-
„stea reliquum fœtus procedet, nisi jam ventrem tumidum
„habuerit. Si enim tale quid fuerit, melius est ventrem
„fœtus leviter perforare. Flatus enim solum a ventre exit,
„& sic facile prodibit. Si vero exciderit manus, aut crus,
„immortui fœtus, si quidem fieri poterit, ambas partes re-
„tru-

§. VI.

Quædam in hisce artificiis nostri ævi laus est. Si medicamenta nos destituunt, si manca est ars, si cognitio generationis obscura; aliquod tamen est in partu artificium mollius, tutius & salutare magis. Quieta exspectatione, blandò regimine, venesectione partus diuturnitati fœtusque vitæ blandiri didicimus, manu in abdita atria penetrare audemus, fœtum apprehendere componere sciteque exsolvere integrum & illæsum, quum apta, quæ unicam manum repellit, utriusque manus comprehensio requiritur, artificiales ferreasque manus, easdem tamen læves & innocuas applicamus, tumque demum lacerare, secare & cadaver mutilare non dubitamus, quum malorum pondus leviora auxilia spernit.

§. VII.

Quum autem hominem lædere a nobis alienum sit, tardi ad extrema properemus, & vel maxime de salute vitæque embryonis solliciti simus. Opus itaque est, ut mortuum corpus a vivo homine dignoscere discamus. Adeo vero ardua & anceps est ista cognitio, ut dubius sæpius fit honestus operator, agendumne sit, an quiescendum?

§. VIII.

„trudito, & fœtum rite dirigito. Hoc enim optimum fuerit. Si vero fieri non poterit, ut hec facias, quicquid sane foris fuerit, quantum potes penitissime resecato, & reliquum profunditate intus explorata protrudito, & fœtum in caput vesrito. Quum autem vertere, ac secare puerum voles, ungues de manibus tuis resecato. Scapellum vero, quo dissecas, incurvum potius sit quam rectum, & huius caput occultato per indicem digitum, eodemque interna explorato, ac deducito, ita ut caveas, ne uterum contingas.

§. VIII.

Sunt quidem signa, sunt iudicia quædam, quæ operatorem dirigunt, dubia autem ista sæpiusque fallentia animum non penitus confirmant. Signorum istorum ratio talis est, ut cum sæpius aliquando responderint, interdum tamen fallant. Nulla tamen iis fides non est, si aliquando decipiunt, cum per plures respondeant. Quare operæ utique pretium artique perutile ejus censeo, si in ista signa strictim pro otii angustia & virium tenuitate inquiram, ex quibus nempe intelligi possit, vivatne foetus, sitne mortuus?

§. IX.

Non jam in illam litem me immergam, qua disceptatur de termino animationis in embryone. Ridicula propemodum & inutilis quæstio est. Ipsum illud momentum, quodcumque etiam sit, quo ex generationis humoribus homo, artificio mirando magis quam explicando, coalescit, vitali spiritu hominem ornat. Quomodo enim homo sine vita crescere potest? Illi profecto non audiuntur, qui tunc demum temporis animari embryonem putant, cum manu sua abdomini matris imposita agitatam embryonem tangunt. Quasi vero debilior embryo molliori corpore, in majori liquoris copia, sine sui indicio non possit agitari. Neque etiam diversus masculis foemellisque animationis terminus cum veteribus statuendus est. Passim exempla exstant, tenellorum admodum embryonum, qui vitæ inditia quædam fecerunt (e).

§. X.

Altera quidem controversia proprius ad nostrum scopum spectat, quæ in terminum vitalitatis inquit. Certum vero diem, quo natus puer vitam servare possit, constitui posse mihi non videtur.

(e) *Conf. DE LA MOTTE Traité Complet des accouchements L. II. Obs. 131. 132. 134.*

tur. Observationum copia, ex omni parte determinatarum, nulli-
bi colligi potest, neque ratiocinii ope ista ad calculos vocare nobis
datum est. Id saltem cognoscimus, ante septimi mensis initium,
sive primis sex mensibus, embryonem extra uterum sine vitæ dispen-
dio non versari, nimis fane debilem mollemque, quam qui blando
matricis fotu secundarumque tenui nutrimento carere salvus possit.
Septimo sensim mense vires magis ita confirmantur, ut abhinc ista
periodo fœtus natos adolevisse & ipse observare passim possis, & a-
liorum observationes intelligere. Commode itaque Divinus medi-
cinæ parens (f) septimestri fœtui vitæ jura adscripsit, atque Juris
Doctore; concesserunt (g), Tædiosa cæterum foret notissima no-
stro ævo disputatio, si boni Parentis hallucinationem quandam &
præjudicatam, ex mente concepta embryonis defatigatione, opinio-
nem indicare & evertere vellem. Quem enim inter nos fugit octi-
imestri partui non paria vitalitatis, quæ septimestri, sed majora uti-
que jura tribuenda esse? Terminum itaque, quo operator de vita
nascituri sollicitus esse debet, septimus nonusque mensis complecti-
tur: ante istam periodum, abortivam molem pro salute matris ne-
gligentius habere potest.

§. XI.

Non sola vero embryonis salus atque integritas operatoris in di-
gnoscentia embryonis vita sagacitatem sibi vindicat, sed matrum
etiam desideria & anxie querelæ. Ista quidem cognitio sub ipsum
partum usum venit, quum artis ope vel juvandus vel totus absolvendus
est partus, ut embryoni parcere & vivi fœtus spe atque fiducia ani-
mum matris atque amicarum confirmare possit, vel famam saltem
suam medicus mortis prædictione sartam tectamque servare. Solet
autem contingere, ut ante pariendi tempus medici judicium de vi-
ta

(f) *Lib. de partu septimestri.*

(g) *Lib. XXXVIII, Lit. XVI. de suis & legitimis Lib. 3. 5. fin.*

ta latentis embryonis petatur. Prolis desiderio flagrant matres, plura graviditatis signa, ea tamen incerta quandoque & aliis affectibus communia notant, abdominis tumorem, clausos menstrui sanguinis fontes, appetitus alterationem aliaque, consulunt medicum, ut factam conceptionem non solum indicet, sed vivere etiam foetum edoceat. Aliæ morborum injurias passæ sunt, medicamentorum externæ cujusdam violentiæ, animi affectus aliasque. De futuro abortu prolisque nece facta anguntur; ut quiescere animus possit medici consilium efflagitant.

§. XII.

Quamvis vero simplex sit illa cognitio, quæ ante pariendi tempus foetus habitum indicat, cautum tamen medicum requirit, gravem atque expertum. Uterus clausus in omni sede a medici exploratione embryonem remouet. Hariolari itaque vitam embryonis ex inutationibus nonnullis, quas vivus in matrem transfert, debet. Natus enim embryo in amnii latice, ad uteri sæpius parietes, cancellis inclusus, allidit, ad exteriora istos parietes movet, hi moti abdominis integumenta repellunt, repulsa integumenta a matre æque ipsa ac observante medico animadvertuntur. Quo autem vicissitudines istæ matrem afficiant & tegumenta moveant, impulsu corporis, id est ipsius embryonis, is impetus massæque moles & obstaculum requiruntur, quæ uteri parietes vincere possint. Tale vero massæ robur cum ante mediam quasi graviditatis periodum vix embryonem muniat, ante istam periodum embryonis allisio sui indicium vix præbet. Nequit itaque ante illam periodum de vita embryonis, ex hoc saltem indicio, aliquid constituere medicus.

§. XIII.

Primæ etiam, quas mater sentit, allisiones adeo sunt debiles atque ancipites, ut eadem ipsæ obfirmare animum nondum valeant. Sensum autem validum embryonis robur non modico impetu in uterum

rum ita fertur, ut foetu gravidæ, in primis expertæ, illam excitationem satis intelligant, quin ultimis hebdomadibus non sine dolore quodam & incommodo experiantur. Est tamen quarundam, primum maxime uterum gerentium, ea ignorantia, ut parum sapius habeant istum pulsus, validioris eum borborygni oberrationem reputantes; suntque feminæ, ex illis præcipue, quæ arido licet utero prolem tamen desiderant, minimam intestinorum agitationem embryoni adscribentes. Est itaque opus, ut criteria constituantur, quibus embryonis motus ab omni alia abdominali agitatione removeatur. Ipsa quidem agitationis ratio differentiam subministrat. Embryonis quippe impetus abdominis integumenta cum uteri pariete ita propellit, ut elevatum abdomen mater ipsa sentiat, observator videre queat, quin imposita abdomini manu nifum corporis ex centro abdominis in superficiem, ac si erumpere vi vellet, percipiat. Si ne delectu atque ordine alii quicunque motus in omnem abdominis plagam vagantur.

§. XIV.

Edoceatur ergo mater, ipsa motum observet, manum abdomini medicus gravis imponat, embryonis impulsus præstoletur, atque ut omne dubium præcidatur, aliquoties explorationem repetat. Notet insuper medicus certiore esse explorationem, cum laxato abdomine supina foemina cubat, elevatis capite & cruribus, calcibus ad nates retractis. Laxatur etiam abdomen uterusque propior examinatur; quum lotii vesica depleta est. Mane, si circumstantiæ permittunt, exploret medicus cubantis feminæ abdomen, quo quippe tempore valentiori motu foetus agitari solet. Si nihil motus percipit, excitare ad aliquam constrictionem abdomen uterumque, istaque constrictione foetum laceffere potest manus (*) frigida, quam abdo-

(*) PEU. *Pratique des accouch.* L. I. Cap. V. p. 43. *suadet, ut manus aqua frigida madida abdomini imponatur.*

abdomini imponit. Ita quidem ut plurimum, si vivit foetus, calcitrante se ipsum prodit. Sibi tamen medicus caveat, ne vitam mox embryoni deneget, cujus forsan motum hac exploratione non cognoscit. Sæpius enim per plusculum tempus embryones quiescere solent mortuisque assimilari, illi maxime, quibus parvus liquor amnii circumfusus ita est, ut arctioribus cancellis artus coerceantur. Ipsius etiam embryonis debilis valetudo viriumque languor languidum motum reddunt, penitusque aliquamdiu intercipiunt. Quin matris plethora uterique nimia repletio istam agitationem imminuit, venæsectione acuendam. Repetat itaque medicus sua pericula, atque ad negans effatum, ceu in tota re physica, lentus sit. Quum frequenter expectatus embryo ad plura experimenta silet, vix illum periisse addubitandum est. (b)

§. XV.

Quo quidem signo si medicus caute atque prudenter uti didicerit, in errorem vix incurrere potest. Vulgaria autem & superioribus maxime seculis usitata criteria observatio non suggessit, sed falsarum hypothesium metusque inanis nexus. Huc spectat sanguis in aquositate versus, ex quo oriuntur oculi cavi, tumor universi corporis, faciei pedumque, aures albæ, summus nasus albus & labia livida (i). Alii cadavere putrescere animadverterunt, putredinem

(b) *Conf. Elementa art. obstetr. ROEDERERI Præceptoris mei omni cultu venerandi. §. 372.*

(i) *Confer. HIPPOCR. Lib. de Superfætatione n. 8. „Prægnantem mulierem si aliter non cognoscas, oculi tracti & caviores fiunt & candidum oculorum albedinis naturam non habet, sed lividius existit. Si qua partui vicina sit, & oculos cavos habeat & facies intumescat & ipsa tota, itemque pedes tument, ut velut a pituita a alba apprehensa*
„ap-

nem corpori vivo inimicam esse morborumque cohortem immittere ex aliis morbis didicerunt. Quæ ergo mala ex embryonis morte & insequente putredine timenda non sunt? facies plumbea, oculorum livor, bulbi depressio, cordis palpitatio, spiritus difficultas & fœtor, capitis dolor, oculorum caligo, aurium tinnitus & susurrus, febris lentitudo, animi deliquia aliaque (k). Neque autem istiusmodi mala in gravidis notantur, neque mortuus in utero embryo putrescit. Sæpius enim accidit, ut diu ante partum fœtus morte occumbat, atque nono mense natus septimestrem octimestremque habitu suo moleque referat, rugosus & contractus, sine ullo putredinis vestigio vel matris prægresso incommodo morboque. Quin, quod omne penitus dubium præcidit, nascuntur gemelli (l); quorum alter vivus, integer est, torosus atque perfectus, alter vero demortuus dudum; assimilari enim mole potest septimestri, quin sextum mensem qui vita sua attigit, parvus est, contractus, rugosus: nihil

„appareat, & habeat aures albas, & summum nasum al-
 „bum, & labia livida, ea ipsa mortuos gestat, quos pari-
 „et aut vivos prave, & non vitales, & exanguës, utpote
 „morbosos, aut prius peperit non vitales. Huic sanguis
 „in aquositatem versus est. Oportet igitur tali post par-
 „tum odorata &c.

(k) Confer. EUCH. RHODIO, primus theorematum ad artem obstetriciam spectantium inter Germanos compilator in L. de partu hominis C. 9. ubi magna istiusmodi signorum farrago recensetur. Pro more multi insequentes cæco obsequio titubantem alienis que fulcris innitentem hodogetam secuti sunt. Conf. ROEDERER in lib. cit. C. XVI. §. 376. 377.

l) Ejusmodi observationem recenset Celeb. TREUW in commerc. lit Noric. Volum. VIII. p. 98. Confer. & DE LA MOTTE Lib. cit. reflexion. ad obs. 397. & VOELTERS Hebammen Schule P. II. Cap. XV. p. 231.

nihil tamen putredinis notatur. Alias tenuior liquoris amnii pars, in mortui foetus poros sese insinuando, hunc ipsum fere resolvit maceratque, qualem in Xenodochio parientium a ROEDERERO sectum sine levissima putredinis corruptela vidi (*).

§. XVI.

Neque est, quod miremur. Quis enim nescit æris liberiorem accessum ad putredinem necessario requiri, certissimumque contra eandem præsidium esse æris exclusionem? Uteri autem gravidæ velamenta adeo embryonem liquoremque amnii omni æris injuria tutos reddunt, ut per plures non solum menses, annos (m) incorruptus foetus moretur. Quando vero uteri contractio velamenta laceravit, vel obstetricis manus, tunc utique mortui foetus partus expediendus est, nisi quidem gravissima putredine hic infici, & matrix ista mephiti infecta gangræna foedari debet, atque pessima dictisque multo pejora mala excitari.

§. XVII.

Ferri melius potest id signorum genus, longa tamen atque cautâ observatione nitens, quod ab incremento embryonis & expanso sensim abdomine pendet. Quum enim uterum gerens femina vivum embryonem nutrit, non potest non abdomen inde a primo secundoque mense ad finem usque graviditatis elevatum crescere & indurescere. Quotidie enim embryo cum utero & placenta incrementa capit. Cetera itaque omnia si fuerint in salvo nullum que plane graviditatis dubium supersit, abdominis perpetuum incrementum certissi-

(*) cf. *Obs. med. de partu laborioso. Obs. VII.*

(m) *Huc spectant Lithopædia, & conferri meretur dissert. Dn. MORAND in Memoires de l' acad. Royale des Sciences de Paris Anno 1748. p. 108.*

tissimam embryonis vitam indicat. Quum autem gravem embryone uterum esse compertum est, & nihilo secius abhinc aliquo tempore ut abdomen crescat tantum abest, ut potius sensim collabatur, contrahatur, umbilicus antea expressus retrahatur, hypochondria liberentur, abdominis tumor delabatur ad pelvim, de mortuo onere non est quod dubitemus. Quodsi etiam gravida corpus agitans molem huc illuc raptam motamque sentiat, erectaque ejusdem pondus vesicæ & intestino recto incumbere ex tenesmo & urinæ incontinentia vel retentione percipiat, vix ulteriori argumento egebit (n).

§. XVIII.

Prudentia tamen & matris & medici laudanda est, si in judicio moderati lentique signa jungunt, atque argumentorum unitas vires desiderant. Non solum itaque ad embryonis motum tumoremque abdominis attendent, sed mammarum etiam habitum non negligent. Mira quidem nec dum satis explicanda inter uterum mammasque sympathia est, qua pares vicissitudines patiuntur. Crescit in pubere virgine matrix, sanguine uberiori alluitur, inflantur & marmæ, sanguinem cum pinguedine uberiores accipiunt. Decrescit in vetula uterus & constringitur, pendent ex exsiccantur marmæ. Largius, cui lunare tributum parcum est, nutritur matrix, magis

(n) Confer. HIPPOCRATES *de superfætat.* n. 6. „Si cui puer
„in utero immoriatur & non egrediatur humido utero exi-
„stente & quum jam non habeat amplius humiditatem, sed
„siccatus fuit uterus, primum quidem intumescit puer, de-
„inde colliquescent, ac putrescent carnes forasque effluunt,
„postremum autem procedunt ossa: & fluxus aliquando cor-
„ripit, si non prius moriatur. Quum puer immortuus fu-
„erit, tum aliis signis conjectare id licet, tum jubere, ut
„aliquando in dextro latero jaceat, aliquando in sinistrum
„transmutet. Translabitur enim in utero puer eo quo mu-
„lier

magis in sana femina expanduntur maminae. Alii feminae copiosior sanguis plurimum uteri nutrimentum aufert, teneriores minoresque sunt maminae. Gravidæ uterus expanditur, expanduntur & indurescunt maminae. Ita pari modo, cum mortuo embryone uterus collabatur & languent; languent maminae, collabuntur, pendent, mortuum quasi, qui alumnus futurus erat, lugent, serosum lacteumque nutrimentum sua sponte, ceu superfluum liquorem, effundunt. Quæ itaque si medicus observat, de morte embryonis iudicium obfirmare potest (o).

§. XIX.

Hæc fere sunt, quæ medicum ad vitam mortemque embryonis intelligendam ante partum ducere possunt. Quum jam parturit femina ad alia omnia respicere debet. Quies vivi embryonis toties in partu notatur, postquam amnii liquore profuso arctioribus embryo cancellis continetur, propter ipsum partum delabatur abdomen, totiesque maminae fluunt. Ipsum potius embryonem, cum primum velamenta rupta propiorem aditum concedunt, examinare medicus debet, & quid agendum sit cognoscere. Præstolari sine detrimento velamentorum rupturam potest, quod ante illam periodum nihil perficere vel potest vel debet, vitæ cognitioni amicum. Quid quod, si

„lier se vertit, velut lapis aut aliud quoddam, si mortuus fuerit & pectinem frigidum mulier habet. Si vero vivat, & pecten calidus est & venter totus translabitur una cum reliquo corpore extentus, & in ipso nihil translabitur absque reliquo corpore.„ Et Præceptoris lib. citat. §. 374. „PEU L. I. C. V. p. 42 /qq.

(o) Conferat. HIPPOCR. de morb. mulier. Lib. I. n. 44. *„Ovisbus in ventre habentibus circa septimum aut octavum mensem, derepente mammarum, & ventris plenitudo collabatur, & ubera gracilescunt, & lac non apparet, hic di-*
cen-

si quædam, qualis est hæmorrhagiæ, festinatio urgeat, sine hæsitati-
one velamentis sagax medicus vim infert (p).

§. XX.

Tangat autem medicus partem previam aliamque quam assequi
potest, & de statu hominis judicet. Facilior multo exploratio est,
quum liberum vacuumque orificium vel tenuiori saltem artu factum,
operatoris manum ita admittit, ut ad omnem embryonis partem,
ipsiunque umbilici funem pergere possit, vitamque embryonis ea-
dem opera explorare, qua fœtum pedum prehensione solvit. Vi-
vit enim fœtus vitamque operator cognoscit, cujus arteriæ pulsant &
artus moventur. Tangat itaque umbilici funem cordisque regio-
nem, ut pulsus rationem cognoscat. Tangat laceffatque manuum
digitos pedumque, qui in vivo partu contrahuntur, & operatoris di-
gitumprehendunt. Digitum ori infantis inserat, qui suctione lin-
guæque agitatione ipse de vita sua testabitur. Contentus interim u-
nico certissimoque signo esse poterit operator, funis nempe pulsu,
quum aliarum forsan partium copia non adest (q). Sibi tamen ca-
veat, ne gloriabundus atque arti nimis confidens se vivam prolem
protracturum spondeat, dubiam potius & circumstantiis accommo-
dam prognosin faciat, ne promissis turpiter excidat, si forsan, ceu
sæpi-

*„cendum est, puerum aut mortuum esse aut vivere & debi-
„lem esse. Si enim in ventre habuerint & apparuerint men-
„ses, aut abortus fiunt, si plures fuerint, & male olentes,
„aut abortus fiunt, si plures fuerint, & male olentes, aut
„fœtus morbofi fiunt. Nec non idem Auctor de morb. Po-
„pul. L. I. S. S VI. & Aphorism. V. 52. Elementa artis ob-
„stetr. ROEDERERI §. 378. SANAH STONE. Obs. X.*

(p) *Vid. lib. citat. Cap. XX. §. 686.*

(q) *Conf. ROEDERERI lib. cit. §. 388.*

sæpiusculæ præter omnem operatoris culpam accidit, inter extrahendum, diutule fune pressò, foetus emoritur. Mortem embryonis, quam exploratione intelligit, confidentius indicare potest.

§. XXI.

Ardua autem res est & incertitudinis plena, cum prævium embryonis caput, vel alia quæcunque pars amplior integrum orificium ita obturat, ut ad funem partemque mobilem pergere operatori integrum non sit. Non omni tamen præsidio destituimur, varii modo casus si recte distinguantur. Ad partum difficilem lentumque solum respicimus, quod in partu facili & expedito quæstio de habitu infantis vix moveri soleat.

§. XXII.

Et ante reliqua quidem signa ponendus est præviæ partis, capitis maxime, tumor. In nullo non partu lentiori prævium caput vel alia quæcunque pars amplior ad pelvis ossa premitur, cutisque & pericranii musculorumque vasa arctantur, sanguis stagnans in cellulosa telam effunditur, cutisque in tumorem expanditur. Id quum per omnem partus periodum contingat, efficit ut in lentissimo vivi foetus partu in secundum quasi caput capitis tumor tandem exigatur. Sanguinis circuitum, qui novas perpetim suppetias fert, pro elevando tumore requiri, me non monente liquet. Nequit itaque sanguinis circuitus cum vita foetus vigere, ubi in lentiore partu prævia pars amplior plane non exurgit, isque tumoris defectus ante partum vel sub ipsius partus initium embryonem diem obiisse indicare potest. De vita autem circuituque præsentis non est quod dubitemus, quoad in tumorem caput aliave pars elevatur, elevatusque tumor ampliatur. Inter ipsam etiam illam partus diuturnitatem tumorisque incrementum sæpius omnino foetus occumbit; quo quidem in casu nihil ulterius expanditur, solusque jam formatus tumor manet, neque a doloribus, ut ille foetus vivi, induratus, sed sensim emollitus. Sola

Sola itaque tumoris præsentia præsentem vitam minime probat, sed vixisse saltem fœtum sub partus initium. Ut recte fœtum & nunc vivere intelligas, protractum tumoris incrementum observes necesse est (r).

§. XXIII.

Quum caput fœtus in pelvium depactum inter pelvis ossa compingitur, & amnii liquore uterus vacuus est, tum spatium in quo artus expandere possit, caret fœtus, tum incitamento: qui videlicet attonitus ex capitis compressione jacet, desinit moveri quiescitque. Nihil ergo ex illa quiete ad mortem vitamque infantis inferre poteris. Neque cum cum successu fontanellæ pulsum indagabis (s). Certius de infantis morte judicabis, si funem forsan ante caput pendentem frigidum pulsuque destitutum tanges, sublatis circuitus in sanguine indicem.

§. XXIV.

Solent in agone mortis varii corporis muscoli agitari, illicque præ reliquis, qui scybala promovent, cum animal suffocatur. Facile itaque est inielligere fœtum, qui nunc it suffocatum in partu, meconio excreto maternum sinum conspurcare, fœdaque meconio genitalia fœtum in summo periculo mortis versantem indicare. Caveas tamen, ne certam inde embryonis mortem inferas, cujus vi-
tam

(r) *Libr. citat. §. 379. 380. 381.*

(s) *Vid. ROEDERERI elementa art. obstet. §. 382. Sæpius etiam in xenodochio ostendit tactuque exhibuit recens natorum capita, quæ sine omni ad fontanellam pulsu, infans licet viveret, deprehendebantur.*

tam cum morte luctantem, soluti temporius, fervare sapius poteris (t).

§. XXV.

Omnes quidem, quoad foetus vivit, turgere solent partes, turgere cerebrum, cranium expandere & ossicula, ne sese tangant, dimovere. Collabuntur autem, cum sanguis reliquaque fluida quiescunt, collabitur cerebrum, concidunt ossa, vicina tangunt, margines, si digito os cranii moveas, colliduntur, stridorque edunt. Stridentia ergo cranii ossa demortuum esse embryonem nos dato in casu edocere possunt (u).

§. XXVI.

Quid autem pro morte embryonis arguenda putredinis indicibus certius esse potest? liquore ex genitalibus putri profluente, foetore ingrato, mollibus embryonis partibus, secedente carne, cute, cuticula? Cogitet nihilominus operator, epidermidem nonnunquam præter putredinem obstetricis violenta manu detrahi, cum irritò & inepto conamine capitis extractionem, manu sua tumori injecta, molitur. Putris ceterum liquidi fontes sunt amnii liquor, meconium, liquores ex ore naribusque embryonis profusi, placenta & ipse in pessimo casu embryo. Vix enim sine matricis consortio putredine diffluere embryo solet. Distinguere autem a meconio putrorem medi-

(t) Conferri hic quam maxime debet ROEDERERI observationum medicarum de suffocatis satura §. VI. nro. IX. not. a.

(u) Conf. van HOORN Siphra und Pua P. I. Cap. VI. cf. & MITTELHAUSER praktische Abhandlung vom Accouchiren Sect. II. §. 2. p. 33.

dicus discat. Fœtet hic, quemadmodum saniosi liquores, solutus est & fuscus: odore caret meconium, ex viridi flavo colore aquam tingit, atque crassioribus massulis amnii liquori immiscetur w).

§. XXVII.

Arduo etiam in negotio, quando anceps hæres medicus, ad varia alia, quæ partum circumstant, respicere debet, ad partus longam moram, fœtusque in angustiis, postquam amnii liquor effluxit, periculosam afflictionem: vix enim lentum istud discrimen salvus eluctari solet fœtus; quare etiam, si cetera omnia paria fuerint, audacter manum admoveere potest medicus & sine homicidii crimine vel culpa, cum tertius quartusve a primo ipsius partus initio jam inluxit. Quin id moræ ad necem embryoni inferendam non requiritur, cum varia partus laboriosi periculosique discrimina alia accedunt. Ita sane omne malorum genus, quod in utero materno, antequam videlicet vitalis pulmones spiritus agitet, liberum sanguinis ex embryone in placentam uterumque maternum iter liberumque inde in embryonem reditum intercipit, intra pauca horæ minuta embryonem mulctare vita solet: quo referimus omnes funis stricturas, quibus sanguinis circuitus sistitur; funem inter caput aliamve ampliorem corporis partem & pelvis ossa pressum; quacunque ceterum ratione fœtus positus sit; funem ab obstetrice ex imperitia compactum; funis nodum arctiorem; neque minus funem disruptum, uterique largam hæmorrhagiam, quæ a placenta sanguinem avertit. Huc etiam ista mala pertinent, quæ gravi violentia ipsam fœtus corpusculum afficiunt, sanguinisque circuitum inhibent, collum v. g. varia ratione constrictum, umbilicali fune, uteri vel vaginæ orificio; pressa etiam colli vasa, cum collum nimis incurvatur,

(w) ROEDERERUS *in elem. art. obstetr.* §. 385. & 386. & loc. ad not. T. excitat.

tur, ipsumque caput a corpore avulsum. Præ reliquis vero indiciis omnem dubitationis scrupulum evellit, si læsum a præcedente operatore, quem successus in opere desituit, gravi vulnere & lethali corpusculum deprehendit; quo quidem in casu non solum præter moram opus aggredi medicus potest, sed & debet, quod & partus difficultate & imperita operatoris agitatione fatigata promptissimum auxilium efflagitare solet parturiens (x).

(x) *Conf. lib. cit. §. 389.*

DISSERTATIO INAUGURALIS MEDICO-LEGALIS
DE
FUNICULI UMBILICALIS
DELIGATIONE
NON ABSOLUTE NECESSARIA

Q U A M

DIVINIS SUB AUSPICIIS
GRATIOSAE FACULTATIS MEDICAE CONSENSU

P R O
OBTINENDIS DOCTORIS MEDICI HONORIBUS

PUBLICE DEFENDET

A U C T O R

CHRISTIANUS LUDOVICUS SCHAEEL

HANOVIENSIS

DIE I. NOVEMBRIS MDCCCXV.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
PHYSICS DEPARTMENT
530 SOUTH EAST ASIAN AVENUE
CHICAGO, ILL. 60607

RECEIVED
JAN 10 1964
PHYSICS DEPARTMENT
530 SOUTH EAST ASIAN AVENUE
CHICAGO, ILL. 60607



B. C. D.

DISSERTATIO INAUGURALIS MEDICO - LEGALIS

D E

*FVNICULI UMBILICALIS DE-
LIGATIONE NON ABSOLUTE NE-
CESSARIA.*

§. I.

Homo nascendus, dum ovo suo inclusus utero gestatur, corpori cuidam vegetabili non plane absimilis est. Ut enim vegetabilia radice gaudent, cujus ope & terræ nectuntur & alimoniam sugunt, sic embryoni placenta data est, quæ pari munere fungitur. Est autem placenta corpus rotundum, constans ex innumeris vasculis, intermedia cellulositate conjunctis, quæ tanquam radiculae sensim in concava placentæ superficie auctæ, confluent, atque in tres magnos truncos spiraliter contortos abeunt. Maximus truncorum vena umbilicalis audit, humores a placenta fœtui advehens; duo minores arteriæ sunt, iliacarum communium propagines, quæ venam spiraliter amplexcentes, sanguinem ex fœtu in placentam revehunt. Isti tres trunci, e centro circiter placentæ prodeuntes, in gyros contorti, cellulosa fabrica liquido gelatinoso plena, & membrana

Kkk

ex

ex ovi velamentis continuata circumdati, funiculi umbilicalis ideam absolvunt. Ipse vero funiculus, ductu satis pro libera foetus mobilitate longo decurrens, in umbilicum desinit, vasis dein ulterius in corpusculo distributis; vena quidem ad venæ portarum sinum, arteriis ad suas origines (a).

§. II.

Tribus istis vasis umbilicalibus sanguiferis urachus associatur; qui canalis exiguus, conicus, ex vesicæ fundo oriundus, inter arterias umbilicales egrediens, in funiculo finiri videtur: neque enim ad placentam usque cultro vel visu eundem prosequi possumus. Amplior vero est in brutis urachus, & in saccum quendam, quem alantois format, quique urinam ex vesica foetus per canalem istum recipit, continuatur. In homine vero obscurior ejus usus, mire hactenus physiologos pariter & anatomicos vexavit, cum nulla in humano ovo alantois, certa satis fide detegi potuerit. Hunc canalem urinæ aliquam copiam, ex vesica in cellulosam funiculi fabricam effundere, saniorum physiologorum conjectura est. (b) Cum vero ad nostram quæstionem urachus vix pertineat, ad placentam redeunt, ulteriorem ejus tractationem prætermittimus.

§. III.

(a) Conf. Ill. PHIL. ADOL. BOEHMERI *figura aeneæ annexæ Dissertationi: De necessaria funiculi umbilicalis vi vasorum structuræ in nuper natis deligatione, quæ Halæ 1745. respondente IO. BURCHART defensa, recusa exstat Tom. V. Collectionis Hallerianæ Dissertationum Anatom.*

(b) Conf. Ill. HALLERI *Prim. lin. Phys. ed. alt. §. 837. Ejusdem Comment. in Bærbau. Praelect. Acad. Tom. V. P. II. §. 68. not. b.*

§. III.

Uteri ut plurimum fundo placenta nectitur, & membranis foetum cingentibus continua est ea lege, ut interior earum amnion dicta liquorem, in quo foetus natat, sacco suo includat, funiculum exterius vestiens; exterior vero, chorion vocanda, inter amnion & placentæ superficiem concavam producat, funiculi gelatinam ambiens; & tertia tandem huic inhærens, filamentosa, totum ovum cum utero nectat; laxius quidem ubi chorion est, firmitus, ubi in crassiorem, cum majoribus vasis, circa marginem placentæ cellulofam abit. Firmissimus autem ovi nexus est in placentæ sede, sulcis in convexa facie præditæ, qui æqualibus uteri eminentiis respondent. (c)

§. IV.

Sed præter istum placentæ usum, quo firmitus ovum cum utero nectit, insignior alter est, quem nutriendo præstat corpusculo. Chylum enim, vel partem maxime nutritiam, ex orbita sanguinis materni sorbet, eundem sanguini foetus, per arterias umbilicales adveniendi adfundit, hunc denique crudiores, pulmonum quippe operam nondum expertum, ope circuli per tenuissima sua capillaria vasa continuati, actionibus muscutorum abdominalium matris, motu intestinorum & diaphragmatis ejusdem sublevata, intine miscet, subigit, præparat, ut refluens per umbilicalem venam par sit muneribus tenello corpori præstandis. Placentam adeo pulmonum officio in foetu, dum veri munere suo vacat, defungi liquet, quod nempe in intima particularum sanguinis comminutione, earumque cum chyloso succo unione consistit. (d)

§. V.

(c) *Conf. ROEDERERI Element. Art. Obst. §. 68. & 70. & Dis. de foetu perfecto §. 6. & 7.*

(d) *Cel. F. HOFFMANN. Med. syst. Tom. I. Sect. II. cap. 13. §. 10.*

§. V.

Non ignoro, multis hanc sententiam paradoxam videri, quippe qui non chylum, sed ipsum sanguinem maternum, foetui communicari asserunt, eundemque ex foetu redeuntem non in placenta, sed in maternis pulmonibus subigi. Putant nimirum vasorum umbilicalium fines, sive ultimas propagines, uteri vasculis sic insinuari, ut ultimæ arteriæ uteri, cum ultimis venis placentæ, & hujus ultimæ arteriolæ, cum ultimis uteri venulis per anastomosin cohæreant; atque sic immediate sanguis ex matre in foetum devehatur, qui, quando ob pulmonum deficientem operam iners redditus est, matri per arterias umbilicales remittatur, in hujus pulmonibus denuo elaborandus. (e)

§. VI.

Sed multa sunt, quæ immediatum sanguinis materni ad foetum iter dissuadent, si experientiam consulas. Ruyschius, felicissimus ille anatomicus, artificiosissimis suis injectionibus docuit, sive materiem in alteram arteriarum umbilicalium, sive in venam siphone propellas, in utroque casu omnes simul, una injectione, & venas & arterias turgidas reddi, adeoque liquidum per alterutrum vas injectum, per reliqua redire, (f) nullo in convexa placentæ superficie, quæ utero cohæsit, apparente poruli vestigio, unde materia injecta efflueret, quam veritatem ego in theatro nostro anatomico sæpe vidi comprobatam. Fuerunt etiam, qui uterum gravidum oleo terëbinthinaceo, vel alio liquido penetrabili repleverunt, & ne guttulam quidem injectionis, inde in placentæ vasa transmigratam, ullo

(e) Conf. HERM. BOERHAAV. Prælect. Acad. cum Notis HAL-
LERI Tom. V. p. II. §. 679. p. m, 300.

(f) RVYSCHIUS in thesaur. Anat. passim. conf. BOERHAAVE l.
c. p. 285.

ullo sensu observare potuerunt. (g) Porro, quando placenta ab utero solvitur, nullum in convexa superficie foraminulum occurrit, ex quo ad vasa lacerata vel ullo modo hiantia concludi possit, nec ulla sanguinis guttula ullo in loco exsudat, licet aqua calida, ad arceudas aeris ambientis injurias & prohibendum sanguinis coagulum detineatur; infanti etiam adhuc continua, vigente adhuc inter hunc & illam sanguinis circulo, quod sæpius a ROEDERERO experimentis vidi confirmatum: uteri vero gravidæ vasa in superficie concava sunt adeo grandia, ut digitum admittant, ceu secantes observarunt clari viri, (h) deglubitur; & probant hæmorrhagiæ, illæso utero, placentæ solutionem quandoque insecutæ satis notabiles. Cum ergo tanta vasorum uteri versus placentam lumina sint, umbilicalium vero ultimæ propagines, quæ placentæ dorsum lambunt, adeo exiles, ut visum subterfugiant; neque vero anastomosis quædam concipi possit, nisi quæ ex vasorum æqualis diametri coalitu oriatur; ex sola hac differentium luminum consideratione palam fit, non nimis firmo talo stare, quod de anastomosi horum vasorum auctores passim prædicarunt.

§. VII.

(g) MONROO in actis Edimburgensibus Tom. II. aliique conf. Gen. HALLERI Comm. ad BOERH. Prælect. acad. T. V. P. II. §. 78. not. b. Anastomoseos defensores experimenta his contraria perhibent & imprimis NOORTWYK in hist. ut. grav. sed errorem detexit ROEDERER in Diss. de Fetu perfectio §. 10. quæ recussa exstat Tom. VII. Hallerianæ collectionis Dissert. Anatom.

(h) NOORTWYK. l. c. §. 7. no. 3. & §. 9. no. 1. sed minora prioribus. MORGAGNUS Adv. anat. IV. animadv. 26. BERNH. SIGFR. ALBIN. icon. Uteri human. gravid. ROEDERER sermo de Comm. uteri & placent. §. VII. in Comment. Societ. Gætting. a. 1753. T. III. p. 404. sq. & Icon. uteri humani Obs. illustr. Tab. VI.

§. VII.

Ulterius ista quæ contra receptam hypothesein hætenus diximus dilucidantur experimentis illis, quæ a ROEDERERO, præceptore meo summe venerando, cujus nomen, ob singularia sua non in me solum, sed in omnes litterarum amantes merita, semper mihi erit venerabile, pro investiganda veritate instituta sunt, quæque mihi nullum amplius dubium relinquunt, cum mihi tam felici esse contigerit, ut omnibus hisce experimentis interesse, paremque cum Præceptore eventum observare potuerim. Recepta nimirum obstetricantibus regula est, ut nato infante, placenta adhuc in utero hærente, funiculum ex parte matris eadem cautela ligent, qua id ex parte fœtus faciunt, & inter utrasque ligaturas perscindant. Recte putant præcaveri hac ratione hæmorrhagiam uteri ex funiculo metuendam, si vasis ejusdem immediata cum umbilicalibus communicatio esset: sed supervacanea erit eorum cautio, si contrarium obtinet. Id investigaturus, laudatus Præceptor omisit ligaturam ex parte matris, & sequentia observata sunt: Parca effluxit sanguinis copia, nullo cum impetu, fluxu post exiguum temporis spatium cessante, neque ulla unquam vera hæmorrhagia infecuta est, ita ut nunc de hac non amplius sollicitus, in omni partu deligationem istam omittat, & in prælectionibus etiam regulam, aliis commendatam, institutionibusque suis insertam, (i) talem esse prædicet, qua jure meritoque supersedere possimus. Ne vero quis objicere posset, a constrictis ab uteri orificio funiculi vasis hæmorrhagiam præpeditam fuisse, statum uteri eo tempore tactu sedulo exploravit Vir iste sagacissimus, & orificium invenit laxè solummodo funiculum ambiens, nec ullo modo comprimens, & vasa placentæ quam deinceps extraxerat, sanguine quasi vacua, ita ut nec alteri suspicioni locus remanserit, quæ a coagulo, in rescisso funiculi sine ab aëris accessu nato, desumi potest, ac si hoc ulteriori sanguinis effluvio obicem posuisset.

(i) *Elem. art. Obst. §. 310. no. 1. edit. 1a.*

posuisset. Hæc omnia ex ipsius propriis observationibus (k) fusius pernoscentia, satis superque anastomosi contradicunt, ut plura addere non opus sit.

§. VIII

Cum itaque ex hætenus dictis evidentissimum sit, nullum inter vasa rubra placenta & uteri interesse immediatum commercium, foetus autem nullo alio modo quam ab humoribus per funiculum a matre advenientibus nutriri possit, evictum esse credimus, villosam placenta ambitum, utero contiguum, per subtilissimos porulos, quæ rubro sanguini, transitum præcludant, ex materno sanguine, in uteri sinubus hærente, succum subtilissimum, eodem fere modo, quò chylum in intestinis confectum vasa lactea villosam eorundem tunicam perreptantes sugunt, resorbere, sanguinique foetus admiscere. (l)

§. IX.

Fœtum dixi nullo alio modo nutriri posse quam per funiculum; neque vero autores in hoc argumento consentiunt. Sunt, qui per os & funiculum simul, sunt etiam, qui per os tantum omne fœtui nutrimentum suppeditari persuasum habeant. Scilicet utriusque sententiaæ affectæ liquorem amnii, qui omne oui spatium fœtu vacuum replet, in cuius originem inquirere plagularum scopus vetat, nutritiaæ indolis esse & a fœtu ore assumi sentiunt. Sed satis iam in alienam segetem extravagatus absque ulteriori demonstratione, quam passim alii jamjam dederunt, (m) non dissimulo mihi, ponderatis omnibus

(k) *Exstant in Comment. Soc. Reg. Gotting. l. c.*

(l) *Celeb. F. HOFMANN l. c. §. 9. Abr. Vater. Diss. de utero gravido Thes. IV.*

(m) *Conf. Illust. HALLERI Comment. in BOERH. Prælect. acad. Tom.*

bus circumstantiis, eorum potius sententiam probabilem videri, qui omnem liquori amnii in nutriendo fœtu usum derogantes, his istum munis præpositum malunt, ut liberiorum fœtui motum conciliet, uteri sensibile corpus ab injuriis ab isto motu metuendis defendat, in partu denique vias pandat & lubricet. (n)

§. X.

De insigni partium, quæ uterum gravidum una cum fœtu replent, usu satis superque commentati sumus. Vocant has communiter nomine Secundas, quasi secundo partu, quando fœtus jamjam natus est, ex utero eliminari diceres. Quantacunque vero fœtui munera præstent, quibus ille, si rite valere in utero velit, carere nequeat, nato tamen nullo amplius commodo secundæ suffuturæ sunt, sed omnis earum vis, omne beneficium eodem momento perit, quo novus mundi incola hanc lucem ingreditur. Brevi quidem post partum temporis interjecta mora, exsiccatus ab umbilico funiculus sua sponte decideret, ut nullo artis subventuræ auxilio absolute opus esset; ast omnia fere animalia istud quod, si suæ sorti fœtus linquerentur, tardius paulo fieret, suo suorumque commodo citius expediunt, adeoque damno a gravitate & arditate harum partium fœtibus suis, si diutius affixa manerent, metuendo, naturali quodam instinctu ducti, prospiciunt.

§. XI.

Huic vero operi, quo a secundinis natos suos liberare student, omnia animalia prius a partu curas impendunt, una eademque

Tom. V. P. II. §. 682. not. z. p. 352. ROEDERER Diff. de fœtu perfecto §. 13. Ejusdemque nuperas Observat. med. de suffocatis passim.

(n) ROED. Elem. art. obst. §. 72.

que methodo utentes, quæ in præmorsione consistit. Soli homines, munditiei magis curiosi, a sordida operatione, quæ dentium morfu perficitur, abhorrent, & scindente potius instrumento pro eodem scopo utuntur. Addunt præterea aliam cautelam, a ceteris animalibus neglectam, ut ante quam funem perscindant, eundem prope umbilicum ligent, ne sanguis ex foetu per dissecta vasa possit effluere, natoque, dum nimium vitalis humoris perdit, eadem operatio, quæ pro salute ipsius instituitur, exitiosa evadere.

§ XII.

Scilicet cum (prouti supra §. i. vidimus,) insignia vasa, quæ in dicta operatione necessario perscindi debent, ex corpore foetus per funiculum exeant; vulnera vero vasorum majorum funestas semper hæmorrhagias comites habere notissimum sit, procul dubio a periculo, in aliorum vasorum vulneribus observato, ad horum quoque præmeditato consilio infligendorum vulnerum effectum argumentati sunt, credideruntque hæmorrhagiam ex hypothese metuendam, eadem qua in aliis vasorum vulneribus cum ægrotantium comodo utebantur methodo, id est deligatione, præpediendam esse. Potuit quoque hæmorrhagia per umbilicum non deligatum in recens natis aliquando notata, primos hujus operationis autores, in præconcepta opinione firmasse, ut neglectam funiculi vincturam tenello semper exitiosam putaverint, & pio in nepotes amore ducti, cautelam hanc deligationis, tanquam summe & absolute necessariam, ore scriptisque commendaverint, quæ, quasi ab Eva descendisset, pro vetustissima omnium operatione chirurgica habetur, & hodie adeo solennis est, ut vincturam negligere æque magnum crimen censeatur, ac necem infanti minari.

§. XIII.

Quamquam vero adeo omnibus usitata sit funiculi deligatio, ut ejus neglectus a plerisque medicis absolute lethalis habeatur, & fe-

minæ de infanticidio suspectæ nullare magis ut plurimum graventur, quam prætermisso funiculi vinculo; non defuere tamen nostris temporibus viri eruditione non incelebres, qui cautionem hanc non adeo necessariam, sed superfluum potius esse crediderunt. Fuit inter hos IO. HEN. SCHULZIUS Vir ingenii & eruditionis fama clarissimus, qui, postquam novam, de vasorum umbilicalium in nuper natis abolitione, hypothesein excogitaverat, (o) junctis argumentis ab analogia brutorum desumptis, vincituræ funiculi absolutam necessitatem primus inter omnes serio impugnare conatus est; (p) quam deinde sententiam alii quoque clari inter medicos viri arripuerunt, & inter Ictos causarum patroni sibi ita appropriarunt, ut ex SCHULZII auctoritate, quoties de neglectu vincituræ vasorum umbilicalium in casu infanticidii quæstio est, reos gravamine liberari debere sibi persuadeant, licet maxima celeberrimorum medicorum turba in contraria adhucdum opinione versetur.

§. XIV.

SCHULZIUM nova sua hypothesis potestimum eo duxit, ut ligaturæ necessitatem negaret. Fatendum enim est deligationis utilitatem in maturo foetu nullam fore, si geniculum istud, (q) cujus ope vasa foetus cum vasis placentæ in umbilico ex SCHULZII sententia connecterentur, re vera existeret, foetuque in lucem edito rumperetur, vasis dein ad origines suas sponte se retrahentibus & evanescentibus: cum autem neque ipse SCHULZIUS, neque alii pro sententia SCHULZII militantes medici, tale geniculum revera viderint, &

(o) *Diff. de Vasis umbilicalibus natorum & adultorum Halæ 1733. recussa Vol. V. Diff. Anat. select. ab Ill. HALLERO collect.*

(p) *Diff. An umbilicali deligatio in nuper natis absolute necessaria sit. Halæ 1733. recussa in Collect. HALLER Tom. V.*

(q) *Diff. an delig. fun. necess. §. 1.*

& omnes in universum celebriores anatomici, arterias umbilicales venamque cera repletas, ex funiculo in abdomen fœtus absque commissura continuas & ubique cylindricas, in adultis vero neque abollitas, neque retractas, sed coalitas & in ligamenta mutatas demonstrant; non mirum est quod totum systema labascat, fundamentis anatomicis falsis superstructum.

§. XV.

Quamquam vero geniculum illud SCHULZIANUM communi anatomicorum consensu proscriptum fit, non desunt tamen alia argumenta, quæ absolutam vincituræ necessitatem dubiam reddunt. Primo quidem provocat SCHULZIUS ad analogiam brutorum, quæ fœtibus suis, absque ligatura vel alio contra hæmorrhagiam præsidio, funiculum sine damno præmordent, cum tamen horum fœtus, simul ac in lucem editi sunt, pedibus plerumque jam insistant, quo situ sanguis suo pondere ad inferiores partes impellatur, quum recens nati homines, dorso incumbentes, adscensuro sanguini aliquam difficultatem objiciant. *r*) Addunt alii quod brevior brutis funiculus & minus quam hominibus tortuosus, hæmorrhagiæ periculum in istis animalibus augere videatur. *s*) At vero adversarii regerunt, lenta ista masticatione qua bruta hoc negotium absolunt, vasa umbilicalia comprimere, & crebris dentium impressionibus ita compillari, ut sanguis effluere nequeat, tandemque salivæ commixtione linctuque vulnus consolidari. *t*)

§. XVI.

Ut autem pateat utrum masticationis linctusve præsidio hæmorrhagia in istis animalibus præcaveatur, an causa potius in structura corporis

(*r*) *l. c.* §. 5. p. 11.

(*s*) HALL. *in not. ad* BOERH. *Prælect. Tem. V. P. II. §. 693. n. c.*

(*t*) *Conf. Cl. SCHULZE l. c. Ill. P. A. BOEHMERI Diss. de necessaria funiculi umbilicalis deligatione §. 27. p. 48,*

corporum lateat; sequens experimentum proferam. Canis gravida sex peperit catulos, quorum primo postquam totus cum secundis suis natus erat, funiculum forcice sine ligatura perscindere conatus sum, dimidii pollicis ab umbilico distantia. Nullum ante operationem pulsum in funiculo sentire poteram, neque hæmorrhagia secuta est, unica solummodo sanguinis guttula vulnus irrorabat. Aliis duobus funem pari modo dissecai, secundis adhuc in matre delitescen-
tibus, & funiculo vix ad dimidii pollicis spatium ex vulva propen-
dente, quos adeo neque lingua neque dentibus suis mater ante ope-
rationem tangere potuit; sed par fuit operationis eventus; nullus ante dissectionem pulsus tactui se obtulit, & ora solummodo vulne-
rum sanguine madida erant; quo digitis absterfo, ne guttula amplius
in conspectum prodiit. Reliquos tres catulos, in quorum funiculis
pulsus vestigium itidem nullum erat, matri reliqui, ut illos morfu
a secundinis liberaret, in quo opere diu detinebatur, ad decem fe-
re minuta prima in quolibet fune, non quidem ex naturæ instinctu,
ut vasa eo melius, ut vulgo credunt, compingeret, sed, ut mihi
saltem videtur, quod funiculi lubricitatem, & vasorum imprimis
tenacitatem, quæ tanta erat ut membranas funem cingentes dudum
ante vasa dilaceratas viderim, dentibus suis prius superare non potue-
rit; dilaceravit potius quam præmorfit funiculum, ore namque se-
cundinas tenens, pedibus foetum depellens. In his pariter ut in prio-
ribus cruentata vasorum ora conspiciebantur & in universum eodem
modo se omnia habebant, nisi quod relicta ab umbilico portio in his
ob masticationem conquassata penitus esset, & gelatina vacua, prius-
que exsiccata decideret; in illis vero forcice tractatis suum adhuc ro-
bur & rotunditatem, ob gelatinam intra cellulas adhuc detentam,
servaret, tardiusque exsiccaretur. Omnes vero catuli pari vivacita-
te gaudebant. Idem experimentum cum alio tempore repeterem,
catulo funem, arteriis debiliter adhuc pulsantibus, rescidi, sanguine
parca copia & absque saltu ex vulnere destillante, cessante autem
pulsu sua sponte cohibito. Hoc itaque experimento, quod quilibet
facile in aliis quoque animalibus reiterare poterit, admonemur, ut
in

in alias sublatis post partum sanguinis per umbilicalia vasa circuli, rationes inquiramus.

§. XVII.

Antequam vero ad causarum istarum examen transeamus, præmonendos esse lectores censemus, quod hic de arteriis potissimum nobis sermo sit, nemine facile de hæmorrhagia ex vena lethali cogitante, cum sanguinis motus in vena ab exterioribus ad interiora fiat, adeoque hæmorrhagia non nisi circulo naturali penitus inverso possit contingere. *u*) Difficile etiam non est explicare venæ umbilicalis spontaneum coalitum, cum nullum a partu, prouti ex supra dictis patet, sanguinem accipiat, adeoque nullo extensa liquido collabi, & lateribus suis, ut aliæ in corpore vivo sibi absque motu contiguæ partes solent, concreescere debeat.

§. XVIII.

Dilatatio arteriæ & luminis ex minori circulo in majorem mutatio pulsus vocatur, & ab impulsu novæ undæ sanguinis in elasticas arterias oritur. Intercipitur autem pulsus iste, quando obstaculum quoddam inter cor & arteriam quandam natum est, quo sanguinis ad eundem canale propulsio impeditur. In experimento supra citato vidimus, pulsum in arteriis umbilicalibus catulorum vel nullum, vel debilem saltem post partum superslitem fuisse, disquirendum nobis igitur est, quidnam in animalibus recens nati accidat, quo cordis in ista vasa actio sponte tollatur; & utrum felicitate tali humana quoque soboles gaudeat, an vero illa brutis tantum jure meritoque tribuenda sit?

§. XIX.

(*u*) SCHULZE *l. c.* §. 4. p. 10. *Ill.* BOEHMER *Diff.* cit. §. 23. p. 42.

§. XIX.

Primo quidem respirationis primordia observanda veniunt, quæ insignem quandam mutationem in toto sanguinis circulo pariunt. Scilicet quando foetus in utero hæret, pulmones, propter aeris absentiam alterno isto inspirationis & expirationis actu destituti, corpora sistunt collapsa, densa, & molis exiguæ, adeoque vasa horum viscerum compressa & complicata, sanguini alias transituro resistunt: Quando vero ex ergastulo suo egreditur foetus aeremque ducere incipit, tunc alia ipsi scena luditur. Inflati quippe ab irruente aere pulmones expanduntur, vasa explicantur, omnemque sanguineam massam, ex toto corpore per venas in cor dextrum reducem, per arteriam pulmonalem recipiunt, cum olim exiguo solummodo hujus fluidi rivulo transitum concederent, reliqua & quidem majori portione; eo tempore per alias vias ad aortam refluentem. Quo itaque transitus sanguinis per pulmones fit liberior, eo major redditur hujus liquidi ad hæc viscera determinatio, eoque minor evadit ejus ad aortam impetus. Porro thorax a partu pro recipiendo aere insigniter dilatatur, abdominis cavo in eadem proportione decrescente, quum diaphragma descendens hepar & reliqua abdominis contenta deprimat, qua de causa non viscera solum, sed omnia quoque abdominalia vasa comprimuntur, sanguinisque impulsui ad hæc loca jam imminuto insignis resistentia nascitur. (x)

§. XX.

Deinde quando directionem arteriarum umbilicalium accuratius examinamus, aliter illa in nascendo, aliter in nato ordinataprehenditur. Scilicet foetus in utero globuli ad instar convolutus jacet

(x) Conf. IO. ERIED. CASSEBOHM *Progr. de differentia foetus & adulti. Gen.* HALLERI *Comment. in BOERHAAVII Praelect.* §. 692. n. c.

cet, (*y*) qui situs arteriarum umbilicalium directioni ita favet, ut in linea quasi recta ex iliaca communi in umbilicum continuentur, reliquis iliacarum propaginibus oblique & ad angulum exeuntibus; unde sanguinis per umbilicales arterias liberior, per reliquas impedior evadit transitus. Fœtus vero utero exclusus in rectitudinem expanditur, quo fit, ut sanguis ex iliaca non ita expedite ut antea in umbilicalem impelli possit, quum hæc jam cum priori angulum valde acute retrogradum efficiat, (*z*) qui quidem in homine maxime insignis, imo tantus est, ut in experimento Generosissimi HALLERI, Præceptoris mei ad rogam usque colendi, cera per alteram arteriarum umbilicalium injecta crus utrumque repleverit, per alteram non redierit, plica, quam dicta flexura ad primam hujus arteriae originem formaverat, materiæ exitum denegante (*a*). Hac igitur pristini situs mutatione, sanguinis ad umbilicales arterias, nunc etiam inter abdominis viscera & masculos pressas, impulsioni tanta resistentia nascitur, ut vel plane nihil, vel parcissima solummodo copia istas angustias superare valeat. Sublato hac ratione æquilibrio inter impetum liquidi extendentem & vim vasorum contractilem, posteriore nunc prævalente, arteriæ umbilicales secundum omnes suas dimensiones contractæ sponte coeunt & occalescunt, sanguine, pristino meatu occluso, reliquos iliacæ ramos minus resistentes legente. Inde est quod partes genitales pedesque potissimum fœtui imperfectiores, insignia incrementa a partu capiant.

§. XXI.

(*y*) ROEDER. *Elem. art. obst.* §. 79. & *Icon. uteri humani*. Cf. etiam *Icon. quam dedit* NOORTWYK in *Hist. Ut. grav.* Tab. III.

(*z*) *Conf. Commerc. litt. Nor. an. 1733. hebdom. 48. p. 378.*

(*a*) HALLER, in *Comment. ad BOERH. l. c.*

§. XXI.

Dictis hactenus mutationibus aërem denique externum suam quoque symbolam conferre, non est quod dubitemus; dum pondere suo propulsioni resistat, qua humores versus exteriora propelluntur. Id enim cucurbitularum, suctionum, balneorumque tepidorum usus, & animalia sub antlia intumescencia docent, in eam partem corporis, a qua compressio aëris removetur, humores nostros vi magna ruere (b). Iam vero quum foetus in utero latens ab omni aëre libero seclusus sit, necesse est illum dicta propulsione facilitate gaudere, confirmante id succulento & tumidiusculo, quem in recens natis observamus, corporis habitu: Quando vero is nunc exitum minatur, aërisque pondus frigusque, cum reliquis mutationibus (§. 19. & 20.) sentire incipit, tunc cordis impulsus, omnibus hisce resistentiis uno simul momento sibi illatis nondum assuefactus, adeo infringitur, ut non ita expedite ut ante humores versus exteriora propellere valeat, inde humiditas in tota corpusculi superficie dissipatur, cutis & umbilici, vasorumque umbilicalium ad constrictionem jamjam nitentium strictura promovetur, & sanguis denique dictorum vasorum, quem cordis vis infracta movere nequit, sola quiete abit in coagulum, quod omnem reliquam cavitatem obturat.

§. XXII.

Atque hæc quidem in hominibus æque ac in brutis a partu accidunt, & ad explicandum istud intercepti pûsus in arteriis umbilicalibus phænomenon, quod in catulis supra tetigi & in humanis quoque foetibus deinceps recensetbitur sufficiunt; quibus si insitam istam, propriam & internam ad coalitum & transmutationem aptitudinem, qua vasa umbilicalia omnium in universum animalium gaude-

(b) *conf. Ill. HALLERI Comment. in BOERH. Præl. acad. T. II. §. 215. not. l.*

gaudere videntur, jungimus, non video quo jure homines ab ista spe naturalis præsidii, qua bruta animalia ratione umbilicalis negotii fruuntur, excludendi sint, cum similes causæ similem semper effectum producant, adeoque ex solo hoc fundamento eadem felicitas hominibus competat; quos, cum reliquis animalibus a sapientissimo rerum omnium conditore præcellentiores creati sint, minus internis præsidiis ad vitam servandam necessariis, ab eodem munitos fuisse vix credibile est.

§. XXIII.

Quando vasis umbilicalibus (in paragrapho præcedenti) propriam quandam & internam ad coalitum & transmutationem aptitudinem tribuimus, quæ partus tempore, determinantibus causis superius (§. 19. 20. 21.) allegatis in actum deducatur, neminem facile habebimus nostræ sententiæ refractorem, cui reliquarum partium in corpore animali sponte mutabilium historiam, in mentem revocare volude erit. Est enim hæc communis omnium partium solo temporario usui destinatarum lex & regula. ut, finito functionis suæ termino, vel mutantur vel aboliantur; id quod in adultis partium genitalium muliebrium, mammarumque imprimis & alia exempla docent, in fœtibus vero foramen ovale, ductus venosus & arteriosus, & quædam ex glandularum genere organa, quæ omnia absoluta functione sua sponte vel esse desinunt, vel tantas mutationes patiuntur, ut pristinis usibus non amplius sufficiant. Idem adeo de umbilicalibus vasis valere necesse est, cum corpora sint fœtus tantum usibus destinata, a partu inutilia, imo noxia futura, si cava manerent. (c)

§. XXIV.

(c) *Conf. Com. litt. Nor. 1733. hebdom. 49. p. 385.*

M m m

§. XXIV.

Sed satis puto conjecturis istis & argumentis ab analogia defunctis dimicatum est; experientiam potius consulamus, optimam omnis veritatis magistrum, videamusque an dictis hactenus commodis, quæ brutis nemo denegat, humanam quoque prolem natura donaverit. Celeberrimus SCHULZIUS duas observationes allegat, (*d*) in quarum utraque funiculus sine ligatura abscissus, nullam hæmorrhagiam comitem habuit. Exstant præterea in Commercio litterarum Norico, (*e*) Actis A. N. C. (*f*) ALBERTI jurisprudentia medica, (*g*) aliisque pluribus locis TREWII, ELLERI, KALTSCHMIDII, (*h*) ZELLERI, (*i*) aliorumque similes observationes, in quibus omnibus funis umbilicalis, vel casu vel præmeditato consilio, ommissa deligatione rescissus fuit, nullo inde vitæ periculo foetui insecuto, cum sanguinis vel plane nihil, vel parca solummodo portio effluerit.

§. XXV.

(*d*) *diff. cit.* §. 16. & 18.

(*e*) *a. 1733. hebdom. 41. it. a. 1735. hebdom. 51.*

(*f*) *E. N. C. Vol. II. obs. 50.*

(*g*) *Tom. III. cas. 13.*

(*h*) *in Progr. de intermissa funiculi umbilicalis post partum deligatione non absolute lethali Jenæ 1751.*

(*i*) *in Diff. Tübingæ 1692. habita, de vita humana ex fune pendente cap. II. obs. 3.*

§. XXV.

Omnes vero isti casus, a contrariæ sententiæ patronis, pro extraordinariis habentur, cum alias observationes, imo multo plures dari contendant, quæ funestum omissæ deligationis eventum testentur. Objici autem his posset, in brutis quoque aliquando hæmorrhagiam ex funiculo lethalem fieri, neque tamen inde quemquam ad absolutam necessitatem deligandi in illis animalibus funiculi concludere ZELLERUS (k) exemplum iale ex vacca refert, cui tamen generi animalium, observante eodem auctore, funiculus ut plurimum sua sponte & absque damno ex umbilico rumpitur. Rarissimi casus sunt omissæ deligationis humanorum funiculorum, si cum deligatis conferas, si vero, inter debitas cātelas, semper omitteretur, vix unicus forsan inter mille infantes inveniretur, noxam ab omissa funiculi deligatione perpeffus. Causa vero hæmorrhagiæ recens natis aliquando funestæ in eo ut plurimum latet, quod cito nimis humani fœtus a secundinis rescindantur, ante quam superius citatæ causæ in umbilicalia vasa agere, id est pulsum & humorum per ista vasa circulum tollere valeant. Brutis licet spissior sanguis & ad coagulum pronior, & vasa strictiora, & cutis strictior qua vasa comprimantur ab auctoribus quibusdam tribuatur, (l) & licet pulsus quorundam eodem fere momento quo fœtus e vulva prodit in funiculo pereat, ut in experimento nostro (§. 16.) vidimus, ista tamen animalia hoc præmorsionis negotium non prius aggrediuntur, quam cum totus fœtus cum secundinis suis jam enixus est, quem antequam

de

(k) *Diff. cit. cap. II. obs. 9.*

(l) *conf. Ill. BOEHMERI diff. cit. §. 27.*

de funiculo cogitent, lingua ubique lambunt, & a membranis aliisque sordibus liberant; funiculi vero lubricitas & vasorum tenacitas dentibus eorum adeo resistit, ut omnibus hisce laboribus horæ fere spatium vix sufficiat. Quis inde non agnoscit divini conditoris sapientiam, qui ita hæc, in salutem animalium ratione destitutorum & avertendi periculi nesciorum, ordinavit, ne citius præmorsum funem, antequam humorum commercium interceptum sit, lethalis sanguinis jactura sequatur: hominem vero ratione donavit, & ad discernenda hæc phænomena aptum reddidit; is adeo tantis non indiget ambagibus, sed refecare uno ictu forficis, etiam absque vinculo, eo memento potest, quo pulsum in funiculo sublatum, & vasa funiculi sanguine quasi vacua, & contracta paulum esse sensibus suis habebit cognitum, id quod paucis a partu minutis continget, prouti ex experimentis fide dignissimis didici.

§. XXVI.

Laudandus mihi hic iterum est Præceptor, ROEDERERUS, qui me præsentem & adjuvante complura experimenta circa hunc rem instituit, quæ ipse jamjam obiter in coronide elegantissimarum observationum de suffocatis (m) tetigit, dataque occasione, in ordinem redacta & ad exactissimam revocata calculum, cum publico communicare pollicitus est hæc vero est experimentorum summa: Quando post enixum foetum placenta absque mora extrahitur, tunc sanguinis circulum ex foetu in placentam & ex hac iterum in foetum adhuc integrum, ex pulsu ubique tangendo cognoscimus. Ast primo fere horæ minuto omnis in placenta humorum motus perit, quod iterum ex pulsu dignoscitur, qui in funiculo primum loco a placenta propior,

(m) *Observ. med. de suffocatis Saturz. p. 53.*

piori, deinde post aliquot minuta loco a placenta remotiori, & sic successive semper altius altiusque perit, & plane tandem, post pauca minuta, in omni funiculi, præter distantiam aliquot ab infante unciarum, tractu cessat, manifesto argumento impulsionem, quæ ex corde adveniens sanguinem ad umbilicalia vasa propellit, a causis supra dictis infractam, in tanta a corde distantia omnem paulatim viam amittere. Idem est experimenti eventus, quando placenta in utero relicta ad pulsum funiculi attenditur, ubi pariter illum paucis a partu minutis citius in aliis, in aliis tardius gradatim periisse observavimus. Raro vero pulsus post quadrante horæ, computatione a primo momento exitus corpusculi inita, in loco funiculi ab umbilico proximo superssitem fuisse memini, frequentius sexto circiter minuto omnis circulus jam sublatus erat. Quando nunc funiculus loco quodam ubi pulsus adhuc tangi potest resecatur, sanguis vi quadam, neque vero tanta, quanta in aliis arteriarum vulneribus solet, profilit, & infans tunc omnino vitam cum sanguine perdere potest: resectus vero eo in loco ubi pulsus jam desit, nullum omnino sanguinem fundit funiculus, ibique frigidus & rigidus vasa sistit angustissima, fere penitus contracta & vacua, ut si ad illud usque momentum, quo pulsus omnis in funiculo sublatus est, placenta foetui continua relinquatur, filo stringente non opus sit.

§. XXVII.

His itaque rite perpensis videmus deligationem funiculi operationem esse minime absolute necessariam, cum vasa sua sponte & absque vinculo coeant sed ideo solummodo suum sibi in arte obstetricia locum vindicasse, quod citius plerumque quam ubi humorum per umbilicalia vasa circulus cessavit, infantes recens nati a secundinis liberentur, quo tempore nondum omnis hæmorrhagiæ metus ponendus est. Quando vero sagax obstetrix, vel alius quidam homo partus tempore præsens, funiculum

non prius refecat, quam ubi de intercepto sanguinis per ejus vasa circulo constat, quod ex pulsus absentia dignoscitur, tunc nullum omnino foetui inde damnum metuendum erit, licet deligationis operatio negligatur.

§. XXVIII.

Ex dictis patet quid statuendum sit de iis infantibus, qui a personis suspectis clanculum editi & absque funiculi vinculo sepositi, judicium examini subjiciuntur. Clamant ut plurimum Medici, in elogiis suis, contra miscellam matrem, eamque ex solo vincituræ neglectu infanticidii ream denunciant, cum tamen frequenter, nisi aliud violentiæ signum in corporis externa vel interna superficie appareat, nec actu crimen commiserit, nec animum forsan habuerit in propria viscera sæviendi. Partus dirissimi cruciatus parturientes adeo labefactare solent & angere, ut prius de liberando a secundinis foetu, si solæ pariant, cogitare ut plurimum nequeant, quam ubi, omni secundinarum mole excreta, linquentem animum paululum revocaverint: Interea vero temporis omnis plerumque mutatio circuli sanguinis sæpius dicta in infante jam absoluta est, & nulla amplius deligationis urget necessitas, & potest vita foetus absque vinculo servari, nisi alia externa violentia, vel ipsa mors naturalis, ob causas internas, ex structura corporis præternaturali vel partus circumstantiis dignoscendas, oborta, vitam in limine furripiat. Ne vero nefandis patrocinari videar hominibus, negandum mihi non est, esse inter parturientes quasdam, quæ cito satis & absque nimia defatigatione pariunt, hasque, in partu solitario, foetus suos sola omnino vincituræ omissione interimere posse, si cito nimis funiculum & brevi relicta portione refecent; aut etiam si pedibus insistentes pariant, ipseque funiculus, solo corpusculi pondere tensus, prope umbilicum rumpatur, infante in terram procidente. Quo enim propius ab umbilico funiculus vel rumpitur vel refecatur, eo facilius hæ-

morrha-

morrhagia sequetur, cum tardius hic, citius prope placentam vasa stringantur, & sanguinis motus desinat, prouti ex antecedentibus didicimus.

§. XXIX.

Caute igitur procedendum est in examine corporis delicti, quando de vita hominis coram iudice agitur. Neque enim sufficit neglectus vineturæ, cum illa sub certis circumstantiis, ex nostra observatione, jure suo & absque infantis damno omitti possit; sed omnia potius cum iudicio, serioque examinanda sunt. Videndum an sugillationes forsan in corporis externa superficie simul adsint, quamquam & hæ non semper violentiæ a matre illatæ testes sint fide dignissimi, cum non raro partus diuturnioris difficiliorisve effectus esse observentur, præsertim tumor ille capitis, a capitis fœtus nimia mole, pelvis maternæ capacitatem excedente, quæ difficilioris partus species omnium frequentissima est, ortum trahens (n). Aperto vero thorace & abdomine, cavendo ne majora vasa lædantur, examinatis visceribus an palleant & exsanguia sint, an sanguine turgida, cor imprimis & vasa majora quæstionem nostram, an ex hæmorrhagia enectus infans fuerit, dilucidabunt (o). Quando enim viscera rubent, corque cum auriculis suis & vasis majoribus sanguine deprehenditur turgidum, manifeste id indicat infantem ex hæmorrhagia non periisse: quando contra viscera pallent, cor cum auriculis & vasis majoribus exsuccum & depletum est, tunc mortis ex hæmorrhagia-

(n) ROEDERER. *Obs. de suffocatis Satura passim.*

(o) *Conf. ROEDERER. de suffocatis p. 52. §. 15. no. 2. IOH. DAN. FARENHOLTZII sub Ill. HEISTERI Præsidio 1752. Helmstadii habita dissertatio de necessaria inspectione cordis vasorumque majorum sub legali infantum sectione. §. 8.*

morrhagia funiculi indubitatum id signum erit, si, quod probe notandum; aliud vulnus, ex quo sanguinis jactura fieri potuerit, non adest & reliqua signa vitæ post partum actæ, quæ brevitatis causa hic omittimus, simul respondeant.

DISSERTATIO INAUGURALIS MEDICA
DE
CAUSIS NECESSARIO
MORTEM IN PARTU INFERENTIBUS

QUAM
IN ACADEMIA GEORGIA AUGUSTA
DIVINIS AUSPICIIS
CONSENSU GRATIOSAE FACULTATIS MEDICAE

PRO
OBTINENDIS DOCTORIS MEDICI HONORIBUS

PUBLICE DEFENDET

BALTHASAR LAURENTIUS ZEIS

RAUSCHENBERGA HASSUS


D. XXIV. NOVEMBR. MDCCLVI.

SVAVISSIMO
ZEISIO SUO

S. P. D.

I. G. R.

Amabilem Medicinam vix haecenus dixisses, laborum memor, quos tulisti, nocturnum pervigilum, itinerum tenebricosorum putriumque squalorum: si virtute aliquid formosius, aliquid pulchrius, aliquid amabilius cognovisses. Haec quidem una omnium vox est; pauci licet in istarum laudum societatem venire enitantur. Cui vero magis, quam TIBI gratuler? cui id contingit magnitudine tum animi, tum etiam ingenii atque consilii. Id Virtutis atque dignitatis affecutus es, ut homines egros, & fortuna, quam vitare nemo potest, non culpa calamitosas parientes, conservare possis incolumes. Ipse saepe praesens expertus sum, quam praecleara sit ingenii TUI maturitas atque constantia. Secunda certe sperare poteris, quem adversa non terrent, unice securus. Fac valeas meque mutuo diligas. Scr. D. XXIV. NOVEMBRIS 1756.



DISSERTATIO INAUGURALIS MEDICA

D E

CAUSIS NECESSARIO MORTEM
IN PARTU INFERENTIBUS.

§. I.

Quæ sint Causæ Mortis Generales?

Moriendi necessitas in eo posita est, quod circuitus omnis fluidorum per vasa sanguifera, in nervis motus, & meatus aëris in pulmones intercipitur ita ut commercium inter penetralia capitis & cordis tollatur: quo fit, ut omnis mors ultimo vel Apoplexia vel syncopa vel suffocatione contingat. Hæc autem interceptio plures atque diversas agnoscit causas: ex quibus magis generales sunt, Dilaceratio canalium ad vitam necessariorum, ut in ictibus, vulneribus, contusionibus viscerum, cerebri, medullæ oblongatæ, cæt: Obstructio viarum, quæ circulum humorum sustinent: Effusio necessarii ad eundem finem liquoris: Virium tanta debilitas, quæ firmas partes movere fluidaque circumagere haud valeat. Obstructio mortifera fit ex. gr. a compressione, a concretis fluidorum, quæ polypi solent appellari, canales intercludentibus; a spasmodorum vehementia, in epilepsia, apoplexia, suffocatione simplici, vel in ea quæ catarrhum habet conjunctum, vel ab ea, quæ ab utero procedit; similibusque in morbis: in quorum multis effusio humoris simul evenire solet. Per profusionem humoris vitalis, vel etiam al-

terius, qui vasis æquilibrium præstat, mors accidit in hæmorrhagiis modum excedentibus, in vulnerationibus majorum vasorum, in emissione copiosa aquæ intercutis per paracentesin, cæt. Defectus virium motum vitalem sufflaminat in lipothymia, phthisi, marasmo, qualibet consumptione corporis tabida, cæt. Istarum vero causarum plures sæpe possunt & solent ad mortem inducendam simul concurrere.

§. II.

Quenam speciatim sint causæ Mortis in Partu?

In partu quæ Mors contingit, ejus occasionem dat foetus, & qui tot tantisque cum molestiis a matre enutritus & ad auræ vitalis usuram percipiendam productus est, eidem sæpe necem importet. Facit autem hoc foetus, quatenus per uterum, hospitium suum, atque vias partus, in vitam & valetudinem matris agere potest. Quapropter uterus cum partibus conjunctis, quæ ad foetum concipiendum, & ejiciendum faciunt, præcipuam præbent sedem affectionibus, ex quibus mors mulieris parturientis incidit: ita, ut hætenus quoque valeat, quod legitur in *Operibus HIPPOCRATIS (a)*. *Uterus mille miseriarum in muliere causa*. Possunt autem hæ partes male affici vel suo ipsarum aut foetus vitio, vel culpa rerum aliarum externarum aut hominum partum tractantium. Sic vitio partium ipsarum aut foetus, difficilis existere potest partus, adeoque vita matri eripi, si foetus aut ejus caput nimia mole laborat, quam ut foras prodire per vias naturales queat: Si pelvis, aut os uteri, vaginave nimis angusta vel a natura vel a morbis sunt: si foetus extra uterum hæret in tuba, in ovario, in abdomine: si is perversum situm tenet, qui partum fieri omnino prohibet: si foetus intus restat emortuus,

(a) in *Epistola ad Hippocratem*, Democrito tributa Tom. I. p. 283. editionis Linden.

tus, aut ejus caput, aut secundæ vel harum aliqua portio: si in universæ partus nimium diu durat: si spasmi uterini, & graviores justo dolores urgent, &c. Externa culpa, sive ut loqui amant, ex causis procatracticis vita parientis periclitatur, si pariendi labor omnino supprimitur: si partes genitales graviter vulnerantur ictu sclopeti, contusione, violentia tractationis vel instrumentorum cæt. Si medicamenta pellentia inconsulto adhibentur: si morbus gravior in partus tempus incidit, ut inflammatio uteri, hæmorrhagia uterina, ruptio uteri, gravis & maligna febris, convulsio, lipothymia, perversus infantis & uteri situs ab obstetrice illatus, cæt. Videamus, quæ ratione tales casus mortem inducant parturientibus, eos ad genera causarum in præcedente §. proposita reducendo: tum quoque circumspiciamus, an & quibus remediis ejusmodi funesti casus præverti vel curari queant.

§. III.

I. *Casus ubi fœtus in lucem prodire nequit propter malam partium conformationem aut loci errorem.*

Primo, quod attinet ad eos casus, qui ex vitio partium contingendo fœtui destinatarum, ipsiusve fœtus, accidunt; dictum est, evenire aliquando, ut infans aut ejus caput grandius sit, quam ut per apertam quoque viam ordinariam, quantumvis etiam diductam, excludi queat, præsertim si is monstrosus, aut geminus, aut hydrocephalo, vel aqua intercute distentus est, aut si pelvis mulieris justo angustior est. (b) Eodem redeunt casus, ubi os uteri vagi-

Nnn 3

næve

(b) *Vid. c. c. CHRISTOPH. VOELTERI Hebammen - Schule p. 112. edit Stuttgard 1722. 8. Momoires de l' Academie de Chirurgie Tom. I. p. 646. ROEDERERI Obsf. de partu laborioso Obsf. VIII. Epicr. 6.*

næve nimis arcta sunt: si propter pravum infantis in utero positum partus fieri nequit: si conceptio facta est in tuba Fallopiana, vel in ovario, vel abdomine; & variæ aliæ difficilis partus species. Quod si istiusmodi in casibus foetus omnino claustra perrumpere non possit, laboresque pariendi non intermittantur, non conquiescant; necesse est mulier mortem oppetat. Nam quia naturæ vires obstaculum, actionibus suis a ventris gestamine positum, ad quod removendum perpetuo exstimulantur, superare nequeunt; motus nimium intenti uterum vicinasque partes inflammant, febrem accendunt, quæ pereunt vires, ut tandem præ debilitate circuitus fluidorum deficiat: aut sanguis, qui per utrum perrumpere non potest, copiosius ac vehementius urgetur in caput, cerebroque oppresso, viisque spirituum interclusis soporem inducit vel apoplexiam creat: aut in convulsionem abeunt irritamenta, & spasticis motibus cor & cerebrum pervertuntur occludunturque. Sic mulier apud EPIPHANIUM FERDINANDUM (c), quæ eadem primipara fuit, ex partu gemellorum, in quo per tres dies laboraverat, mortua est febre viriumque lapsu. GUERNIER ROLFINCIUS (d) refert, parturientem inter gravissimos dolores epileptico paroxysmo per quatuor horas exagitata exspirasse, sed tertio post die duos ex mortua foetus prodiisse, deprehensum esse. Primiparam quoque morientem habet, ejusque difficultatis causas exponit FORESTUS. (e) Obesæ feminæ mortem in partu describit GEORG. HIERONYMUS WELSCHIUS, (f) irritis laboribus in de-

(c) in *Centum historiis Medicis Hist. pag. 344.*

(d) in *Dissertationibus Anatomicis Lib. VI. Cap. 33. pag. 1195.*

(e) *Observationum & Curationum Libro 28. Obs. 72. confer. 10. STORCH von Weiberkrankheiten V. Band. p. 171. seqq.*

(f) *Curationum propriarum & Consiliorum Decade VIII. Curat. 2. Conf. THOM. BARTHOLINI Historiarum Anatomicarum & Medicar. Centur. V. Hist. 47.*

defatigationem & soporem abeuntibus. Apud GUIL. FABRICIUM HILDANUM (g) existat exemplum parturientis ex prostratione viri-um post acerbissimos dolores motusque foetus vehementissimos & ve-nas hepatis & ossis sacri ruptas mortuæ, partusque impediti causa inventa fuit uteri scirrhus.

§. IV.

Quibus conditionibus mater cum intus retento foetu vita durare possit, quibus non?

Nonnunquam quidem contingit, ut foetus intus retineatur & per longum temporis intervallum, adeoque integrum vitæ spacium, a matre circumgestetur absque morte inde consequenter. (b) Ve-rum, non aliter hoc fieri potest, quam foetu intra suas membranas adhuc concluso, locisque, quibus accrevit, firmiter hærente, ubi postea durefcit, pariendique moliminibus requiescentibus. Nam, si tunicis ruptis homores effunduntur, putredine nata non potest non vita matris pessumdari, quemadmodum posthac palam fiet. Pariter, si stimuli doloresque partus continuant, nec tamen partus absolvi potest; vires puerperæ cum vita tandem succumbant necesse est, si-cut ante dixi.

§. V.

(g) *Observationum Chirurgic. Centur. III. Obs. 57.*

(b) vid. *Memoires de l'Academie de Chirurgie Tom. 2. pag. 324. seqq. Conf. LAUR. STRAUSSII Resolutio Casus Mussipon-tani. Memoir. de l'acad Royale des Sciences A. 1748. p. 105. seqq. ROEDERERI elementa art. obstet, Cap. XXV. §. 780.*

§. V.

Quibus modis fœtui exitus parari, matrisque mors averti possit, & primum si via naturalis amplior reddi potest.

Quum igitur in his casibus mortis necessitas vnice ex eo pendeat, quod infans hospitium suum relinquere nequit: omni opemittendum est, si matris vitam servare velimus, ut fœtus sive vivus sive mortuus ejiciatur absque gravi periculo matris. Duplex autem via est, per quam ad illum scopum medicus pervenire potest: vel enim ejusmodi status adest, ut naturalis & ordinarius transitus ampliari, vel fœtus minui queat, & tum fœtus per eum excuti: vel fœtus extra vias naturales hæret, & loca muliebria ita constituta sunt, ut nec fœtus per ordinarium iter protrahi possit, & partes genitales satis diducere plane non liceat ad transmittendum infantem, sed alius exitus quærendus sit. Prior casus existit, ubi matrix aut vagina membranis tumoribusve vel integre vel magnam partem occlusæ sunt: ubi eadem post acceptum vulnus, dilacerationem in partu, funilesve læsiones, magnam partem coaluerunt: ubi partes carnosæ vel membranaceæ, nimis duræ, strictæ, tumefactæ sunt, ut cedere satis nolint; ubi ossæ pelvis aperturæ nimis sunt arctæ, cæt. Hic, quæ præter naturam concreverunt, recedenda sunt, quæ inter se glutinata, separanda: quo nec in ipso partus tempore omittendum erit, quanquam longe melius est, si jam ante factum fuerit. Si partes molles ob tumorem inflationemve vel adstrictionem nimis resistunt dilatationi; fomentis, inunctionibus, injectis relaxantibus adhibitis multum sæpe efficere licebit, ut sine gravi dolore satis diduci queant. Etiam pro majore fœtus mole transmittenda spatium ordinario majus quandoque esse, compertum est, siquidem ipsis natibus duplicata membra, monstraque pluribus artus capitibusve donata protrahi

protrahi possunt, *i*) modo spasmi graviores abfuerint, justumque & aptum tempus observetur. Ossa autem, quæ pelvim formant, in laborioso partu, sine matris periculo, a se invicem abscedere, quo transeunti foetui locum faciant valde dubitandum *k*).

§. VI.

Secundo, si viam naturalem superare plane non licet.

Ast aliquando per naturales vias exitus plane negatus est, eademque referari sine gravissimo periculo nequeunt: ut, si insuperabilis adest angustia genitalium, si nimis compressa pelvis est, si interius uteri ostium callosum, aut exostosi scirrhone duratum est, foetus extra uterum situs est in tuba, in abdomine, cæt. Si matrix per herniam extra locum suum excessit, nec repelli potest cæt. Ita VOLTERUS (*l*) refert, in muliere quadam ossa pelvis tam angusta fuisse, ut non nisi unum digitum transierint, quamobrem, inter irritos pariendi labores extincta est. CHRIST. VATERVS (*m*) proponit casum mulieris, cujus vagina post ulcus tota callosa facta erat, ita ut tantummodo foramen pisi magnitudine remanserit. THOMAS SIMSONIUS

(*i*) vid. ROEDERERI *Observationes de partu laborioso, nuper per editæ Obs. V. pag. 18.*

(*k*) cf. excell. ROEDERERI *Elementa artis obstetr. Cap. I. §. §. 14. /qq.*

(*l*) *Lib. allegato, Parte 2. Cap. I. pag. 112.*

(*m*) in *Diff. de Partu Cesareo ex observatione* GODOFREDI DE LANKISCH, *quæ eadem exstat in Actis Erudit. Lips. a. 1693. p. 229. seq.*

SIMSONIUS *n*) callosam deprehendit in parturiēte uteri cervicem, quam quum dissecuisset, mulier post 24. horarum intervallum examinata est. Hernias uteri memorabiles observarunt SENNERTUS, *o*) & FABRICIUS HILDANUS, *p*) in tali rerum statu nulla datur alia ad matrem liberandam via, quam Sectio, quæ dicitur, Cæsarea, qua & matrem & infantem sæpe servatum esse, satis exemplorum documentis demonstratum est.

§. VII.

II. *Casus, si partus absolvi nequit propter Paragomphosin.*

Frequenter accidit, ut propter eum infantis in genitalibus matris positum, qui Paragomphosis vocatur, partus fieri nequeat, & nisi imminui vel loco dimoveri possit, aut alia via protrahi, tam matri quam infanti moriendum sit. Huc etiam spectat, si caput foetus humerique finibus & ossibus pelvis ac vaginæ firmiter impacti hærent, ita ut alter humerus ossi pubis affixus sit; alter ossi sacro; adeo ut sæpe nulla ratione loco moveri queat. Causa mali tum in magnitudine capitis quærenda est, tum in obliquitate matricis. Dum vero sic hærent partes, premunt atque irritant uterum cum suis vasis fibrisque ac nervis, unde spastica ejus nascitur constrictio, qua cuneo quasi adigitur infans, ut neque ulterius promoveri, neque in uterum retropelli possit. Crescentibus sic spasimis, & sanguine ma-
gis

(*n*) in *Medical Essays of a Society at Edinburge Vol. III. Observ. 19. p. 315.*

(*o*) *Practica Libro IV. Parte I. Sect. 2. Cap. XVI.*

(*p*) in *Operibus pag. 893 - 916.*

(*q*) *Confr. ROEDERERI Elementa art. obstetr. Cap. XVII. Sect. I. §. 400, seqq.*

gis magisque accumulato, parturiens aut ex inflammatione & in-
sequente gangræna matricis, aut convulsionibus, aut defectione vi-
rium exstinguitur, accedente præsertim quoque morte putredineque
fœtus. (q)

§. VIII

Quomodo huic malo succurrendum sit?

In hoc periculo, si nullo modo positum infantis emendare eun-
demve vivum extrahere licet, aut embryulus sero nimis advocatus
fuerit, quum jam insuperabilis adest paragomphosis; primo quidem
tentandum an relaxantibus, venæ sectione, clysmatibus cæt. con-
strictio tolli, fœtusque in aptum situm reduci, aut protrahi possit.
Quodsi his nihil effectum sit; nullum aliud suppedit auxilium quo
mater servetur quam ut aut fœtus ferramentis ejiciatur, aut per Cæ-
sareum partum extrahatur. Et sectione quidem ventris eximere fœ-
tum forsan convenit, si is adhuc vivit, & mater ferendæ huic chi-
rurgiæ/suffectura videatur: sic enim utriusque vita, tum matris tum
infantis, in tuto collocari poterit. Contra ea, si fœtum jam emor-
tuum esse, certe sint indicia, aut saltem verisimillima suspicio: vel
si mulier viribus exhausta sustinere sectionem ventris nequeat; actu
tum violenta manus admovenda fœtui, isque ferramentis evellendus
erit. Neutrum tamen fieri decet, ubi post plurium dierum afflictio-
nem jam moribunda femina pulsus exhibet febrilem, inæqualem
& intermittentem, sopore opprimitur, abdomen ostendit tumefa-
ctum cæt. Nam quum in tali rerum statu mulier sub ipso cultri
aut instrumentorum usu animam redditura sit; vulgus in eam veni-
ret opinionem, medentis opera mortem fuisse properatam: id quod
utique cavendum est. (r)

§. IX.

(r) cf. ROEDERERI *Obs. de partu laborioso Obs. XX.*

§. IX.

III. *Casus, mors ex nimis partus doloribus.*

Potest quoque mors puerperam prehendere, si dolores parienti modum nimis excedant, ab impedimentis partui positis nati; cuius rei exempla jam supra §. III. ex FABRICIO HILDANO & ROLFINCIO allata sunt. Omnis autem dolor nimis vehemens & immanis tandem abit in distentionem nervorum, qua tum plerumque adhuc magis impeditur partus, spasmis motus naturales pervertentibus, vias obferantibus, & foetum in malum situm compingentibus; unde aegrotantes convulsæ, compressis obstructisve cerebri vasis, ex apoplexiâ moriuntur.

§. X.

Quomodo his malis occurrendum sit?

Si unquam alias, in hac certe dolorum immanitate, quæ tantas turbas excitat, partumque magis supprimit quam promovet, conveniunt anodyna, mites clysteres, & potissimum præsentaneæ virtutis opiata, quod quidem periculum in omni mora est: Hæc dolores sedant, spasmos consopiant, turbulentosque motus ad quietem componunt; quo facto partus sæpe feliciter succedit. Et quantum pacatus motuum status ad partum absolvendum conferat, argumento est, quod in somno etiam bene pepererunt mulieres, sicut demonstrat Celeb. & Ill. HEISTERI *Diff. de Partu mirabili fetus vivi in somno matris profundo*: & Ill. WERLHOFIUS (s) scribit, se nosse feminam, quæ in ipso sopore, post administratam largam venæsectionem & admotas cantharides, peperit infantem: adeoque, postquam

(s) in *Observationibus de febribus Sect. 1. §. V. fin.*

quam obita morte motus omnes paulatim defecerunt, tamen persepe fœtus, sive vivi sive mortui, per vias antea constrictas ad exitum promoti sunt. (t) Præstat autem, talia sopientia in vino suave fragrante vel aquis vinosis similibus exhiberi, quæ nimirum tum ipsa sub blando sulphure volatili motus placant, tum vires dejectas refocillant. Simul considerandum, an sanguinis copia missionem sui postulet: quæ si convenit, ante usum reliquorum erit celebranda.

§. XI.

IV. *Casus, si partus nimium diu durat.*

Aliquando mors inde venit in puerpera, quod pariendi labor nimis diu perseverat: id quod fieri solet vel ob ineptam parturientis tractationem a rudioribus obstetricibus aut embryulcis: vel propter ipsarum ægrarum errores, quibus pervertuntur recta naturæ molimina: vel ob infirmitatem puerperæ: vel ob conjunctum praviu infantis situm, aliasve difficilis partus causas. Quæ tum mors obrepit, ea debilitatem virium exhaustarum consequitur, & ad Synopen referenda videtur. Auxilium in tali statu primum a perita manu obstetricante sperandum erit, qua quantocitius infanti via paretur, partusque absolvatur: tum a recreatione virium.

§. XII.

(t) *Exemplorum abunde videri licet apud CHRISTIAN. VATERUM in Diff. de partu hominis post mortem matris, in Directorio Medici-Practico. p. 350. MARCELL. DONATUM de Historia Medica Mirab. Lib. VII. Cap. 9. Ephemer. Naturæ Curios. Dec. 3. anno 3. Obs. 218. & anno 7. append. pag. 77. Breslauische Versuche 4. Vers. p. 1191. 19. Vers. p. 314, Hægendorn Observ. & Hist. Centur. 3. Obs. 13. &c. Pertinet huc quoque relatio ROLFINCII supra §. III. proposita.*

§ XII.

V. Casus, si foetus intus Mortuus est.

Ubi foetus intus restat emortuus, hic matrem quoque sua calamitate implicare solet, & lucis usura privare, nisi celeriter abstrahatur. Ex observatione FELICIS PLATERI (u) puerpera, conatibus pariendi omnibus cessantibus, foetum retinuit emortuum: posthæc pellentibus adhibitis, consecuto uterino fluore, putris, alba, foetidissimaque materia per octo hebdomadum spacium profluxit, accedente interim febre, corporeque adeo contabescente, ut nihil ferme carnosum retineret, abdomine tantum valde in transversum protuberante duroque donec post viginti hebdomadum intervallum a termino partus exspiraret. GREG. HORSTIO narrante (x) mulieri cui-dam ob foetum intus in utero mortuum acciderunt pallor faciei squa-lidus, anhelitus graviter olens, assiduus ardor stomachi frequentia animi deliquia, capitis & oculorum dolores, etiam epilepticæ convulsiones, attamen leviores, una cum ventris mole crescente, cæt. posthæc emortuus quidem foetus medicamentis abactus est, sed femina post aliquot hebdomadas apoplexia leviori tacta fuit, in paraly-sin dextri lateris abeunte: a qua licet utcunque restituta, tamen insequente anno, apoplexia nervorumque distentionibus reversis ex-stincta fuit.

§. XIII.

Ratio mortis inde consequentis, & Remedia.

Collatis his phænomenis patescere videtur, emortuum in ute-ro foetum propterea vitæ matris funestum fieri, quia, præterquam quod

(u) *Observationum Lib. I. pag. 211. seqq. edit. prima anno 1614. pag. 215. seqq. edit. 3. a. 1680.*

(x) *Observationum Lib. V. Obs. 37.*

quod ab intercepto partu natura affligitur, imprimis etiam a putredine fœtus & secundarum concepta sanguis & humores matris inficiuntur, & inducta febre vitales vires prosteruntur, ut tandem integre deficient, motusque vitæ perpetuandæ necessarios destituant, quanquam in horum extremis conatibus etiam leves convulsiones oriantur. Quibus malis arcendis quid opus facto sit, non poterit obscurum esse: excutiendus enim ante omnia fœtus est: simul analeptica acidula, putredini opposita, propinanda; si spes adhuc superest, ægram evasuram esse.

§. XIV.

VI. *Casus, si quid eorum, quæ cum partu excerni debent, in utero restat.*

Non absimilis est conditio, ubi quid eorum, quæ cum fœtu connexa sunt, aut ejus partem constituunt, intus remanet: ut caput avulsum, (y) hoc enim premit segmentum uteri inferius, unde inflammatio oritur, quæ in putredinem & gangrænam abit; secundæ, aut earum portio quædam, molæ, grumi sanguinis, &c. HENRICUS SMETIUS (z) refert, filiam suam, exclusa puella posteaque duabus molis, propter ingens animi deliquium, ex copioso sanguinis profluvio natum, retinuisse secundas, & statim subsidente ac corrugato utero, deinde eas expellere non potuisse. Quo factum est, ut febribus variis cephalægiis, inquietudine, corporisque jactatione, vigiliis, vehementer fracta fuerit. Et licet compluribus uteretur remediis, & aliquot chorii frustra, manu obstetricis educta, forcepeque comprehensa, protrahere tentaretur, tamen irritis omnibus, quum etiam ob dolorem puerperæ intolerabilem a chi-

(y) vid. ROEDERERI *Elementa art. obst. Cap. XXII. §. 705.*

(z) in *Miscellaneis Libro X. pag. 575.*

rurgia absistere oporteret, tamen tertia post partum hebdomade nondum exacta, animam exhalavit. Ex hoc & similibus exemplis aliis apparet, mortis, quæ a talibus retentis inducitur, rationem iisdem contineri causis, quibus in præcedenti casu, scilicet infantis intus mortui, interitus adscribendus est.

§. XV.

Quomodo in his malis succurrendum, præsertim retentis secundis.

Ut vero tale fatum avertatur, nihil magis conferre videtur, quam id, quod intus relictum est, quamprimum ejicere. Et caput abruptum si adhuc hæret in utero, sine mora protrahi debere, secundum methodum ROEDERERI in *Element. Cap. XXII. §. 708. seqq.* præscriptam, nullum dubium est. Verum de Secundis, & nonnullis aliis, incidere possunt casus, ubi dubitandi locus datur, utrum ea evellere consultum sit, an relinquere & vel naturæ negotium permittere, vel commodius expectare tempus. Nam si secundæ paulo firmitus adhæserint, eas protrahendo matrix ipsa provolvi potest, vel digitis intempestive insertis solvendo violari, & sanguinis fluxus, inflammatio, ulcus, convulsiones aliaque gravia mala concitari, uti triste hujus generis exemplum in ROEDERERI *Observationibus de partu laborioso* nuper editis. *Obs. VI. p. 20.* legi meretur. Contra, si mora neccitur in educendis ejusmodi residuis; deinde aut contracto utero non amplius licet in eum pervenire ad ista eximenda, quæ tum postea plurimum damni creare poterunt: aut propter eadem relictæ, matrix omnino prohibetur, ne sese contrahere queat, tumque sanguinis cursus immoderatus sequitur, qui mortem afferre possit. In hac ambiguitate consilium, ut dicitur, ex arena capiendum erit: Itaque, si gravis hæmorrhagia præsens est, quum ea compesci nequeat, nisi ejectis quæ intus restant, hæc actutum oportebit, quam lenissime fieri poterit, eximere. Si quoque secundæ
leveni

levem tractationem facile sequantur, optimum videtur eas statim educere, muliere resupinato, quia sic non ita facile matricis procidentia metuenda est. E contrario, si validius inhæserint, nec quid graviorum symptomatum ab earum retardatione proveniat; præstabit paululum moræ concedere, donec ab utero se contrahente sponte secedant, sicut sæpenumero consuevit. (a) In nosocomio hic optime instituto hocce experimentum toties repetitur, quoties mora quædam in placentæ solutione intercedit; quodque imprimis optime ibidem decurrit, quando puerpera semihora post partum in cubiculo aliquoties incedit & ambulat, ubi doloribus supervenientibus uterus se contrahit, & placentam sine ullo alio auxilio expellit.

§. XVI.

VII. *Casus, ubi substantia uteri dilaceratur.*

Vulnerationes partium continendo transmittendoque foetui dicatarum ita graves, ut perruptis vasis fibrisque, ipsaque uteri substantia, aut cruor effusus intus restagnet, aut foras prorumpat, & fibræ potentiam rite movendi humores amittant, sæpenumero vitæ matris funestæ fiunt. In illa partus specie, ubi situs uteri peccare solet, hoc ut plurimum accidit. Capitis enim pondere, uterus comprimitur, inflammatur, una cum matre emoritur, vel in pus resolvitur, foetusque per abscessum exitum molitur. Hæc quoque symptomata reperiuntur, ubi nulla dolorum ad partum remissio, locum habet, caput

(a) vid. HEISTERI *Instit. Chirurg. P. II. Sect. V. Cap. CLV.*

(b) STORCH *von Weiber - Krankheiten IV. Band, 2. Theil pag. 92.*

caput apprimitur utero; hujus substantia attenuatur & tandem dirumpitur. Morbi insuper uteri locales, præsertim ulcera illa inveterata, tanquam metastases morborum cum imperfecta crisi decurentium multum ad hanc uteri disruptionem afferre possunt. Memorabilis ille casus quem ROEDERER in *Observat. de partu laborioso* Obs. VIII. pag. 28. proponit, hoc optime illustrat. Ejusmodi enim ulcera pus suum propter dolores & contractiones tempore partus emittunt, quod matricis substantiam erodit & exedit. His in casibus nulla fere, nisi in operatione cæsarea spes aliqua superest, & certa mors insequitur matris, quoties auxilium differtur, ut pars disrupta a sphacelo corrumpi possit.

§. XVII.

VIII. *Casus, si puerpera ipsa pariendi laborem suppressit.*

II. Converto me ad eos casus, ubi propter externam culpam mors puerperæ contigit, id est, ubi non genitales partes mulieris, nec foetus cum suis appendicibus, per se peccant, sed causæ, quæ vocantur præternaturales, & quæ extra has partes existunt, accedunt ad pariendi negotium, illudque ita pervertunt, ut in mortem præcipitetur parturiens. Ex his sunt primo peccata ipsarum puerperarum: ut, si partum cohibeant, & infanti renuant exitum concedere, naturæque conatibus resistentes, eos obstinato animo reprimere conitantur. Quod quanquam vix credibile videatur in genitrice, partim, quatenus foetum suum tanto cum affectu concepit, fovit, ex sese aluit, & ad hunc plenæ vitæ ingressum perduxit: partim, quatenus plurimis gravibusque cum molestiis gestatio foetus conjuncta est, adeo ut tam propter amorem infantis, quam ad graviditatis onus amovendum, partus exoptantus sit; tamen aliquando rarum ejusmodi exemplum observatum est. Ita narrat VITVS RIEDLINUS

LINUS (c) puerperam in flore juventutis constitutam a matre, obstetrice, sacerdote, Medico nullo pacto, sive precibus seu blandis admonitionibus seu minis, eo promoveri potuisse ut pariendi molimen adjuvaret, vel saltem exitum foetui concederet, sed doloribus vehementer urgentibus præfracte obnixam fuisse, quos eundem ploratu, ejulatibusque obliterare tentavit, ac femora tam fortiter ad se invicem adduxisse, ut nullo modo dimoveri potuerint: quumque sic per aliquot horarum, spatium infantem, qui vitam suam validissimis motibus satis proderet, partu prohibuisset, tantem convulsiones accedentes tum ipsam tum fructum exstinxisse. IDEM alio loco (d) refert, in artificis cujusdam uxore, postquam priore partu bene perfuncta erat, in altero, quum dolores per integrum biduum, spretis blanditiis pariter ac severioribus verbis, suppressere contendisset, gestibusque oppositis impedivisset, etiam supervenisse convulsiones, a quibus tamen, quum tandem monitis & medicinæ dedisset locum, simul cum partu liberata fuit.

§. XVIII.

Quæ Remedia hic locum habere possint?

Qua ratione nervorum distentiones, quibus hujusmodi mulieres pereunt, interitum afferant, jam supra significatum est. Quibus autem remediis utendum sit, haud ita expeditum est, quandoquidem ipsa puerpera nitatur contra, & si vi adhibita cogeretur ad pedes diducendos, manum embryulci vel obstetricis admittendam, &c. eo magis metuendum foret, ne in convulsiones rueret, ac foetum una secum perderet. Optimum fuerit, placito probabili-
que sermone sensim lenire componereque perturbatum animum, si
ullo

(c) in *Lineis Medicis* anni 1695. p. 448.(d) *Lin. Med.* Anno 1698. p. 221 seqq.

nullo pacto fieri poterit, quo tum absolvendo partui sese morigeram præbeat. (e). Aut leni Anodyno cum suavibus confortantibus sociato dolores & motus efferatioris complacandi, animusque ad quietem reducendus erit, quo partim dissentio nervorum avertatur, adeoque curetur, partim reliquis ad partum peragendum necessariis via paretur, præsertim quum paccatis motibus partum sæpe longe felicius succedere compertum sit.

§. XIX.

X. *Casus, violationes genitalium graviores.*

De ejusmodi violentiis, quæ extra partus tempus incidunt, nunc non loquor: ut, si mulier gravida cadat in ventrem, si plagam aut ictum accipiat, si bombardæ vel sclopeto percutiatur, & sic porro. Ego vero de iis tantum ago violationibus, quæ vel pariendi negotium ipsum cum pernicië præcipitant, vel inter pariendum accidunt: ut, si obstetrix aut embryulcus ventrem mulieris durius trudent pulsantve: si nimiam vim adhibent & cruciatus creant in embryulciæ administratione: si manibus aut feramentis lacerant uterum: si secundas fortius, quam decet, evellunt: si nimium & intempestive pariendi labor urgetur: si medicamenta pellentia perperam præbentur; & quæ sunt similia. Mors, quæ tales læsiones sequitur, quatenus profusionem nimiam vitalis humoris agnoscit causam, in syncope consistit: quatenus ejusdem in disruptis contusisque vasis restagnationem, corruptione putrida sive gangræna cum suis consequentibus, contingit.

§. XX.

(e) *Consilium Mr. DE LA MOTTE dans son Traite complet des accouchemens Lib. VI. Chap. VII. p. 575. hic quoque locum habet.*

§. XX.

In quibus remediis hic spes aliqua supersit?

Desperata plerumque res est, cum ejusmodi violationibus, & in hæmorrhagia vehementi solet brevi vita deficere, neque in gangræna diu durare. Celeri itaque & prompto remedio opus est in cursu sanguinis ad eum compescendum, si fieri potest: quem ad finem ante omnia fœtus, aut secundæ, aut coactus sanguis, similiaque, si intus sunt, eximenda: tum sistentia interna externaque præbenda, non neglecto regimine conveniente. Quodsi dirupta matrice fœtus in cavum ventrem protrusus sit, nec retrahi possit; non aliud suppetit auxilium, quam cæsarea sectio, uti jam dictum: Nam & ad humores, qui vasis elapsi sunt, expurgandos uterumque sanandum opus est, ut abdomen aperiatur: & nisi hoc fiat, cum infans qui per naturalem viam educi nequit, exstinguitur, tum mater, quæ nimirum cum utero rupto & fœtu extra hunc propulso liquoribusque suis effusis computrescente, vivere non potest. Inflammatio denique & gangræna discutientibus & antisepticis internis externisque tractanda erit: Etenim hoc in casu, ubi gangræna latius, quam per solum uterum proserpere consuevit, temerarium foret consilium excindendi uterum, quod alias nonnunquam in utero corrupto vitam servavit. (f)

§. XXI.

X. *Casus ubi fœtus ab obstetrice in perversum compellitur situm, ut partus absolvi nequeat.*

Pariter accidit, ut ejusmodi rudioribus obstetricum tractationibus

(f) vid. GE. FRANCK DE FRANCKENAU *Satyra medica* 2. Nota 4. 5. FEL. PLATERUS *in Observationibus Libro III. p. 718. edit. a. 1614.*

bus infans in perversum redigatur situm, qui partum plane impedi-
diat, adeoque efficiat, ut mater ex difficultate pariendi mortem op-
petat. De quo mortis genere quum jam supra §. XI. quatenus ex
pluribus etiam aliis causis oritur, actum sit, hic nihil addere neces-
se est.

§. XXII.

XI. *Casus, si funesti morbi mulierem tempore partus
prehenderint.*

Denique morbi quidam, in partus tempus incidentes, puerpe-
ræ funesti esse solent: ut inflammatio & hæmorrhagia uteri, gravis
& maligna febris, convulsio, lypothymia cæt. Gravida quæ-
dam, ut referunt *Acta Medicorum Berolinensium* (g) vehemente
paroxysmo febrili correpta, sub ipso quidem horrore fœtum edidit
octimesrem: at cœstu febris perseverante, viribus admodum prostra-
tis, accedentibus postremo nervorum distentionibus sequente die
morta est. Memorabilem exponit casum IOH. NIC. PECHLINUS (h)
mulieris in ipso pariendi labore suffocatione uteri convulsiva pereun-
tis: Mulier erat annorum duorum & viginti, quadrato & obeso
corpore: hæc ut est gravidarum appetitus ad noxia propensus, cru-
dis austerisque fructibus oppleverat, sobriam diætã semper exosã.
Accidit autem, ut proxime ante partum cum marito contentione
maxima altercassetur. Vix hæc erant acta, quum partus dolores, cum-
que iis occulta dudum vitiosorum humorum saburra, erumpere cœ-
perunt. Duraverant aliquamdiu dolores, sed sine effectu, interci-
piente

(g) *Volumine IV. p. 70.*

h in *Observationum Physico-Medicorum Lib. Obs. 30. p. 69.*
1699.

piente respirationem flatuum copia, quam nec clysteres neque alia diminuerere poterant. Mox animo linquitur, omnisque in angusto labor est: inde paululum ad se rediens uterinis, castoreo, & succo Nepethæ reficitur. Prodierunt quidem ructus nonnulli: sed iterum oppressa voce, gulæque, quod digito significabat, vinculo injecto, obdormiscit, interea missis subinde suspiriis motibusque convulsivis aut vitam aut vitæ reliquias testata. Una interim ex præsentibus opiferisque feminis refert, in illa mortis imagine infantem suis se viribus clam inter stragula eduxisse, matre duntaxat gemitibus aliquot motibusque convulsivis mutationem prodente, quæ quum indicia mortis esse putarentur, partus fuisse ex ejulatu constitit. Inde omnia quietiora, nisi quod trium horarum agonem suspiria motusque convulsivi interpolarent, tandem etiam finirent, irritis etiam volatilibus fortissimis. (i)

§. XXIII.

Ratio mortis in ejusmodi morbis.

Uterina hæmorrhagia si interficit, hoc facit syncope, quæ ex profluvio sanguinis & inde orta debilitate nascitur. Febris & inflammatio similiter virium prostratione mortem inferunt. Lipothymia cum Syncope copulatur. Quomodo convulsio vitæ scenam claudat, antea dictum est. Remedia quoque suis locis indicata sunt, quæ his malis opponi possunt, ne perimant, si spes adhuc superest.

§. XXIV.

Mors in partu plerumque culpa hominum contingit, raro necessitate naturæ.

Hæc, quæ adhuc exposita sunt, si breviter memoria repetantur

(i) Confer. DE LA MOTTE dans son *Traite des Accouchemens* Chap. XV. Obs. CXXVII. seqq.

tur; apparet, plurimis quidem causis & affectionibus obnoxiam esse puerperam, quæ ejus vitæ vim inferre queant: pleraque tamen mala vel ita esse comparata, ut remedio locus sit, modo peritus artifex tempori advocetur: vel a negligentia perversaque tractatione obstetricum, embryulcorum, eorum qui circa parturientem sunt, aut ipsarum prægnantium, originem ducere. Unde concludere licet, paucas admodum puerperas ex necessitate naturæ diem suam obire, sed fere tantum peccato suo vel aliorum hominum.

DISSERTATIO INAUGURALIS MEDICA
DE
VERSIONIS
IN EXTRAHENDO PARTU
PRAESTANTIA ET ADMINICULIS

QUAM
DIVINIS SUB AUSPICIIS
CONSENSU GRATIOSI ORDINIS MEDICI
PRO
SVMMIS IN ARTE MEDENDI CAPESSENDIS HONORIBUS

D. XXVII. APRILIS. MDCCLVII.

PUBLICE DEFENDET
HERMANN NICOLAUS KIENMANN
LUBECENSIS.


PRAENOBILISSIMO

K I E N M A N N O

S. P. D.

I. G. R.

Quod a me expectas, grātulandi officium laetus TIBI persolvo, quum expectationem, quam de TE omnes, qui TE norunt, facile conceperunt: fortunato eventu confirmari video. Sapientem enim, nostras litteras, quæ ab ipsa salute nomen sortitæ sunt, tractandi rationem ingressus, tantas TIBI doctrinæ medicæ opes comparasti, ut ordo noster præmia, quæ TE decent, TIBI decerneret. Neque unquam spero futurum esse, ut iudicii de TE opinionisque de commodis, quæ patriæ TUAE adferes, illum pœniteat, maxime quum docto ingenii TUI specimine, quod in publicum producis & literario certamine, in quo præclare staturum TE esse auguror, TE honoribus, TIBI conferendis, dignum esse comprobas. Ita simul excitas spem fore, ut laudum TUARUM in dies fiant accessiones, & opera TUA, quam aliis præstabis, illis maxime sit salutaris. Quod ut eveniat DEUM precor; me vero ut amare-pergas summopere TE rogo. Scr. Gott.
d. 22. April. 1757.



Q. D. B. V.

DISSERTATIO MEDICA INAUGURALIS

DE

VERSIONIS IN EXTRAHENDO PARTU
PRAESTANTIA ET ADMINICULIS.

§. I.

Naturalis partus molimina, quamquam ingrati quid, dolorifici & acerbi simul afferant, quod pro corporum mira diversitate & conditione, modo levius, modo durius parturientes percipiunt; attamen valdopere tempus, in quo parturiendi adpropinquare videtur labor, non timendum, nec opus est singularum horarum angustiae expectatione. Dicti hujus veritatem adprime omnes comprobabunt, qui quam facillime partus absolvatur interdum naturalis, cogitant. Si circumspecte porro animum ad antecedentium annorum seriem referunt, si nostra nunc memoria parturientium myriades, felicissime partum fundentes vident, facile animadvertunt, raro istiusmodi casus contingere, qui justam formidinem gravidis incutere possunt, ut plurimum vero absque adminiculo quodam adhibito prodire foetum. Vix tamen est mulier utero gerens, quæ timore non levi afficiatur dum partus instat. Injustum vero mœrorem, præter naturalis partus benignitatem, arguunt tutiora nostri ævi auxilia, quæ eas & in casu ancipiti a vitæ periculo arcent, ut non levem salutis suæ spem, in præsidiis laudatæ artis possint collocare. Partus

2992

itaque

itaque naturalis per se considerati facilitas, partus difficilis optima adminicula, eorum refellunt sententiam, qui omnes sigillatim, quæ in pariendo laborant mulieres, incertum vitæ subire periculum affirmant. Constat quidem parturientem, aut propria culpa, aut per inhumanam negligentiam illarum muliercularum, medicas quæ afferunt manus, in naturali etiam, partu, vitam cum morte nonnunquam commutare: minime tamen æquum est, parturientes mortis periculo generatim terrere, injustusque censendus est arbiter, qui sapientissimum NUMEN, de conservatione generis humani adeo sollicitum, vitæ & incolumitati, tam in utero gerentium, quam parientium, non æque attente prospexisse affirmat,

§. II.

Facili autem negotio naturalem partum absque matris aut proliis periculo ad exitum perducere posse, probant innumera ruricularum muliercularum, quæ sub ipsis durissimis rusticanis laboribus fœtum quam felicissime edidere, partuque absoluto statim ad opera sueta redierunt, exempla (a). Feminas vero delicatioris fortis difficilius quandoque parere, naturalis partus facilitatem non infringit, sed sensibiliori corpori & vitæ regimini debetur. Terrent vero gravidæ delicatiores & otiosas, firmata calamitatum, narrata ab aliis, quæ difficili partu laborarunt, quæ ipsa dein remediis anilibus dum præ-

(a) *Strenuus muliercularum ruricularum labor a quo nec fœtu in lucem edito abstinent, causa fortassis uteri prolapsus est, quo harum plurimæ laborant; indeque est quod Cl. MITTELHAEUSERUS Practisch. Abhand. vom Accouchiren Cas. IX. annot. I. affirmat: inter decem mulieres agricolarum vix unam esse non valetudinariam. Hoc vero uteri vitium non ex ipso partus negotio originem traxit, sed ex neglecta genitalium partium cura a partu.*

præcavere student, potius accersunt, laudatumque naturæ ordinem invertunt, cujus commatis remedia sunt pellentia, injusto maxime tempore & copiose nimis ingurgitata. Ruricolarum feminarum exemplis jungere porro convenit castra sequentium historias, quæ laboribus licet occupatæ, ambulationibus & itineribus defatigatæ, non minus tamen feliciter pariunt. De feminis Indis auctores pariter recensent, eas quam facillime partum fundere, statimque a partu propriis manibus lotas, negotia sua rursus tractare. Quid, quæso, ista per universas gentes, naturali modo viventes, observatione naturalis partus facilitatem luculentius probare poterit? Quodsi itaque nostro sub cælo quæ vitam degunt, inanem timorem propellerent, vitam, sedentariam vitarent, & a depravatis quibusdam consuetudinibus abstinerent; minor procul dubio difficilium partuum esset numerus.

§. III.

Non penitus abs re erit, paulo ulterius injusti timoris, quo parturientium inentes premuntur, originem explicare. Omni procul dubio initium & incrementa iste timor est titubantia & incertitudine veterum in arte obstetricia cepit. Quum enim, uti alii morbi, ita & parturientium difficilis interdum conditio incideret, medici de ope ferenda parturientibus cogitarent, a regia deducebantur via, muliercularum obstetricantium inscitia & fraude potissimum decepti. Edentula anus, cui & olim, & nostra memoria adhuc plerisque in regionibus opus incumbit parturientibus auxilium ferendi, pro captu & nugarum amore ea retulit, quæ sibi congrua satis videbantur, virique, in observando cæterum quam maxime attenti & acutissimi, relatis fidem habebant (a). Inde certe est, cur majores in arte obstetri-

(a) Bene monet SEPTALIUS *Labyrinth. Lib. IX. §. 211-212.* non temere esse credendum obstetricibus, etiam jure jurando asserentibus.

stetricia non fecerint progressus fieri, qui acumine iudicii & observationis, & olim fuerunt, & nunc celeberrimi manebunt. . . . Ipsi vero his viris, ob muliercularum verecundiam, raro manum adhibere licuit salutare, illudque tentare, quod multi postea feliciter cum successu experti tentavere. Ea propter situm, infantis obliquum, situm transversalem, aliosque positus foetus, vario modoorti, quam maxime timentes, unicam salutis spem in sectione infantilis corporis ponebant.

§. IV.

Antiqua ceterum tempora, duas in classes erunt dividenda, si accurate perspicere cupimus, quid veteres auxilii & adminiculi in partu difficili habuerint: Hippocratica tempora plurima de sectione præcipiunt, operatione ista cruenta & infelici, nisi maxima adhibita cautione tractetur: nam excepto versionis studio in caput, quod HIPPOCRATES jubet, quodque æque ingratum ac inutile est, nihil in libris ejus, quod huc referendum sit, invenimus. Integer liber Hippocraticus: *de exsectione foetus ex utero.* (a) Satis superque probat

(a) *Vid. oper. Hippocratie ex editione FOESII sect. VI. p. 193. Cujus in libri fronte inscriptio ea est: περὶ ἐγκατατομῆς ἐμβρύου: quæ secundum FOESII translationem sic intelligitur: de foetus, in utero mortui, exsectione, quamvis, vivum, in inscriptione græca sic se non habeat. Notat FOESIUS præterea Annot. I. ad hunc librum, per Εμβρυοτομίαν in scriptis Hippocraticis, semper intelligi sectionem mortui foetus, idque ex libro περὶ ἐπικνήσιος & lib. I. περὶ γυναικείων probare conatur. Verum enimvero, inveniet quam facillime iste, qui citati de exsectione foetus libri initium legit, sermonem ibi tantum esse de foetibus qui non convenienter*

probat, quantum hujus operationis tristi auxilio tribuerint, aliaque passim loca, quæ in libro de mulierum morbis primo occurrunt, idem adfirmant. Præceptorem in arte obstetrica Hippocraticorum incertitudinem locus alius in libro περι ἐπικυρίσσεως probat (a) sic secundum FOESII explicationem se habens: *cum vitali edito fœtu manus prominet, ea retro impellenda, quoad supra repuleris, & si ambæ promineant, ambas retrudito. Quodsi crûs prominet, hoc quoque retropellendum.* Non multum autem huic artificio fidendum esse, patet ex scriptis & assertis peritissimorum in arte virorum, qui uno ore fatentur, nec opem ferre hunc laborem, nec fieri commode posse. Relabi enim prolapsam manum non posse, ex loci angustia

nienter in utero gestantur. Quodsi itaque libri hujus & inscriptionem & initium comparamus, dubii manemus, utrum solum fœtum mortuum, an vero vivum etiam, qui transversim situs, in caput reponi nequit, secundum præcipiat HIPPOCRATES. Recte pariter Ven. HEISTERUS animadvertit: Chirurg. Maj. Part. II. Sect. V. cap. CLII. veteres de fœtu mortuo quidem educendo agere & præcepta dare; verum de fœtu vivo male disposito, extrahendo aut vertendo, nihil fere docere. Quum vero HIPPOCRATES in citato de Exsection. fœt. libro signum mortui fœtus, licet fallax, his verbis adducat: Si vero parturienti mulieri transversus fœtus ceciderit: - - - manus ut plurimum foras emittit, quod quidem jam mortui fœtus signum: suspicari nobis licet, Medicorum Principem tantum de exsectione mortui fœtus cogitasse: quamquam non negandum, cum ex dubio signo infantis mortem concluderent, veteres vivos multos secuisse infantes, aliis encheiresibus servandos, si iis innotuissent.

(a) cit. Edit. Sect. III, p. 42.

stia ultro constat. Etsi etiam fingere vellemus, laxiorem forsan matricem, infantiles artus recipere, quid quæso inde commodi, aut emolumenti, in partum redundaret?

§. V.

Alterum artis obstetriciæ inter veteres spatium ARETAEUM, AETIUM & CELSUM comprehendit, qui multa sparsim bona præcepta habent; siquidem omnes ferme a CELSI tempore partum illum, pedibus prævium, naturalem vocant. Sunt verò hæc notati digna CELSI verba (a) *in pedes quoque conuersus infans non difficulter extrahitur, namque his adprehensis, per ipsas manus commode educitur.* Post tempora itaque Celsiana adminiculum illud quasi in crepusculis adparavit mox laudandum. Etenim summo opere adhuc delectabantur medicamentorum pellentium noxia virtute, ceu passim ex ORIBASII (b) ACTUARI (c) & NIC. MYREPSI (d) scriptis constat, horum medicaminum descriptionem hinc inde tradentibus. Moram in adhibendis pellentibus, ut antecessores, trahentes, eum uteri statum facere solebant, qui nullam, quam sectionis & ferramentorum opem admittebat. Ita ferramentorum terrores per hæc ipsa tempora ad nostra transmigrarunt, præcipue cum multi adhuc sint viri, auctoritate veterum freti, qui mortifera, quaque occasione obveniente, in usum vocant instrumenta, circumspecte satis non pensitantes, utrum vivus adhuc superses sit fœtus, utrum matris vi-
res

(a) Cf. Lib. 7. de medic. cap. 29.

(b) Vid. Lib. de virtute simplicium.

(c) de method. medend. Lib. V. cap. VI.

(d) de antidot. Sect. I.

res, triste istud auxilium permittant; an vero sola manu cuncta componi possint? Retropulsionem foetus, quam antiquiores fere omnes commendant, saepius repetunt; matri licet dolores creet, artus infantiles facillime e situ naturali moveat, post partum interdum non restituendo, nihilque penitus auxilii ea feratur. Sic vero praecipit ARETAEUS: *in sublime retrudendum quidquid praeter naturam accidit.* (a) Quae dein retropulsio pro suo more, cum operarores falleret, praeter ferri electionem nihil supererat; ferri autem non magis inutilis, quam noxii, lacerantis quippe foetum extrahendum, laedentis scindentisque cum certa morte matrem, puerulo antea jam extincto.

§. VI.

Periculosissima profecto, omnis si spes in sectione esset ponenda, parturientium fieret conditio, neque adminicula haud levioris momenti, multoque tutiora, earum meticulosas mentes reficerent; adminicula matris laesionem & foetus lacerationem pariter praecaventia. Ii tamen non sumus, ceu in filo hujus scripti ulterius intelligetur, qui triste hoc auxilii genus, penitus rejiciendum ducimus, sed asserimus modo, sectione ut plurimum operatorem posse superfedere: In promptu catalogus ferme esset, illorum partuum, qui neque sectiones neque lacerationes infantum postulavere, quod variis ex recensitionibus observationum adpareret, quarum infaustus calamitosusque fuit exitus. Nummam vero liceret, has absque offensione quadam, recensere historias? Matrix ipsa, quae, quam facillime inflammationis ex partu difficili recipit notas, quaeque ex stasi sanguinis

(a) Cf. Lib. II. cap. 76. de curationibus diuturn. ex ed. Henisch.

fanguinis congelati, vel ex ipsius infantis putredine, effusis liquoribus, corumpitur, præcipue si per plures duraverunt partus molimina dies, immotusque si hæsit infans parte quadam inique sita, versus pubis præcipue ossa uterum premit; his sic se habentibus ipsa matrix periculosissime lædi solet. Nam si tetigerit modo cultri falcatis cuspis uteri substantiam, quod & maxima adhibita cautione, inscio operatore, interdum fieri potest, quænam inde calamitates? quæ scenam ludunt, dum infans diu extractus fuerit, præcipue, si lochia non procedunt, novaque humorum corruptela, vulnus aut insanabile reddit, aut secundum GALENUM: *difficile uteri sectio conglutinatur*. (a) Ruptorum uterorum in partu observationes, fortassis nonnullas, usui instrumentorum secantium & lacerantium debemus. (b) Istud certum & rationi consentaneum, suspectam rupti uteri esse historiam, si instrumenta adhibita fuere, lacerationi infantum dicata, nisi anatomica disquisitio rem probet. Tot narrationes colli vesicæ urinariæ lacerati, cum insequente incontinentia urinæ satis molesta, ex incauta ferramentorum adplicatione, prolatam affirmant sententiam. Varios huc spectantes casus affert, alios inter multos MAURICEAU, (c) cujus observatio LXXXV. præterea recenset: imprudentes temerariosque chirurgos interdum instrumentis uti, ne fabrefactis quidem ad extractionis opus, sed primum, quod ad manus est arripere, inconsultoque adplicare. Quis dubitabit itaque, parturientium conditionem esse periculosissimam, præcipue si a rudioribus & inconditis hominibus ruditer tractentur; qui, si plane manum de tabula detinerent, conscientiae consulere,

a

(a) *de locis affectis Lib. VI. cap. V.*

(b) *Vid. La Motte Traité complet des Accouchem. obs. 188.*

(c) *Observations sur la grossesse des Femmes Tom. II. obs. 76. & 85.*

neque matrem ex ignorantia lædentes, neque infantem necantes.

§. VII.

Felicia nostra merito erunt pronuncianda tempora, veterum incertitudine in arte obstetricia non obnubilata, cum veris gaudeant adminiculis, quibus partus difficilis, ut plurimum felici cum eventu, ad umbilicum producit: id modo notandum, agyrtarum manus absint, auxiliumque in obstaculis tollendis vir tantum ferat judiciosus & artis gnarus. Variæ nempe encheireses, quæ secundum partus speciem, & mutandæ & revocandæ erunt, dubios casus leviori interdum opera solvunt, quam pro veterum placitis, fieri poterat. Clarissimorum si evolvimus hæc in arte scriptorum libros, hoc effatum veritati esse consentaneum, satis exinde constat. Oblique situs infans, aut plane transversum compositus, miris tortus quandoque modis, & judiciosi consilii, ex arena quasi capti, ope, & peritæ manus studio, e claustris; quibus inclusus tenetur, educitur. Longa horarum imo dierum spatia, quæ molestissimis sub cruciamentis sexus sequior difficili in partu transigit, in brevius temporis intervalum contrahuntur. Ea symptomata, quæ ut plurimum partus sequuntur, ubi ferrum secans adminiculum fuit, quæque a longinqua finis muliebris irritatione ortum cepere, hæc ibi, ubi manus salutaris solum tulit auxilium, parturientem haud reddunt miseram; pariterque ea & incolumem & saluum servunt infantem.

§. VIII.

Istud vero adminiculum parturientium, quod tanti habemus; ea est a GUILLEMEAU (a) & PAREO (b) primum celebrata versio. Illa

(a) *Charl. Guillemeau de la grossesse & accouchement des femmes. Paris 1621.*

(b) *Ambros. Parei opp. Chirurg. L. XXIII.*

Illa non inique, Iuno Luciana vocanda, quum multo præstantius dicta versio auxilium ferat, quam fictitia gentium Dea, quam iterata vice passis manibus implorabant veterum mulierculæ, doloribus partus correptæ. Millenis hoc versionis studium in utero gerentibus salutare fuit, totidemque dedit infantibus vitam. Isto itaque in adjumento non absque causa clarissimi viri, dudum spem posuere haud fallacem, uti VIARDEL, MAURICEAU, qui utut instrumenta in usum vocavere, versionem tamen multo studio exercuere; porro LA MOTTE, IACOBUS DENYSIUS, von HOORN, aliique magni nominis Viri, ut & ex celebrioribus obstetricibus IUSTINA SIGMUNDIN; nostraque nunc memoria boni expectationem in ea collacamus pariter haud leviozem. Ni enim omnia in pejus ruont, partim ex vitio corpori matris insito, quod & interdum ab hoc negotio vincitur, partim ex labe & conditione fœtus, nemo sane in dubium præsentaneam hujus adminiculi vim vocabit, quidquid etiam obgannient sectionum lacerationumque in utero materno patroni. Duriora quipem & cruenta, infauslos postulare quosdam casus, certum est; hæc vero neutiquam versionis minuunt laudem. Quot enim in scriptis optimorum auctorum prostant observationes de peracta, felicissimo cum eventu versione, tot hujus præstantissimi auxilii præclara adsunt testimonia, quæ nec ad usum melius, nec jucundius mulierum, difficili partu laborantium, levamen, excogitari posse, ostendunt. Quodsi insuper attendo oculo, observationes de sectione in utero editas, perlustramus, uno obtuto apparebit, eas plurimum infelices habuisse exitus; dumque justo modo computum instituimus, inter versionum historias & exsectionum narrationes, feliciores casus in illis, tristiores in his numero prævalere. Primarium itaque in partu difficili versionem infantis in utero materno esse auxilium, nemo negabit.

§. IX.

Quid, quodsi eam medicinæ partem, quæ manu medetur, contemplamur, facile adparet, nullam ferme eam comprehendere operationem,

operationem, quæ feliciorē habeat exitum, quam ea, quæ sub versionis dominatione intelligitur. Tumoribus in sanandis, ulceribus, fracturis, iisque sigillatim in vitiis, quæ membrum quoddam corporis tantum occupant, varii labores, iterata medicaminum applicatio, longaue temporis dimensio, pro restauranda integra valetudine requiruntur. Leviuscula modo vulnera, & sanationis pariter justum tempus postulant, prætereaque notas quasi inurunt non delendas. Versionis vero negotium & brevi temporis spatio conficitur, & parturientes ab omni læsionis periculo liberat. Neque chirurgus celerius auxilium ullo in casu potest expectare, neque cum majori sublevatione manus adhibere medicas. Ipse Cl. MITTELHÆUSERUS, qui multas de sectionibus in utero materno observationes profert, statim in præfatione libri jam supra citati fassus est: *Versionem facili cum negotio fieri*, quod & aliis in locis adfirmat. (a)

§. X.

Licet vero versionis præstantia in aprico sit, ambabus tamen multi hodie sectionem in utero arripiunt. Lacerant, secant, frustulatim educunt semivivorum infantum tenella corpuscula, neque finisrum eventum, neque finisrum eventum, neque conscientiam curant. Pariter ex his constat, eos haud judiciose satis pensitare, an vitæ matris servandæ causa hæc operatio sit necessaria, an aliquid a natura, dirigente medico, sit expectandum. Omnino enim tempus erit ducendum, ob dubia mortui foetus signa, nisi matris vita stet in ambiguo, siquidem partus expulsio, præter spem & opinionem, levi interdum sublato impedimento, contingit; quod ex iis luculenter adparet observationibus, ubi sanguinis copia missione diminuta; aut injectum fuerit clysmā; quibus adhibitis retardatus per-
fæpe

(a) *Præctische Abhandl. vom Acouch. Cas. IX. annot. 2.*

sæpe in lucem prodiit partus. Quid quod magis dolendum adhuc, imperitos viros, hoc sectionis in se suscipere negotium. Mere sic dicti Chirurgi & Barbitonfores, in anatomicis studiis parum versati, aut semidocti, agresti manu, neglectis omnibus, quæ huc spectant, ad lacerationem tenellorum sese accingunt, fortassis ea ex causa, ne nihil egisse videantur. LA MOTTE non injuste & in chirurgos & in obstetrices ea propter invehit, ad ferramenta statim confugientes, ipseque probat multas se nosse feminas incontinentia urinæ labotantes, laceratasque, quin & neci datas, ex imprudenti usu instrumentorum, prædicatque felices mulieres, quæ ipsis sub laboribus animam efflant, dum crudeliter ab his homunculis fuere laniate, illarumque dolet vicem, quæ hac ex causa per vitæ reliquias distractum alunt corpus. (a) Immanis ea ex parte matris dilaniandæ cupido, crudelis pariter ex parte infantis, animos ferit. Sectio in nihilum quasi istud redigit, quod per multum temporis spatium natura formavit, quod nutrit quodque solertissime eduxit. Mens homicidii pœnas simul volvens horret. Ne vero nimius sim, præmittam, quid damni inferant illi laniationes provinciis & regionibus, multos destruentes infantes, cives olim perutiles, fœcundasque matres. AETIUS multa qui ex veterum sententia, de sectione fœtus in utero materno profert, bene tamen jubet: *ad chirurgiã non temere esse progrediendum* (b) quo cum consilio jam indigitari cupit, mortui infantis signa fallacia postulare, ut circumspecte medicus attendat, num fortassis mitiora adhuc opem ferant, num verò sectio sit necèssaria. Unam eandemque alit SEPTALIUS sententiam cujus notatu dignissima verba hic adponere e re erit: *si unquam in similibus casibus* (sermo ei est de fœtu mortuo extrahendo) *oculi aperiendi . . . cum sæpenumero multas viderimus a quibus fœtum*
tanquam

(a) *Traité complet des accouchem. Obs. CLXXXVIII. Reflex.*

(b) *Tetrab. IV. Serm. IV. cap. XXII.*

tanquam mortuum, aut excludendum, aut quod pejus est ferri-
 mentis extrahendum esse, censebant obstetrices, quæ non jam multo
 post, vivum & bene valentem fætum pepererunt. (a) Horum vi-
 rorum normæ instar habendum iudicium ab omnibus erit laudandum,
 qui obstetriciam exercent artem. Quidni porro ab indefessa & con-
 stanti manu operatoris, secandi cupiditate haud nimis ardente, e-
 rit sperandum. Hujusmodi indolis casum, ubi assiduus tandem la-
 bor vicit, recenset memorabilem HILDANUS Cent. VI. observat.
 64. Elegantissimam pariter historiam, ubi post iteratum studium,
 adhibita Venæ sectione & clysmate, licet non statim opem tulere;
 fætum in lucem protraxit, narrat LA MOTTE; indefessa enim hujus
 Viri constantia infantem difficili partu retentum tandem felicissime
 eduxit, (b) quem alius forsan, sectione festinanter instituta ne-
 casset.

§. XI.

Quoniam autem multi adhuc laudatum versionis adminiculum
 parvi habent, convenit procul dubio, paulo ulterius, infantum,
 partu difficili in utero hærentium, statum pensitare, quidque expe-
 ctandum a versione, ostendere. Iis enim sub limitibus, jamjam
 allatis & ulterius adducandis probabimus, versionem plurimorum
 difficilium & præternaturalium partuum tutissimum, præstantissi-
 mumque esse auxilium. Raro forceps adminiculum, quam rarissi-
 me vero secantia atque lacerantia instrumenta, quæ frustulatum in-
 fantes educunt, erunt adhibenda. Quo facilius vero versionis sus-
 cipiatur modus, adminicula nonnulla huc spectantia erunt ponde-
 randa a Claris Viris laudata. Neque tamen omnes encheireses affer-
 ri possunt, quibus tam diverse composita infantum extrahuntur cor-
 puscula

(a) *Labyrinth. Med. Lib. IX. §. 212.*(b) *Cit. Lib. Obs. CCLIII.*

puscula, quum secundum HILDANI effatum, (a) semper aliquid novi, sive circa dispositionem uteri, partiumque genitalium, sive parturientis sese offerat, simulque laudatus Vir eodem in loco asserit, inter tot operationes, quas administravit, nondum duas, quæ sibi invicem ex omnibus responderent, ei occurrisse. Reliqua itaque præsentī in re ab operatoris judicio erunt expectanda artificia. Si vero quis cogitet, nimium laudare hanc paginam versionis encheureses, ille capiat Terentianum illud. (b)

*Si illum objurgēs vitæ qui auxilium tulit,
Quid facias illi, qui dederit damnum aut malum?*

§ XII.

Eam vero manualement operationem per versionis vocem intelligimus, quæ fœtum, in utero præter naturam sic compositum, ut naturæ conaminibus expelli non possit, pedibus prehensis & adductis, e cancellis, quibus inclusus tenetur, ducit. Iam concinnam satis versionis definitionem habere videtur CELSUS, si sequentia verba hujus viri de versione explicemus; omnem tamen versionis doctrinam CELSO vix nobis licet perspectam tribuere, quoniam eam inter adminicula mortui extrahendi fœtus collocavit, de vivo fœtu servando nihil proferens. Sunt vero CELSI verba: *infantem manu dirigit medicus, vel in caput, vel in pedes, si forte aliter compositus est* (c). Hæc quæ de versione explicanda apprime valerent, versionis justam constituerent definitionem, si, præter supra allatam

ratio-

(a) Cf. *Observ. Cent. VI. obs. 64.*

(b) *V. Terent. in Andria act. I, S. I.*

(c) *Lib. de Medic. 7, l. cit.*

rationem, non accederet, veterum pergrata conversio infantis in caput, quam nec laudare, nec tentandam esse suadere possumus. Est sane versio directio infantis inque siti in pedes.

§. XIII.

Versionem vero operator absolvit quam facillime, si neque nimis prostrata fuerit laboribus parturiens, neque inani & frustranea spe obstetrices per longinquum tempus matres aluerint; licet quandoque solutio non cruenta infantis, præterlapsis jam octo diebus a partus initio fiat: (a) porro si aquæ nondum omnes ad facilitandum foetus exitum fuerint effusæ, sique inutilis corporis pars, nondum nimis & perdure ab ossibus pelvis cincta teneatur, aut dolorum, haud interrupta serie urgentium, vis, omnem aditum medicæ manni ad uterum intercludat, utque paucis multa comprehendam, suscipiatur, secundum quam maxime ROEDERERI effatum (b), *quantocius fieri potest hæc operatio, ipsoque eo momento, quo velamenta rumpuntur, si quidem præsens fuerit medicus.* Recenti itaque re protinus adhibenda est medicina, quod Celsianum de extractione mortui foetus dictum & hic valet. Quum vero ex verecundia, quæ omnium quidem virtutum custos, nec satis alias laudanda, sexus sequior, medici operam sæpe reformidat, prætereaque anilibus muliercularum obstetricantium fabulis fidem habet, quæ semper affirmant, eo usque, dum cuncta aperte periculosa apparent, naturali modo foetum prodire, itaque salutiferam manum recusat & abnuit: quæstio haud injusta movetur, quid adhuc a versionis tentaminibus sit expectandum, si cuncta in ambiguo esse videntur. Multæ observationes artis obstetriciæ scriptorum probant, eam magna & inexpectata in re

(a) Cf. *Obj. Hildan. l. c.*

(b) V. AVCTORIS *Element. art. obst. §. 584.*

re satis dubia sæpius omnino præstare. Certum sane & evictum est, omnibus in difficilioribus partibus, quocunque etiam tempore artis gnarus in auxilium vocetur, primum tamen ei esse de versione cogitandum, nec illotis plane manibus ad ferramenta confugiendum: non enim desunt qui & in maxime ambiguis parturitionibus haud infelices adhibuere manus.

§. XIV.

Varias induit species caput obliquum & inique situm, partus difficilis causa. Modo enim facies ad alterutram coxam respicit, modo versa ad pubis ossa facies mento iis inhæret, modo occipitis partem nimis incurvatam coxigis os remoratur, modo dextra vel sinistra explorantis digito obvenit auris. Illis quidem in casibus, ad veterum fere mentem, in caput compositio præ reliquis artificiis tentari potest, eoque lubentius, quo certiora recentiorum ad istum scopum adimplendum sunt inventa. Ita vectis interdum ope, in naturalem redigendum erit situm, si iterata exploratione, quocunque versum sit, innotuit. Nitidissimam sane, vectis ope in naturalem situm compositi infantis, observationem, ex propriis animadversionibus PRAECEPTOR recenset (a). Alias quoque, si uterinum orificium digitum admittat, hujus ope vectis induens figuram, repositio in naturalem statum fieri poterit. Non infrequentèr forceps obstaculo tollendo apta est. (b) Quæ vero cuncta si fieri nequeunt, versio ut plurimum omne punctum fert. Quum enim, uti jam exposui, non ubicunque licet in naturalem positum caput redigere, siquidem

(a) V. ROEDERER *de Part. Laborios. Cas. XII.*

(b) de qua *Encheiresi præcipue* cf. SMELLIE *Tr. on the theory and practise of Midwifery. Lond. 1752.*

quidem quam facillime aberramus, & frustranea spe decipimur, pedum utique prehensio præstantissimum affert auxilium. Nec convenit ultra modum, vectis ope, adiuventum num ferendum sit, tentare, quum urgens dolorum vis, quæ & ipso sub opere iterata irritatione partium fit, ancipiti fortuna caput fortius in pelvim comprimit. Pariter medela affertur, facie vario modo primum in conspectum veniente, versione (a). Neque semper hydrocephalus, partus species, quæ ab omnibus ferme sectionum fautoribus, ferramentis ejicitur, cruentum auxilium postulat. Egregiam observationem hydrocephali versione educti LA MOTTE (b) recenset, & si pari cum studio, quale adhibuit Vir laudatus hydrocephalus semper tractaretur, multum inde fortassis commodi exspectandum esset. Num vero & incisio per externum hydrocephali tumorem hujus generis partum interdum facilem redderet, quæ absque infantis læsione fieri posset mortifera, præcipue si tumescencia extra adpareat: hoc ab observationibus quibusdam vel rejiciendum erit, vel erit affirmandum. Præceptum itaque AETII de mortuo fœtu extrahendo datum: *Si caput fœtus locum obstruxerit, ita ut prodire nequeat infans, in pedes vertatur atque educatur*, (c) omnino nobis, de vivo servando fœtu cogitantibus, valet.

§. XV.

Ex partu præcedenti paragrapho descripto oritur alia ut plurimum species difficilis positus infantis, si vel manus, vel cubitus, vel totum brachium in conspectum extra sinum muliebrem venit.

Quum

(a) V. ROEDERERI *Elem. art. obst.* §. 505. seqq.

(b) V. *Traité compl. des accouch.* Observ. 334.

(c) *Tetrabib.* IV. Serm. IV. cap. XXIII.

Quum enim oblique capite descendit, pro conditione istius situs totum corpus transversim adparet, tuncque vel simul cum effuso liquore, foetus ambiente, vel postea quoque, manus vel brachium prodit,isque status eo difficilior sanatur, quo diutius jam in partu edendo laboravit mulier. Prodit autem manus aut simul cum capite, parum eo flexo a naturæ tramite, aut sola, quum totum infantile corpus transversaliter compositum exitum molitur. Pro conditione vero dolorum eminet, & ab his quandoque tam fortiter expellitur, ut difficillimum partum quodammodo constituat. Si movendum adhuc brachium, nec nimis incuneatum, & obstetrices & medici nonnunquam reponunt, quidquid prolapsum fuit. Inanis vero omnis retropulsionis spes erit, ni simul pedum investigare licet situm, iisque adprehensis, quasi aliud agendo, reponas brachium simul sub ipsa versione. (a) Incompte satis MAURICEAUVIUM stringit LA MOTTE quod tanti fecerit brachii prolapsi reductionem, ostenditque ex ipsa MAURICEAVII observatione CCXIV. brachium propendens solum reponere inutile esse conamen, quod insuper propriis observationibus comprobat LA MOTTE (b). Verum sane hoc esse, quisque parum etiam artis obstetriciæ gnarus facillime animadvertit, qui dolorum urgentium vim & immotum corpusculi infantilis statum permansisse, solius brachii reductione in naturalem situm non vocandum, paululum voluit. Quid? quod si ex diuturnitate temporis partus, jam inflatum fuerit, ruheat, liveſcat, nigrescat, quis adhucdum potis erit reducere & in naturalem positum reprimere, quod dolorum vis extra matricem & sinum eduxit. Nonnulli hanc repositionis difficultatem animadvertentes, pro veterum sententia, exinde reſecandum statim esse extra quod prominet, existimavere, præcipue si cum HIPPOCRATE sibi persuadeant, brachium

(a) Cf. ROEDERER *de Partu laborioso Cas. III. Epicris.*

(b) *Lib. cit. Obs. 264. & aliis.*

um prolapsum, mortui foetus esse signum (a), quod experientia multis observationibus probata rejicit. Tutissimum itaque erit, non statim de morte infantis cogitare, qui diu satis vivus persistit, ab utero materno retentus. Cum itaque hic nihil repressionis studium valeat, cuncta a divino versionis adminiculo speranda, cujus ope hujus generis partus absolvitur. Faceffit quidem iterata opera, prolapsum brachium operatorem, si praeterea spasmodice contractum uterinum orificium, humerum arcte cingat, nec medici manum admittit: aut si admittat, eam sic comprimit, ut vix ferat medicus, desistere & ab incepto opere quandoque debeat, attamen indefessus labor pedibus prehensis tandem felicissime eduxit infantem (b). Neutiquam itaque in eorum transire sententiam convenit, qui, mitiora festinanter spernentes, duriora celeri pede persequuntur. Caveant ii, qui nimis proni ad dislocationes distorsionesque brachiorum difficili in partu propendentium sunt, ne iis accidat, quod Cl. MITTELHAEUSERUS refert: nempe se vidisse ambobus decisis brachiis, infantem extractum per duas adhuc horas vitam duxisse (c). Triste profecto spectaculum, quod & ipsi Cl. MITTELHAEUSERO contigisse, palam est (d). Memorabile recenset exemplum CHAPMAN, infantis, qui, licet chirurgi imperiti sectione in partu brachium amisisset, virilem aetatem sanus; cum altero brachio assequutus est (e). Omnes itaque nervos intendere debere operator, ut versione infantem educat, fugiatque secantia, dum matris vita vel certocertius non stet

(a) Cf. Hippocratic. loc. supra adduct.

(b) *Traité complet des accouch. Obs. 271. MAURICEAU obs. sur la gross. Tom. II. Obs. XVIII. CXXVII.*

(c) *V. Practisch. Abb. vom Accouch. p. 413.*

(d) Cf. *Lib. cit. Cas. XVII.*

(e) *Treatise of Midwifery. p. 49.*

stet in ambiguo, vel pariter de infantis morte nullum dubium adsit. Medela vero una eademque erit, siue infans dextrum siue sinistrum brachium projecerit: hic adhuc tamen notandum, pluries brachium dextrum in conspectum venire, non æque multoties apparere per uteri orificium brachium sinistrum (a).

§. XVI.

Aliam difficilis partus speciem format partus plane transversim compositus, ita quidem ut vel venter vel dorsum, vel hypochondria orificium uterinum claudant. Transversum infantis situm HIPPOCRATES difficillimum judicat esse, idque exemplo quodam illustrat, his verbis: *si transversus exeat fœtus, gravis evadit affectio. Non secus ac si quis in ampullam oleariam angusti oris, olivæ nucleum immittat, qui transversus non facile educitur, eodem plane modo etiam mulieri, gravis est affectio ubi fœtus transversus descendit*

(a) causa fortassis est, quam jam Cel. HUBERUS de utero ad dextrum latus inclinante adtulit, in dissertat. de vaginæ uteri structura rugosa p. 17. Existimat nempe laudatus Vir per fœcum alvinarum & intestini recti in uterum violentiam hunc pelli potissimum ad dextrum latus. Itaque si sedentem in utero materno infantem in animo concipias, (V. Ill. Præcept. HALLERI Prælect. Physiolog. Tom. V. P. II. p. 384.) dextrum infantis brachium dextro matris lateri respondet, sique uterus versus dextrum latus jam habeat obliquus, quam facillime infans dummodo circumvolutio fit, ita componitur, ut primum dextrum brachium uteri orificium tangat, & simul cum effusione liquoris amnii prodeat, aut a doloribus magis magisque ut extra pendeat propellatur.

dit (a). Verissimum sane hoc Hippocraticum dictum est, si a doloribus nimis fuerit compressus foetus, & quod notandum, si dorsi spina os uteri claudat, quæ accurate satis internum orificium obturat, nec aditum commodum relinquit. Veterum vero aliud iudicium, ab AETIO desumptum, Hippocraticam sententiam infringit, commodeque ostendit, non omnem spem extractionis vanam esse, si pedes prehendere possit operator: licet, quod non negandum, de mortuo foetu solo AETIUS id iudicet. *Qui obliqui prodeunt, ait, minus improbandi sunt, aut enim in alterutrum latus, aut in ventrem prodeunt, sed tutius est in latus progredi, ita enim obstetricis manui locus datur, ut in caput aut pedes nascentem dirigat (b).* Hicque ex veterum placitis locus nunquam satis esset laudandus, nisi versio in caput saepius jam rejecta AETIO arrideret, commode nempe & vivum foetum transversum situm, operator in pedes dirigit. Varius vero positus transversus pueruli, varias pro obliquitatis gradu spondet encheireses, quæ omnes felicissime rem absolvunt, si pedes in propinquo sint (c).

§. XVII.

Flexis porro procumbens genibus infans, nec tutiori nec leviori modo educitur, quam, pedum adductionis ope. Ad huius generis complicati foetus statum varii modi referendi, qui interdum accidunt. Modo genibus ambobus apparet infans exitum ex utero materno tentans, modo pedem alterum simul cum genu offert, licet

(a) HIPPOCRAT. *de morbis mulierum. Lib. I, S. V, p. 167. ex cit. edit.*

(b) *Tetrabit. III. Serm. IV. cap. XII.*

(c) Cf. ROEDERERI *El. art. Obs. §. 652. seq.*

512 DE VERSIONIS IN EXTRAHENDO PARTU.

cet raro; quo de situ tamen observationes apud MAURICEAUVIUM exstant (a). Nunc simul vel genua & manus & faciem, nunc pedem alterum, manum & faciem ostendit; de qua complicatione optimum exponit casum Ill. Præceptor, ubi & simul infantis extractionem præclare descripsit, faciliq; negotio absolvit (b). Cumque hujusmodi fœtus, secundum naturalem in utero situm, capite inter genua posito, reliquòque in globum contracto corpusculo, exire cupit, nec pedes alto in loco hæreant, cur complicatam hanc difficilis partus speciem, non eodem modo extrahere vellet operator, quo graviores ejiciuntur?

§. XVIII.

Duplicati partus species alia eademque difficilis est, si clunes primum orificium matricis tangunt. Haud raro hujusmodi infantis compositio & figura explorantis digitum decipit, præcipue si vesica, fœtum ambiens, nondum fuerit rupta, cum parum discriminis interdum, num caput naturaliter prodeat, num vero clunes sint præviæ, ita titubantiæ cujusdam fortassis causa erit. Ill. HEISTERUS figuras inter naturales aliquo modo refert; quando clunes ori vulvæ sese opponunt (c). Vera CELEB. VIRI est sententia, si una, nec ab utero obliquo dislocatæ prodeant clunes. Omnino aliquo modo, si simul clunes exeant, hic inter naturales erit referendus partus, quia absque ulla ferme operatione absolvitur, dolorum juste urgentium compressione, atque directricis tantum manus ope. Si vero a recto tramite fœtus deflectat, ab utero obliquo in transversum

(a) Cf. *Observ. sur la Gross. Obs. Cl. & CCCVIII.*

(b) *V. Cit. Lib. de Partu Laborioso Cas. III.*

(c) *Institut. Chir. P. II. Sect. V. cap. CLII. §. 6.*

versum situm paululum ductus, fit difficilior partus. Si nempe ambæ non una prodeant, vna natum ad orificium matricis compellatur, altera pelvi infidet, & neutiquam a naturæ moliminibus expectandum, absque adminiculo ut prodeat infans (a). Sic, retardatus fœtus salutare manuum auxilium omnino postulat, quarum ope, non difficulter quandoque e cancellis puerulus protrahitur. Complicati partus, aut duplicati, apud veteres male audiebant, AETIO teste: *qui duplicati prodeunt, ait, in pessimam figuram illapsi sunt, maxime si in coxarum vertebrae deferantur, (b)* & paulo post aperte vult, ut huiusmodi fœtus disseccetur. Quod vero hodierna experientia, tutioribus munita adminiculis, quæ a versione expectantur, plane rejicit.

§. XIX.

Narratis his difficilioris partus speciebus, ita & in iis, quæ mutata adhuc & diversam formam induunt, partim a præpendente funiculo, & a parte quadam corporis prævia speciali, e. c. collo primum apparente, quarum parturitionum modi & figuræ ad supra recensitas erunt referendæ; omnibus hisce medelam affert præstantissimum versionis negotium, cujus præsidiiis fulti, supra §. XII. indicatis cautionibus non omnino neglectis, maximi in arte obstetricia Viri magnam laudem, immortaleque nomen sibi peperere. Sic MAURICEAUVIUS, sic LA MOTTE, sic DENYSIUS, DRVENTER & alii opem tulere, absque omni ferme ferramentorum secantium usu. Famam vero horum Virorum diminuerere cupiunt, objiciendo difficiles maxime casus eos reticuisse, neque falsos esse, si periculosi quid
iis

(a) Cf. ROEDERERI *El. art. Obs.* §. 627. & 628.

(b) *Tetrabib. loc. cit.*

iis accidisset. Ipsæ vero observationes, quas edidere, quodammodo rejiciunt hanc opinionem; nam invenimus eos non semper secantium repudiassè usum, si necessitas sectionem suadere potuerit, etenim raro capita infantum eos aperuisse constat eo potissimum vero tempore; quoties de morte prolis nullum erat dubium. Cæsareos partus recensent, aliaque, quæ ad medicinam secantem pertinent; in aprico ergo est, secuisse eos, sed de præstantia versionis persuasos, elegisse tutissima, pariter constat. Multum insuper auxilii versioni afferunt animi præsentia judiciosæque encheireses, quæ, cum laudatis supra viris propria fuere, non mirum, eos quam felicissime artem exercuisse, quam alii nonnunquam ex inscitia conspurcant. Miserum enim solamen, filiolum dilaceratum videre atque dissectum, & si quoque matrem servavit operator, attamen insitus erga gnatos amor, cruenti adminiculo nimis festinanter adhibito, iterum iterumque agit radicès, durisque devovebit verbis infelicem manum, prolem necantem. Quumque medicus tantum dirigat, si fortassis natura deflectat, aut nimis prostratas facultates corporis erigat, aut quidquid noxium affuerit, eliminet, cur iis incasibus, in quibus a directricibus manibus multum sperandum, errantem aut vacillantem naturam non sublevare vellet medicus, sed in eam, stricto quasi gladio, irruere? Quo magis crudelis & immanis, incanta embryonis in utero sectio est, eo magis salutare versionis opus divinis cumulandum erit laudibus.

§. XX.

Ut vero felicior versio, impedita nonnunquam variis ab uteri symptomatibus spasmodicis, capiat exitum; erunt versionum laudanda varia adminicula: quorum alia a veteribus acumine judicii præditis commendata fuere, alia viris in arte obstetricia claris ad nostraque secula referendis, originem debent. HIPPOCRATES & ex ejus sententia alii eum sequuti veterum, balnea difficulter parientibus levamen præbere referunt. Commendant veterum scholæ pariter

in-

inunctiones, fomenta & emollientia, nec sine causa. Eum vero in finem ea non recensebimus, ac si iis adhibitis cuncta naturæ in difficili partu essent committenda, sed eum potissimum in scopum ut emolliendo agentia spasmos solvant. Non enim unquam balneum, aut fomentatio aut aliud emolliens, rem ad umbilicum evolvat. Adprime vero & in usum ea erunt trahenda, si ob sinus pudoris angustiam, aut uterini orificii duritiem, situm infantis dijudicare non possumus & tempus ducere debemus. Adminicula alia sunt dolorum sedatio, fascia vel laqueus.

§. XXI.

Balnea multoties a Medicorum Principibus laudata emolliendo laxandoque haud leve adminiculum versionis licet præbeant, non exiguus tamen Medicorum numerus ea plane tanquam inutilia rejicit. Eo tutius vero balnea erunt commendanda, quum ex magnorum virorum auctoritate in iis haud parum spei sit, quumque & rationibus & experientia compertum emollientia & laxantia in partus moliminibus non esse temnenda. Nonne & iis quæ menstruis laborant, balneorum usus emolliendo relaxandoque est commendabilis? Satisque compertum, haud leve ita affecto sexui sequiori inde levamen esse? Cur analogice rem hanc tractantes, omnem balneorum in difficili partu usum respuere vellemus, quum spastica constrictio partium optime hoc medicamine levetur? Præcipue vero balnea, fomentationes & inunctiones conveniunt, dum partu in difficili citius nimis effluxere aquæ, quarum effusio, humorumque in corpore parturientis exagitatio, siccitate nimia pudoris sinum offendit, inutiliaque operatoris conamina reddit, nisi laxitatem eam partium, in partu tam necessariam restituat. HIPPOCRATES jubet: *mulierem sedentem, in aquam calidam esse collocandam, donec perfundatur, (a)* Laudat

(a) Cf. Lib. I. de morb. mulier. Sec. V. p. 183. ed. Foes.

dat insuper decoctum fœnigræci & malvæ ad perfundendum, aut potius ptisanæ triticeæ cremorem: fovendam porro esse sedem & pudendum ad inguina usque, infessusque parandi erunt, & tum vel maxime cum vehementes parturiendi dolores urgent. Quam pariter sententiam cum HIPPOCRATE, AETIUS (a) & AEGINATA (b) alunt. Quorum ultimus ad decoctum illud Hippocraticum adhuc illud ex Lini semine commendat, assidueque oleum calidum infundendum esse, suadet, insuperque cataplasmata ex emollientibus imponere jubet. Hic laxandi emolliendique scopus, eo vero magis laudari meretur, quo magis adhuc nostra nunc memoria magni nominis Viri eum commendant. In mentem venit, Venerandum Præceptorem Ill. Archiat. BRENDELIUM in Prælectionibus practicis haud parum in facilitando partu balneis tribuisse. Et si a magno labore delassatis balnea conveniunt, cur & reficiendi causa, parturientibus calida ea levamen non præbere deberent. Quid quod si balnea necessaria esse dicamus, dum partes siccitate premuntur. Naturalis quidem mucus aliis arte paratis præstat, attamen eo deficiente, arte restaurandum erit istud, natura quod denegat. Horum omnium quidem usum LA MOTTE rejicit (c) simulque veteres accusat, eos difficilem partum externis tribuisse causas; quæ vero inventiva in judiciosissimos istos viros neutiquam locum habet, quum HIPPOCRATES ea omnia in difficillimo transversim composito situ infantis commendat, quem difficilem partum ab externis pendere causas, quis cogitabit? Nec desunt qui fomentationum & emollientium ope partum difficilem faciliorem reddidere. HILDANUS pulcherrimum casum recenset, manu saluti difficilis partus, ubi non pa-

rum

(a) *Tetrab. IV. Serm. IV. cap. XXII.*

(b) *Cf. Lib. III. de re medica cap. 76.*

(c) *Trait. compl. des Accouchem. Obs. 238. Ref.*

rum utilitatis attulere laxantia & fomentationes, cum jam per octo dies laboravisset mulier. (a) Et fortassis duriorum laborum, qui omnem versionem respuunt, esset minor numerus, si justo tempore laudata adminicula adhibere posset medicus (b).

§. XXII.

Dolorum sedatio versionis maximum pariter est auxilium, quod omnes uno ore artis obstetriciæ gnari probant, ipsaque ratio hanc rem attentius volvens adfirmat. Si nempe spasmodica constrictio uteri, valide ipsum fœtum comprimens, ut & matricis oris durities, e spasio interdum orta sedatur, flectere atque in pedes dirigere infantile corpusculum operator facile potest. (c) Constrictionem vero & duritiem uterini oris, medicamina antecedenti paragrapho laudata tollunt, externam superficiem emolliendo, nam quoad uterum alluere potest, fomentum laxat. Interni vero spasmi ab opiatibus mitigantur, inter hypnotica præstantissimis. — Quodsi itaque dolores nimis urgeant, versionemque impendant, opiata haud temnendum ad eos levandos, & hanc faciliorem reddendam, auxilium præbent. Impeditur vero, supra uti diximus, versio ab irritatione & constrictione uteri oris, ita, ut omni licet studio adhibito, medicus

pedes

(a) Cf. *observat. 64. cent. VI.*

(b) *Hanc sententiam affirmat optimus Amicus, Vir Cl. ZEIS in dissert. de causis necessario mortem, in partu inferentibus, p. 10.*

(c) *Cl. MITTELHAEUSERUS qui spei multum in sectionibus posuisse videtur: lib. citat. Cas. XI. & XX. ipse refert, versionem facillime fieri posse, quando dolores remittunt.*

pedes non adtingere possit, atque horum ope infantem educere. Si itaque balnea & emollientia alia applicata fuere, quando de versione peragenda cogitavimus dolorumque vis inde nondum remittat, tuncque Laudani liquidi præbium post adhibita emollientia præbeat medicus, procul dubio istud ad spasmos tollendos aptum, efficiet, ut liberior operatoris manui sit aditus. Ambobus etenim his remediis, tam quæ externe commodum ferunt, quam quæ interne sedant, junctim exhibitis, istud obtinebimus, quod uno vel altero horum neglecto, non omnino attingere licet. Dudum nota pellens opii vis a dolorum sedatione fortassis pendet, quibus cessantibus & sedatis non parum spei de felici fœtus extractione esse, diximus. Rem allato modo si tractamus, naturæ imitatores sumus, quæ si versionis deneget adminicula, medicaminibus optatum finem tangere allaboramus. Quid quod ex alia ratione opiata adhuc erunt commendanda. Practicorum inter Principes SYDENHAMUS, *opiatum quodvis præstantissimum vocat cardiacum remedium & unicum ferme, quod in rerum natura hæctenus est repertum* (a). Quum itaque multi medicorum ad refocillandam mulierem, laboribus partus defatigatam cardiaca ex spirituosus conflata, non satis tuto laudant, cum in finem potius opiata secundum judiciosissimi medici SYDENHAMI sententiam commendamus, quæ non solum spasmos sedabunt, sed etiam debilem parturientem, absque ulla timenda noxa, justo modo exhibita, reficient. Haud injucundum itaque auxilium exinde parturientem & operatorem percipere posse, aequè concludere licet.

§. XXIII.

Fascia sive laqueus ipsis sub versionis moliminibus adminiculum haud rejiciendum affert. Magni vero usus est, ubi pedes fœtus u-
teri

(a) V. SYDENHAMI *Op. medic. Sect. IV. cap. III.*

teri fundum tangunt. Quando enim manus commode satis retentos infantis non potest protrahere pedes, in alto constitutos, aliaque non reprimenda corporis parte impediatur infans, quo minus operator feliciter rem perficere possit; laqueo pedes stringit, dummodoque alterum pedem aut ambos laqueo adtrahit, circumvolvere potest infantem hoc manu pedem trahens, altera reprimens quidquid viam occlusit. Quamquam vero fascia apte adhibita non plane temnenda, attamen nonnulli sunt qui omnino laquei opem respuunt, quos inter LA MORTE agmen ducit (a). Verum quidem est, nisi iusto modo & accurate pedes infantis fascia cingat, facillime ob corporis lubricitatem extractionis spem laqueum fallere posse, quod & LA MORTIUM movit, ut hujus adminiculi usum parvi habuerit. Hujus vero viri sententiæ commode opponere convenit effatum PRAECEPTORIS: *Fascia in convertendis infantibus ex præcipuis est* (b). Porro Cl. MITTELHAEUSERUS fasciæ usum propter pedum muco obfitorum lubricitatem laudat (c) quampropter LA MORTE laqueum rejecit. Non itaque inutile plane erit fasciæ adminiculum in extrahendo fœtu male composito.

§. XXIV.

Recensitis iis, quæ vera versionum sunt adjuventa, addenda nonnulla adhuc erunt, quibus parum fortassis tribuendum erit in convertendis infantibus inique sitis. Concussiones HIPPOCRATES commendat (d) ad naturalem pueruli positum restituendum, in par-
tu

(a) *Trait compl. des accouch. obs. 259. Refl.*

(b) *Cf. ROEDERERI de partu laborios. obs. III. p. 8.*

(c) *Lib. cit. Cas. XXXVII.*

(d) *Lib. I. de morb. mulierum Sect. V. p. 182. ed. Foes. ut & Lib. de exsectione fœtus.*

tu difficili. Si fortassis concussiones locum habent, eo potissimum tempore, quando velamenta nondum rupta, amniique liquore circumdatus puer, in utero hæret, eæ erunt adhibendæ. Quodsi vero jam effluxere aquæ, fœtu compresso jam a dolorum urgentium vi, inutiles plane imo noxiæ erunt. Quum vero partus difficilis tunc potissimum adparet, quando liquores jam fuere protrusi, integro adhuc non amplius ovo, quis concussiones cum fructu admove-
re potuerit? Quin si aquæ adhuc adsint, quis, infantis etiam situm difficilem cognoscens, concussionibus efficere poterit, ut justum & ad exitum aptum positum recipiat fœtus? Plane ergo exulent, quæ aut matri, aut fœtui non circumspicte satis adplicata, vim inferunt. Quod vero nocivæ sint concussiones, quodammodo apparet, e casu uteri rupti a Cl. DEISCHIO (a) narrato, quum a sinistris dextram versus forti concussione, fœmina parturiens, sese conjecerat.

§. XXV.

Abdominis pressiones ab antiquioribus laudatæ, parum itidem ad infantis situm iniquum emendandum commodi habent, sed non raro

(a) Cf. Cl. DEISCHII *Abhandlung dass die scharfe instrum. nicht zu vermeiden. Cas. 26. ubi recenset, se secuisse infantem, postquam pes, tentata versione, a corpore ruptus fuerat: propendente brachio discisso, truncum corporis, in duas dividit partes, manu, pedes & abdomen extrahit, his absolutis, pectus & caput pariter manu liberare tentavit, quo porro tempore, parturiens a sinistris dextram versus fortiter sese ita projecit, ut ruptus exinde sit uterus. Num vero, hæc uteri ruptura e matris concussione fuerit orta prudentioribus dijudicandum relinquo præcipue quum fœtu plane ferme libera erat matrix.*

raro potius exinde periculum crevit, partibus ab inflammatione tentatis. Duros parturientium dolores, quos ad tollendos omnes interdum nervos incassum operator intendit, magis adhuc pressiones augent, nec adjumentum inde exspectandum, dum adhuc orificii uterini constrictione spasmodica resistit, transitumque negat. Laudant vero abdominis pressionem ad relictum caput expellendum; judiciosissimus enim nuditissimusque veterum scriptor CELSVS vult, ut *caput ad os vulvæ compellatur* (a) pressione imi ventris. Quum vero circa relictum caput uterus ut plurimum ita contrahitur, ut nullam ab externa pressione caput mutationem situs experiri possit, quin si possit, ex facili tamen detrimentum caperet parturiendo quæ laboravit mulier, neutiquam hæc adminiculi species approbanda, præcipue dum caput, partim a doloribus ipsis hunc ad locum movetur, partim pondere proprio sponte uterinum os tangit. Quod si vero ea molitie, quam CELSVS commendat, abdomen non prematur, sed ab imperitis tractetur hominibus, & rusticanis manibus, ultro liquet incommoda & damna augeri. Affert Cl. MITTELHAEUSERUS (b) observationem compressi imi ventris gravidæ ab obstetrice inanibus & futilibus rationibus commotæ, nec dubitat, quum difficili postea laborabat mulier partu, causas hujus inique siti infantis ab ea compressione ortas esse. Quod integro adhuc ovo fortassis locum habet; difficili sub partu vero, cunctis apprime pressis non contingit, nihil enim ex ea compressione imi ventris sperandum, quam ut omnia in pejus ruant. Exiguum porro levamen parturientium affert reclinatio, quam HIPPOCRATES commendat (c) ad commodum parturientis.

(a) *De Medicin. Lib. 7. cap. 29.*

(b) *Cf. cit. Lib. Cas. XI. annot. IV.*

(c) *V. Hippocratic. lib. I. de morb. mulier.*

turientis & operatoris eligenda interdum, nunquam vero foetui ipsi auxilium affert.

§. XXVI.

Licet magni vero omnino habenda sint versionum molimina, neque faciliior in universa chirurgia neque jucundior operatio sit, quam felix eventus plurimarum observationum clariorem reddit, atamen præsto sunt testimonia eorum, qui affirmare contendunt, sectionem infantis in utero materno leviori opera peragendam esse, quam ea operatio, quæ conversione infantum matres & foetus liberat. Fortassis vero ille felicior, qui secundum Terentianum illud:

- - - uno digitulo fores nunc aperit fortunatas,

quam qui istas:

- - - calcibus saepe insultabit frustra.

nec frustra solum, sed infelici potius successu. Huic sententiæ de caute instituenda sectione adprime favet Chirurgiæ principis effatum. Etenim CELSVS de mortuo extrahendo foetu, inter præcepta quæ dedit, hæc refert (a): *Si partus intus emortuus est, nec excidere per se potest, adhibenda curatio est, quæ numerari inter difficillimas potest, nam & summam prudentiam moderationemque desiderat.* Quum vero veteres omnem qui salutis spem pro matre servanda in sectione infantis ponebant, ipsi asserant, sectionem summam & prudentiam & moderationem postulare, majori sane studio eam evitandam putamus, quum exercitatissimus quoque, maxima licet adhibi-

ta

(a) Loc. jam cit. Cels. Aureum profecto hujus viri effatum nunquam satis ponderandum.

ta cautione, lædat interdum dum secat, matricem; quamvis etiam pro comperto habeamus, infantem esse mortuum, qua de re fallacia ferme signa semper reperta fuere, non festinanter tamen ad sectionem erit transeundum, sed tentandum potius, num versio valeat, quæ, supra relatis cum adminiculis stipata, rem præter opinionem nonnunquam absolvit. Ex omnibus itaque allatis in aprico est, sectionem loco versionis non esse eligendam, quamquam etiam Cl. MITTELHAEUSERUS (a) apertis verbis dicit; versio bona est, priusquam vero multum studii in eam conferam, & parturienti dolores creem, libentius ego instrumentis utor, si sciam infantem esse mortuum. Quis signa vero de morte infantis tutissima pronuntiabit, quem non fugit, omnes signorum horum fallaciam probare & incertitudinem; paucissimis, maxima cum cautione attentis, exceptis. Itaque profecto in sententiam Cl. Viri nemo facile transibit quem vestigia terrent. Tentanda & in infante mortuo inique sito versio, quod Cel. DEISCH (b) interdum felici cum eventu fecit.

§. XXVII.

Sectionum fautores aliam adhuc sententiam alunt, quæ infirmo pariter nititur fundamento. Asserunt parturienti versionis molimina esse dolorifica, sectionem infantis mulieris tantopere non prosternere. Non autem ita nobis videtur. Versio exiguo temporis spatio, ut plurimum absolvitur, sectio plurimum postulat horarum spatia. Versionem quidem absque ullo emollientium usu si suscipiat operator, valdopere pudoris sinum extendere debet vi interdum adhibita

(a) *V. lib. cit. Cas. 9. annot. 2.*

(b) *Cf. lib. sup. cit. Cas. XI. & XII.*

hibita non leviori, laud absque dolorifico ob partium sæpius stric-
turam, parturientium sensu: contrectata autem per plures horas
genitalia, dum infantem secando extrahit operator, pari dolore af-
ficiuntur, quin majore. Quid enim si singulatim, modo brachium,
modo vnam trunci partem, modo alteram, modo dissectum a col-
lo caput, solvo & educo, expectandum, nisi summæ parientis angus-
tiæ? Verum enimvero, nonne major in secando partium irritatio,
quam in vertendo? nonne ex irritatione major hic dolor, porroque
molestissimus, sensus mulieri. Ea itaque ex causa ad arma confugere
non convenit, nisi alia obstacula a medico laud vincenda, id suadeant?
Pariter ii injuste agunt, qui infantem in utero hærentem & incertis
vitalitatis signis gaudentem, ob periculum matri quod iufert, tan-
quam parricidam esse necandum putant. Ita existimant nonnulli se
reperisse, quod pueri in faba. Sed errant ni fallor, errant tota via.
Quis enim matrem infanticidii ream morti traderet, quæ ob uteri
strangulatum infantem capite e sinu prominentem muliebri suffoca-
vit: pari passu & mater & infans hic ambulant. Nisi aliæ sint cau-
sæ, quæ pro matris vita servanda, foetui non parcent, ea profecto
quæ ex culpa parricidii accidit, levioris fortassis esset momenti ad
infantem vita privandum.

§. XXVIII.

Rariores casus qui omne manuum auxilium respuunt, flebile se-
ctionis beneficium poscunt. Flebilis hæc rerum facies suadet, ut
medicus omnibus incassum adhibitis aliis, denique nonnunquam de
sectione cogitare debeat, cum nullo alio in adminiculo spes super-
sit. Quamque pro versione rite instituenda commendat quisque
festinationem, ne nempe ullum temporis perdatur momentum;
eam judiciosam cunctationem quisque pariter laudabit; iis in casibus
ubi sectionis opera mater servanda erit, nam persæpe desperata &
incipiti in parturitione cunctando medicus restituit rem. Maxima
itaque

itaque cum circumspectione & ponderatione mortiferum ferrum arripiat operator, *ad quod auxilium tunc demum vi quadam compellitur*, ut verbis Præceptoris utar, (a) *quando per plures dies continuata vis dolorum uterum in osseam velut capsam induravit, fœtumque cum reliquis genitalibus inflavit.*

§. XXIX.

Coronis loco necessariae sectionis casus duos tangam, inde ut appareat, quæ requirantur, priusquam versionis divinum auxilium deferimus, cruentumque cultellum applicamus. Alter est, quem ROEDERERUS recenset, (b) quemque nominæ instar commendare potero, cujus summam breviter delibabo: Amnii primis sub veris doloribus liquore effluxo, simul cum brachio integro quartum usque ad diem cum jam laboravisset mulier partu, in auxilium vocant Præceptorem; tumet jam in femoris crassitiem propendens adauctus humerus. Impressus tumor durus, foveam servat, frigido illo lividoque. Nihil ad carpum pulsus, vel in palma ab irritatione motus. Putris odor ille ab embryonis morte specificus manum explorantem fœdat. Vagina tumet, riget uterus annuli instar circa humerum. Ipsa uteri substantia rigidissima, ut & in altissima regione supra pelvim locati pedes fœtus semel iterataque vice cum maxima Operatoris fatigatione tentatam versionem impediunt. Ex parte matris quæ viribus adhuc valebat integritatis uteri signa aderant, neque de fœtus morte dubitare licebat. Hæc ex citata observatione excerpta docere nos possunt, quando necessario instituenda erit sectio, quandoque ad lugubre auxilium, manus medicas qui adhibet, confugere debet.

Memo-

(a) Cf. ROEDERER: *de partu laborios.* p. 14.

(b) *V. lib. cit. de part. labor. Obs. IV.*

Memorabilem alteram observationem, quæ absque infantis sectione absolvi non potuit operatio, narrat Cl. von HOORN (c) ubi uterinum orificium ferrei instar annuli cinctum brachium tenuit, certissimaque mortis signa adfuere. Hujusmodi vero casus ut plurimum evitantur, si perita obstetricantis manus, justo tempore auxilium ferre potest, atque infantem simul cum matre præstantissimæ versionis servare adminiculo,

(c) *V. cit auctor. Siphra & Pua in Prefat.*

Q. D. B. V.

DISSERTATIO INAUGURALIS MEDICA
DE
PARTU PRÆTERNATURALI,
QUEM SINE MATRIS AUT FOETUS
SECTIONE ABSOLVERE NON LI-
CET OPERATORI

QUAM
IN ACADEMIA GEORGIA AUGUSTA
AUCTORITATE GRATIOSAE FACULTATIS MEDICAE
PRO
DOCTORIS HONORIBUS ET PRIVILEGIIS RITE
OBTINENDIS

D. XXVII. NOVEMBRIS. MDCCLV.
PUBLICAE E CATHEDRA DISQUISITIONI EXPONET
ANDREAS LINDEMANN
REVALIA LIVONUS.

THE HISTORY OF THE
CITY OF BOSTON
FROM THE FIRST SETTLEMENT
TO THE PRESENT TIME
IN TWO VOLUMES
BY NATHANIEL BENTLEY
OF THE BARR

IN THE
LIBRARY OF THE
MUSEUM OF COMPARATIVE ZOOLOGY
AT HARVARD UNIVERSITY
CAMBRIDGE, MASS.
RECEIVED
JAN 10 1892



§. I.

Antequam homo nascendus in lucem prodeat, graves illum sæpe circumveniunt difficultates. In tanta viarum per quas exitum moliri debet, angustia naturali, nonnunquam fit ut insuper præternaturalis accedat partium coarctatio, vel a conformatione ossium ex quibus pelvis componitur: vel ab accretis rebus præternaturalibus, ut carnibus, callis, cæt. quibus uteri orificium aut vagina vel integre vel magnam partem occluduntur: vel a tumore & inflammatione genitalium: vel a spasmo, quibus naturalia nimis constricta tenentur. In pnerpera quoque deficere aliquando solent vires legitimeque dolores, quibus partus satis urgeri possit. Fœtus ipse esse potest nimis grandis aut monstrosus: aut perversum obtinere situm, qui permultis modis diversis accidere solet: aut per paragomphosin impactus esse: aut extra uterum per hujus rupturam in abdomen exiisse: aut adeo in tuba Fallopiana, ovarioque formatus fuisse: Accedunt varii obstetricum errores, quæ omnia ita comparata sunt, ut partum vel difficilem reddant, vel præternaturalem efflagitent

§. II.

Multæ quidem magnæque pariendi molestiæ præcaveri poterunt, si tranquille omnia agendo, justum legitimorum naturæ conatuum sive dolorum verorum tempus expectetur, non autem mulier festinanter violenterve ad labores suscipiendos exstimuletur, antequam veros naturæ motus percipiat. Nam si justo citius opus urgetur, vires a laborante fœmina inutiliter consumuntur, ut quum postea ad tempestivum partum enitendum requirantur, deficient. Si contra ad naturæ molimina attenti præstolemur, donec orificium uteri detersum sit, (a) tunc integris adhuc viribus graviores etiam molestiæ plerumque feliciter superari poterunt. Quin etiam, si priores nixus non sequitur infans, sæpe tamen interposita subinde mora, qua respirare viresque recipere queat parturiens, repetitis tandem laboribus propelletur. Quamobrem consultum semper est, aliquantisper rem naturæ committere, si nihil vehementer urgeat, minime vero confestim ad manuum vel instrumentorum vim confugere ac properare. Si vero nihilominus remissiores fuerint vires, addito per gratius confortans b) momento e. g. haustu vini Rhenani, multum adjuvari poterunt. At si spasmio abortu nimium urgeantur confirganturve naturalia, lene sedativum aut opiatum (c) opportune datum optimum pellens est, quatenus remoram vel obstaculum partus, spas-

(a) Vid. ROEDERERI *Præceptoris mei Elementa art. obstetr.* §. 164.

(b) ROEDERER. *Element. artis obstetr. Cap. XII. §. 248. n. γ. δ. Cap. XIII. §. 328.*

(c) Bono consilio ista commendant. Anglorum nonnulli, v. g. FIELDINGOULD. *Treatise of Midwifry. P. I. p. 38.* RICHART MEAD *Monita medica. Cap. XIX. S. v. p. m. 142.* Sæpius etiam felici cum successu in lentiore partu opiatum se usum esse memoravit ROEDERER.

spasimum scilicet tollit. Frequenter etiam accidit, ut obstetrices rudiori tractatione parturientes magis affligant, & difficultatem enitendi inferant, dum violenta manuum agitatione genitalia diducunt, & gravidam ventrem trudent premuntve, quo ejiciatur foetus, quibus tamen rudioribus moliminibus partum magis impediunt retardantque, genitalibus inflammationem inducendo, foetumque, praesertim liquore amnii nondum effuso, in perversum situm cogendo, ac robur frangendo ad partum adeo necessarium.

§. III.

Licet vero haec aliave felicitis partus impedimenta haud admissa fuerint, ea contra quae commodiorem exitum parare valeant recte administrata sunt, nihilo tamen secius frequentes incidunt casus, ubi nec virtute naturae ac medicaminum ope partus elidi potest, sed manuum auxiliatricum operae utique desiderantur: velut si foetus perversae situs sit: si haemorrhagia uteri sub initium partus contingat; & quae sunt reliqua. Si vero manuum auxilio uti necesse est, a feramentis tamen machinisve, quoad sufficiunt manus, abstinendum. Nam & duriora sunt ejusmodi instrumenta, ut partes perfacile possint laedere, & manus, sensu quippe praeditae, commodasque aggrediendi, tractandi, ducendique vias praetentantes, mirifice praestant.

§. IV.

Neque tamen sperari poterit, his omnibus rite peractis nunquam obstacula superiora partum adeo remorari, ut & infans & mater de vita periclitentur. E contrario saepe fit, ut foetus excludi plane nequeat, & utrisque moriendi necessitas incumbat, nisi vel cum matris summo periculo foetus exsecetur, vel cum morte foetus vita matris conservetur. Et has quidem partus praeternaturalis species pertractare mihi animus est, in quibus necessitas exigit, ut ad partum absolvendum aut sectio caesarea instituatur, aut infanti vis inferatur.

§. V.

Ex his casibus primo loco nominandus is videtur, ubi superior pelvis hiatus sive apertura nimis angusta est. Nam licet naturæ consentaneum sit, ut iusta inter matrem & foetum servetur proportio, proptereaquæ ipsa repugnare videatur natura, quo minus ejusmodi vitia pelvis, quæ in nimia pro foetu transmittendo angustia consistunt, accidant; negari tamen non potest, dari casus, ubi ob malam conformationem vel morbum antegressum, conjugata aperturæ superioris, id est, distantia ab osse pubis ad os sacrum adeo parva fuerit, ut sub ipsum partum, caput aperturam superiorem non intrare, neque manus operatoris in uterum dimitti potuerit (*d*). In ejusmodi casu per explorationem facile dignoscendo, si foetus vel optime situs fuerit, debitaque partium proportionem gaudeat; exclusionem per viam naturalem frustra expectabimus. Cum enim neque manuum neque instrumentorum usus hic sit, unice in sectione cæsarea, foetu vel vivo vel mortuo, auxilium quærendum esse facile patet. Quod remedium, quamquam truculentum & crudele videatur, tamen exemplis compertum est, persæpe feliciter cessisse (*e*), adeo ut in una muliere plus simplici vice institutum fuerit (*f*). In hoc igitur casu, quum

(*d*) SAVIARDI *Observat.* 114. VOELTER *in arte obstetr.* pag. 112. *Memoires de l'Academie de Chirurgie T. I. p. 646.* MAURICEAU *Observ. sur la Grossesse Observ.* 26.

(*e*) *Vid. Franc. ROSSETI Traité de l'Hysterotomie ou Entantement Cæsarien Paris 1551. 8. Laurent. HEISTER. in Institut. Chirurg. latinis Part. II. Sect. V. Cap. CXIII. & plurimi apud ipsum allegati. In Memoires de l'Academie Royale de Chirurgie T. I. p. 623. - 650. & T. II. pag. 308. 334.*

(*f*) *Ter apud ROSSET. alleg. libro. Part. II. Observ. 2. Sexies, ibid. Observ. I. Septies, SONNIUS Medicus apud Henricum van Roonhuysen in Observationibus Chirurgicis de morb. mulierum*

quum mater & infans adhuc vivus probabiliter servari possint, aliter autem utrique pereundum sit, ratio suadet, ut talis sectio a perito artifice fiat, modo mulier ejus sit roboris, ut sectionem sustinere salva vita posse videatur. Etenim quum ad vitam hominum conservandam, quoad fieri potest, Medicus inpr. tanquam sanitatis, valetudinis ac vitæ custos & curator obstrictus sit: hoc autem utrique, tam puerperæ quam foetui, per hysterotomiam præstare queat; facile patet, non sine officii sui prætermissione, ab hac curandi via abstinere posse medicum. Neque obstat, quod tantum probabilis haberi possit conjectura, vitam servatum iri. Nam licet verisimile modo sit, vitam servatum iri. Nam licet verisimile modo sit, vitam fore superstitem; tamen hæc certe utriusque morti erit præferenda.

§. VI.

Posiunt vero pelvi licet optime constituta, tamen genitalia a causis præternaturalibus ita esse affecta, ut ad foetum transmittendum dilatari non possint, si orificium uteri, ab inflammatione aut exulceratione prægressa, adeo scirrhosum vel callosum (g) redditum fuerit, ut neque a dolorum vi, neque ab arte eo usque diduci possit, ut caput infantis vel manum operatoris transmittat. Causa impedi-
menti per explorationem dignoscitur, an vero hic partus iis adnumerandus sit, qui sectionem cæsaream postulant, disceptatur. Sunt, qui dissectionem potius & disruptionem orificii uteri, sectioni cæsareæ præferunt, (h) & rationes, a vulneribus uteri & effusione sanguinis

Xxx 3

lierum Cap. I. Quinquies in uxore chirurgi Parisiensis apud Thom. BARTHOLINUM Historiarum Anatm. Cent. II. Hist. VIII. p. 183.

(g) in *Medical Essays of Edinburgh. Volum. III. Obser 19. p. 315.*

(h) HEISTERUS & Auctores ab eo citati

guinis in ventrem defumtas, afferunt, cur cæsaream sectionem hic rejiciendam existiment. Sed præterquam, quod ab incisionibus minus profundis hic parum auxilii expectandum sit, quia foramine non satis amplo reddito, foetus per ordinariam viam prodire aut manibus extrahi nequit; sic profundiores plagæ, accedentibus doloribus valentioribus, aut vi externa, ad extrahendum foetum necessaria, in veras orificii uterini rupturas mutabuntur; quo in casu, periculum ab effusione sanguinis in ventrem majus erit, quam commoda apertura pro eluendo sanguine non adsit. Præstat igitur hic, sectionem cæsaream præferre incisionibus oris uteri, tum matri, tum foetui adhuc vivo, magis periculosis.

§. VII.

Minime autem in ea sum sententia, ut propter impedimenta quæcunque in genitalibus, quæ sine magno periculo tolli removerique possunt, uti si parietes vaginæ aut orificium ejus, aut labia vulvæ coalita sunt (*i*), sectionem ventris instituere suadeam, ut hic potius separationem providam, quam primum id fieri possit, siue ante partum, siue sub ipsum partum admittenda velim.

§. VIII.

Casum rarissimum pro partu cæsareo sistit uterus in hernia sic adhærescens, ut nulla ratione reduci in locum suum naturalem possit: cujusmodi exemplum refert SENNERTUS (*k*), ubi in gravida muliere, post acceptum gravem in sinistro inguine ictum, tumor eo loco apparuit, qui tantum abest, ut reprimi potuerit, ut potius in dies magis magisque creverit, adeo ut uterus situm fere horizontalem obtinuerit. Cum igitur his sub conditionibus, dolores partem foetus præviam, non in pelvim sed in lumbos impellant, neque in tanta uteri obliquitate manuum vel instrumentorum axilium esse possit,

(*i*) Conferatur BECKER in *pædiocætonia inculpata*. §. 30. seq.

(*k*) *Institut. pract. Med. Libr. IV. part. I. Sect. II. Cap. 17.*

fit; perspicuum est, non dari aliam viam, parturientem ab onere liberandi, quam partum cæsareum. (At si uterus, in herniam prolapsus, in sedem suam ordinariam reduci potest, sicut in observatione a Ruyschio (l) proposita contigit; sectionem cæsaream, minime tentandam existimo; sed partum per naturalem viam excludendum, nisi forte hic alia obstituerint impedimenta graviora.

§. IX.

Sunt qui his in casibus, ubi foetus in utero hærens, non nisi chirurgia cæsarea instituta in lucem proferri potest, sectionem dissuadentes (m), negotium naturæ committi malunt, persuasi, eam per inflammationem aut abscessum viam indicaturam, unde foetus salva matre eximi possit. Sed quum hoc naturæ beneficium valde rarum & anceps sit, & pleræque ab ipsis partus conatibus conficiantur, tam dubio eventui nihil committendum esse existimo. Alii ut MAURICEAU (n), foetum semper manibus aut instrumentis per vias naturales extrahere volunt, quod vero nonnunquam impossibile esse, jam expositum est.

§. X.

Restat, ut eas partus præternaturalis species, in quibus ob foetum extra uterum hærentem venter incidendus est, enumeremus. Ex his frequentior est uterus sub ipsis partus moliminibus ruptus, cujus causa potior in situ foetus iniquo posita esse videtur. Duplex casus existere potest: vel enim integer foetus per uteri rupturam in ventrem delabatur, vel tantum aliqua pars ejus. Si posterior exstiterit, propter partem infantis in genitalibus adhuc resistentem, diagnosi diffi-

(l) *advers. dec. 2. p. 23.*

(m) *Vid. SOLING. in Operat. Chirurg. cap. de sect. cæsar. GUILLEMEAU in art. obstetr. cap. de partu cæsar. MAURICEAU libr. de eadem arte Tom. II. cap. 32.*

(n) *Libr. cit. eod. cap.*

difficilior est, & nonnunquam non nisi probabiliter cognosci potest. Si hic nihil impediat, quo minus manus in uterum deferri, aut forceps applicari possit, pro ratione situs, infans aut pedibus aut capite, manu vel forcipe prehendendus atque educendus erit. Si vero integer foetus extra uterum delapsus fuerit, quod imprimis ex tumore abdominis mutato & exploratione cognoscimus, aliud remedium, sive matrem, sive foetum, sive utrumque servare velimus, non superpetit quam sectio caesarea. Uterus enim onere suo liberatus statim se contrahit, omnem viam ad ventrem occludit, foetus exstinguitur, computrescit gangraena matricem foedat, nec mater cum cruore effuso, matrice & foetu corruptis vivere potest. Neque enim hic causa est, cur a rarioribus naturæ beneficiis utpote exsiccatione vel induratione, aliquid exspectemus.

§. XI.

Denique sectionem caesaream postulant conceptus extra matricem facti, uti in tuba fallopiana, in ovario, in ventre (o). Saepe hoc sub casu dubium est, tum de graviditate, tum de partus tempore iudicium, quum quaedam graviditatis signa adsint, etsi haut mutatum orificium uteri maneat. Nisi igitur ex certissimo infantis motu, a perito facile dignoscendo: aut ipso membrorum foetus per integumenta tactu, ejusmodi conceptum adesse cognoverimus, nihil temere moliendum est, praesertim quum nonnulli, inpr. rariores morbi, nominatim hydrops ovarii, (p) aliæve hydropis saccati species

(o) *Historias collegit* MANGETUS *in theatro anatomico* T. II. p. 149. seq. VIEUSSEN. *in dissert. de structura & usu uteri.* STRAUSSII *Historia foetus Mussipontani.* SAVIARD. *Observ. chirurg.* 60. Ill. PHIL. ADOLPH. BOEHMERI *Observationum anatomicarum rariorum fasciculus; notabilia circa uterum humanum continens.* Hale 1752. fol.

(p) *Confer. Just. Theodor. SCHORKOPE dissert. de hydrop. ovarii*

cies hunc casum mentiri possint. Si vero palam fuerit, foetum maturum adesse, crudele foret, ei exitum per incisionem exterioris ventris negare, praesertim quum id jam non ita periculosum matri sit, quam si simul uterus quoque incidendus est. Etsi enim foetum membranis suis inclusum indurescere, vitamque matris cum infante intus remanente persistere posse, multorum exemplorum documentis constiterit; attamen non sine maximo valetudinis detrimento, sublataque futuræ prolis spe, in ventre circumgestari potest. Accidere etiam potest, ut infans licet in duratus, perruptis velamentis in ventrem effundatur, quo casu haut dubie inducta corruptione mortem etiam matri creaturus esset. Quod quum utique semper metuendum est, non minus ad hoc cavendum, quam vivum servandum fructum, & maternæ valetudinis noxas avertendas, profecto præstabit, incisionem corporis hic minus periculosam instituere, quam ob dubiam superstitis, attamen miseræ vitæ matris spem, eandem omittere. Licet contrarium videatur defendere SIMONIUS, in *Memoires de l'Academie Royale de Chirurgie* T. II. pag. 324. seq.

§ XII.

Enumeratis iis partus præternaturalis speciebus in quibus sectio cæsarea instituenda est, ad eas transire liceat, ubi necessitas exigit, ut foetui vis inferatur. Ex his præcipua est paragonphosis capitis, sive ea ejus inter pelvis ossa incuneatio, ut quasi impactum & interceptum hæreat. Causæ ad pelvim vitiosam, caput nimis magnum, hydrocephalum, capitis iniquum situm redeunt.

§ XIII.

Maligna est hæc partus species, quum ab initio ne conjectura quidem mali eventus adsit. Venter in nonnullis citius, in nonnullis serius subsidet, orificium uteri diducitur, detergitur, vesica cum capite

varii muliebris. Adami BRENDII dissert. de hydrope ovariorum muliebrium.

capite prominet, omnia felicem successum pollicentur, & nihilominus caput inter validissimos labores subsistit. Accedunt symptomata matri periculossima, ut genitalium tumor, inflammatio: pulsus fit celer debilis: respiratio anhela, spastica sonora: deliria obrepunt: sudores frigidi, particulares, miliiformes, circa superiora & extrema oriuntur: accedunt tremores convulsorii, singultus: abdomen tympanitico modo inflatur, & inter hæc mors obrepit. Neque pro pro foetu, si vivus fuerit, felicior eventus sperari potest, qui plerumque ob caput ultra modum compressum, & sanguinem in ventriculos cerebri sæpius effusum, apoplectico modo moritur (q).

§. XIV.

Si caput nimis magnum, vel pelvis vitiosa, angustior, (r) incuneationem hanc producant, & dolores vel vehementissimi capiti eo usque comprimendo non sufficiant, ut apertura superiori minor fiat, (s) a natura nihil expectandum esse apparet. Nisi igitur artis auxilium, quod in imminuenda capitis mole consistit, accedat, inter irrita partus conamina, tum mater, tum fœtus certissime morientur. Cum vero sub ipsum partum valde difficile determinatum sit, an naturæ artisve vires comprimendo in arctius volumen capiti pares sint, magna circumspeditione opus est, ne inquieta festinatione fœtui præter necessitatem vim inferamus. Consultius igitur erit, antequam ad extrema progrediamur, parienti horæ unius vel alterius moram concedere, & interea venæsectionem spasmos multum lavaturam instituere, genitalibus cataplasmata emollientia imponere, quin in ipsam vaginam & rectum intestinum decocta emollientia injicere, & pro circumstantiarum conditione lene anodynum præbere. Si hæc omnia, inter expectatum naturæ auxilium, & irritam forcipis

(q) Cf. ROEDERER *observ. med. de suffocatis saturo* §. 13. & 14.

(r) *vid. Element. art. obstetr. ROEDERERI* §. 395. seq.

(s) *in eod. libro.* §. 406.

pis applicationem nihil profecerint, puerpera ultra biduum triduumve jam laboraverit, & symptomata (§. præcedenti) descripta, jam adfuerint, ne momentum quidem perdendum est, quin ad aperiendum caput foetus, verosimile tunc mortui, procedatur, & cerebrum eximatur, ut tum caput forcipe prehendi & extrahi possit (t).

§. XV.

Si vero capitis moles a natura vel arte superari potest, partus plerumque inter cautiones §. præcedenti descriptas, manuum auxiliatricum opera & forcipis applicatione absolvi poterit, (u) cujus in casu peiori nullus usus fuerat; quum in tantis angustiis inter caput & parietes vaginæ introduci non possit (x).

§. XVI.

Si capitis nimia moles ob hydrocephalum, ex tumore molli cognoscendum, incuneationem hanc effecerit, & dolores viguerint, nonnunquam hic partus naturæ committi potest, cum in tanta ossium mollitie, facilior capitis acuminatio & compressio expectari possit. Si vero neque naturæ vires, neque forcipis pressio aliquid effecerint, signaque (§. 13.) descripta adsint, ad capitis imminutionem confugiendum est (v).

§. XVII.

Et si vero pelvis & foetus caput optimam servant proportionem, nonnunquam tamen fit, ut ex situ capitis iniquo, cum variis etiam uteri obliqui speciebus conjuncto, vera paragomphosis oriatur, (z) veluti

(t) *Conf. ROEDERER in libro citat. §. 414. seq.*

(u) *in libro cit. §. 412.*

(x) *in libro cit. §. 416. γ).*

(v) *libr. citat. §. 410.*

(z) *Conf. Præcep. in libr. cit. cap. 17. sect. 2 & 3.*

veluti si facies alterutrum os ischii respiciat, si eadem in genitalibus prævia sit, si vertex alterutri ossi ilium occurrat, & quæ sunt reliqua. Quod si hujus modi casus inciderint, jamque sub initium partus operator advenerit; facilior medela erit, & pro diversitate situs iniqui, vel caput ossi alicubi inhærens solvere, vel versionem instituire, vel forcipem applicare poterit. Si vero jam longum a primis doloribus intervallum intercesserit, caput pelvi impactum loco moveri non possit, neque manus in uterum deferri queat, & forcipis applicatio vel plane non succedat, vel nihil efficiat, inter limites (§. 13.) descriptos caput imminuendum erit (a).

§. XVIII.

Alia est partus præternaturalis species, quæ ob os sacrum & coccygis nimis ad anteriora urgens, (b) nonnunquam idem auxilii genus postulat. In hac enim etsi apertura superior pelvis bene conformata sit, & capiti liberio rem transitum concedat, ad inferiorem tamen aperturam immobile subsistit. Si depressio ossis coccygis, omniaque artificia pro dilatando externo adhibita (c), spatium tam amplum reddere non possint, ut caput educi queat, in perforatorio, sub limitibus (§. 13.) descriptis, unica spes est.

§. XIX.

Si sub his partus speciebus convulsiones matrem prehenderint, remediaque causis cognitis opposita, nihil proficerint; eo minus dubitandum erit, quin per capitis imminutionem partus absolvatur, (d) quum satis constet, parturientem convulsionibus non cessantibus, certo in mortem esse ruituram, nisi infans quantocyus excutiat.

§. XX.

(a) *loc. cit.*

(b) *libr. cit. §. 494.*

(c) *ibid. §. 492. seq.*

(d) *libr. cit. §. 699. seq.*

§. XX.

Si foetu pedibus educto, vel ob nimiam vim sub extractione adhibitam, vel ob putredinem, caput a corpore avulsum in genitalibus remanserit, molesta plerumque ejus excussio est: Quin si tanta ejus moles fuerit, ut omnia artificia, pro extrahendo capite adhibenda eludat, perforatorium adhibendum (e) cerebroque effuso caput extrahendum erit.

§. XXI.

Fœtus monstrosi variæ species e. c. bicipitis, bicorporei cæt., propter nimiam molem partum reddere solent difficillimum, quin ita impeditum, ut omnino totus einbryo prodire nequeat (f). Quandoque igitur ejusmodi monstrum adesse cognoverimus, necesse erit, ut violentis tractetur manibus & instrumentis, quibus vel cavitates majores aperiantur, quo corpus comprimi queat, vel membra quædam præcidantur; sive vivat adhuc monstrum, mater autem in mortis periculo versetur, sive mortuum sit.

§. XXII.

Abdominis fœtus hydrops (g), vel quicquid sit tumoris (h) pariter obstaculo esse potest, quo minus in lucem edi queat. Ab initio quidem, si caput in partu prævium fuerit, dubium est, utrum obstaculum humeris inique sitis vel brachiis dorso decursatim incumbentibus, (i) an ab impedimento quodam in abdomine repetendum sit. Quamprimum vero brachia soluta sunt, causa manu in uterum demissa facile detegitur. Sæpe quidem tale tumoris obstaculum neque tantum neque ita pertinax est, quin agitata corpusculi mole, aqua eatenus dissipari possit, quatenus ad transmittendum fœtum

(e) *libr. cit. p. 315. seq.*

(f) *Vid. Præcept. Elementa art. obstet. § 558.*

(g) *Conf. Acta Edinburg. T. 5. No. 37. p. m. 359. ubi fœtus ad ilia usque exclusus, ob tumorem cysticum ex corpore ortum ulterius extrahi non potuit.*

(i) *ibid. §. 553.*

foetus sufficit. At si contigerit, ut moles aquae major sit, quam quae dissipari possit; non poterit abstineri, quin foetus vis inferatur, & intrusso ferramento triquetro v. g. cannulato (Trois quarts) majori, aqua educatur.

§. XXIII.

Si foetus in transversum situs sit, & brachium alterutrum propendeat, versio ut plurimum institui, & partus foetu pedibus extracto absolvi potest. Nonnunquam tamen id plane impossibile redditur, si videlicet omnis liquoris amnii copia jam dudum effluxerit, humerusque adeo in pelvim intrusus, & ab orificio uteri constrictus teneatur, ut ne digitus quidem, multo minus manus, in uterum penetrare possit (k). Si hoc in casu per medicamenta eo pervenire non liceat, ut strictura uteri laxetur, pedesque prehendi possint; inter obrepentia ista symptomata, (§. 13.) unice in violenta brachii solutione & dissectione foetus auxilium quaerendum erit (l).

§. XXIV.

Quaestio moveri possit, annon in his partus praeternaturalis speciebus sectio caesarea preferenda sit? In paragonphosi capitis locum habere non videtur, quum ab initio omnia ut in partu naturali fiant, & caput nimis magnum vel pelvim vitiosam adesse, dignosci non possit; postea vero a partus doloribus caput ita incuneatum sit, ut, licet foetus servandi gratia sectio caesarea institueretur, infans tamen, ob summam violentiam, quae capiti per ventrem extrahendo impendi deberet, una cum matre conficeretur: quale exemplum in VATERI Dissert. de partu caesareo occurrit, ubi sectione in matrem mortua instituta, foetus adeo incuneatus fuit, ut caput non nisi uncis applicatis per ventrem extrahi potuerit.

§. XXV.

Si propter hydrocephalum infantis, & inde natam nimiam capitis molem, partus fieri plane nequeat, pariter minus consultum videtur, ad caesaream sectionem confugere, quo sic foetus vivus protraha-

(k) Cf. von HOORNII *Siphra & Pua in Praef. Præcept. Elem.* pag. 299.

(l) *vid. loca citata.*

trahatur. Satis enim constat, infantes ejusmodi hydrocephalo affectos, etiam si lucem vivi aspexerint, tamen neque a morbo suo sanari posse, & tantum non semper brevi intervallo vitæ scenam iterum claudere. Quum vero hysterotomia periculosa sit plenum opus alex, pro vita & valetudine matris, minus decebit, parientem in tantum conjicere discrimen, quo foetus morbosus in vitam, brevi iterum amittendam, evocetur: sed hunc potius æquum erit violentius tractare, quo per ordinariam viam ejici, materque liberari queat.

§. XXVI.

Porro quæri potest, num eo in casu, ubi os sacrum cum osse coccygis nimis ad anteriora vergit, hysterotomiam celebrare expediat? Si aliquo in casu certe in hoc locum habere videtur sectio cæsarea. Cum enim pelvis apertura superior recte se habeat, & impedimentum non nisi in inferiori existat, neque caput incuneatum sit; maxima spes est fore, ut infans vivus ac vegetus ex aperto ventre protrahatur. Si itaque foetus vitæ certa fuerint indicia, nulla mala signa adsint, & mater cum proximis adfentiat, sine mora sectioni se accingere oportebit, antequam puerpera longioribus laboribus nimium affligatur: quo sic & infans servetur, nec mater in gravius discrimen veniat.

§. XXVII.

Ob monstrosam foetum, qui per naturalem viam vivus educi nequit, operationem hysterotomiae facere, in ea quidem sententia non convenit. Præterquam enim, quod ejusmodi monstra ut plurimum vita parum durabili gaudent, accedit etiam hoc, quod si forte spiritum trahere perseverent, tamen & sibiinet ipsis & reliquis mortalibus molestias & ægritudines creant, parum autem, non dicam nihil commodi societati hominum præstare valent. Quia propter nollem in eorum gratiam ventrem uterumque matris referare, atque hanc, difficili dubiaque chirurgia in vitæ aut valetudinis periculum conjicere. Matris enim vita & valetudo certa vel saltem probabilis, sine dubio potiore loco habenda est, quam incerta vel adeo ne verisimilis quidem vita monstri. Quamobrem *Roonhuijsium* recte redarguit *Heisterus* (m) partum cæsareum etiam pro monstro suadentem.

§. XXVIII.

(m) *Instit. Chirurg. Major. P. II. sect. 5. cap. 113. §. 16.*

§. XXVIII.

Si foetum hydrops ascites prehenderit, impediatque, quo minus in lucem edi possit, neminem credo fore, qui sectionem abdominis instituere suadeat, cum infans, sive capite sive pedibus præviis, jam ad abdomen usque exclusus sit, antequam hoc impedimentum dignosci possit; idque mali a putredine potissimum mortui foetus oriatur (n).

§. XXIX.

Ob brachium prævium & incuneatum sectionem cæsaream instituere, mea quidem sententia valde anceps est. Cum enim non nisi longo ab initiis partus intervallo hæc incuneatio oriatur; præterquam quod foetus probabiliter mortuus est, matris etiam vires longis pariendi laboribus dejectæ, huic operationi non sufficient. Præstat igitur sectionem foetus matris sectioni præferre.

§. XXX.

Ex iis quæ adhuc disputata sunt liquet, nostris temporibus, ubi ars obstetricia magis exulta est, & leniora auxiliorum genera inventa sunt, non quidem necesse esse, ut sectio cæsarea (o) vel embryotomia (p) tam sæpe instituatur quam veteres fecerunt, & inter recentiores Clarissimo *Mittelhäuser* (q) usu venit. Attamen nonnunquam incidere posse casus, ubi vel mater parturiens servari nequeat, nisi foetu violenter tractato, vel uterque pereat necesse sit, nisi infans per apertum parientis ventrem educatur.

(n) *Field. OULD. Treat. of Midwifry. P. III. p. 183.*

(o) *Hoc utique ex collata hujus operationis frequentia superioris & nostri ævi ultro liquet. Conferantur autores supra laudati.*

(p) *Perlegenda sunt scripta veterum & cum usu moderno comparanda, ad convincendos nos de ista veritate. Exempli loco Hippocrates sit, quem plerique secuti sunt. Sectionem foetus describit in Lib. de exsectione foetus & morb. muliebr. L. I. n. 96.*

(q) *Practische Abhandlung. von Accouchiren. Leipz. 1754.*





INDEX.

A.

Abdominis pressiones in partu difficili nil iuuant pag. 520.
§. XXV.

Alantois quid pag. 84. §. XVIII. in homine certa fide detegi nequit pag. 442. II.

Anastomosis vera nulla est inter vasa uteri & placentæ pag. 108. & seqq.

Aqua in submersis os naresque sua sponte non intrat pag. 333. 340. & seqq.

Arteriarum umbilicalium origo pag. 87. §. XXIII. directio pag. 454. §. XX.

Artesia quid pag. 364.

Artis obstetriciæ antiquioribus temporibus facies pag. 5. 494. §. IV. V. ejus cognitio medico non indigna est pag. 9. celeberrimi viri hanc artem calluerunt ibid. commendata iam ab antiquis pag. 10. ejus merita in medicinam legalem pag. 11.

Axis pelvis mathematicè computata pag. 20. confectaria inde derivata pag. 22. & seqq. per ani centrum transit pag. 25. ratio pag. 26. ejus cognitio quid faciat ad usum practicum ibid.

B.

Balneorum ad partum facilitandum, præcipue ad versionem præstandam usus pag. 515. §. XXI.

C.

Capitis incuneationis gradus pag. 200. §. II. & seqq.

Capitis magni in partu symptomata pag. 202. §. V.

Caput ludens pag. 50. §. XIX. 408. §. XLIV. parvum, ejus incommoda

I N D E X.

- moda pag. 8. praemagnum auulsum in utero pag. 541. §. XX.
solito mollius quid significet p. 153. nro. 4.
Circuli sanguinis post respirationem mutatio pag. 454. §. XIX.
Conceptio in quam fieri possit pag. 382. §. XVII. a quonam ter-
mino vulgo aestimetur pag. 32.
Conceptionis signa pag. 392. §. XXVII. XXIX. pag. 400. §. XXV.
a) exploratione desumta pag. 404. §. XL. qualia sint pag. 408.
§. XLIX. b) ab incremento uteri pag. 405. §. XLI. qualia sint p. 408.
§. XLV. c) a motu embryonis p. 406. §. XLII. a conceptione phœ-
nomena quædam p. 395. §. XXX. XXXVIII. symptomata a conce-
ptione morbosa p. 397. §. XXX. p. 399. §. XXXIV. ante tertium
menssem certissimum signum non datur pag. 407. §. XLIII.
Conceptionis tempus, quodnam sit opportunius pag. 391. §. XXVI.
Conceptus spurii pag. 413. §. L.
Concussiones ab Hippocrate laudatæ, malæ pag. 519. §. XXIV.
Cotyledones in animalibus pag. 77. §. VIII.

D.

- Depositionum morbosarum causa pag. 250. §. III. earum effectus
ibid. §. IV. in utero ab ejus violenta læsione siue a morbo, qua-
lis indolis sint pag. 251. §. VI.
Differentia motus embryonis a motibus aliis abdominalibus p. 427.
§. XIII.
Discrimen inter obstetricantem eruditum & obstetricem pag. 13. 14.
Dolorum sedatio multum facit ad versionem pag. 517. §. XXII.
Ductus arteriosus Botalli pag. 185. §. XXI. pro peculiari ductu non
est habendus ibid. ratio, cur in aliis concreascit, in aliis non ibid.

E.

- Embryonis incrementi notio generalis pag. 73. §. II.
Embryonis ante debitum tempus exclusi vita fere vegetabilis est
pag. 73. §. II. 441. §. I.

Expe-

I N D E X.

Experimentum an a morte aqua pulmones ventriculumque subeat
pag. 332.

F.

Fasciæ pro versione facienda usus pag. 518. §. XXIII.

Fluor albus uterinus conceptionem impedit pag. 389. vaginalis *ibid.*
in omni ætate adesse potest *ibid.* quando conceptionem hic im-
pediat *ibid.*

Fœcunditas utriusque coniugis ad conceptionem requiritur pag. 390.

Fœminæ eunuchæ pag. 361. §. III.

Fœtus perfecti signa pag. 74. §. III.

Fœtus differentia ab adulto pag. 87. §. XXIV. 88. §. XXV. XXVI.
in utero deglutire nequit pag. 330. nro. VII. mortuus in utero
non putrescit pag. 429. §. XV. ratio pag. 430. §. XVI. mollis par-
tum lentiorein facit pag. 152. nro. I. eliso gutture in partu suf-
focatus pag. 292. in partu denati casus pag. 296. mortuus num
faciat ad partum pag. 418. §. IV. veterum de hac re opinio *ibid.*
§. V. illorum extractationis modus pag. 419. 420. not. d. no-
strorum præ veterum artificiis laus pag. 423. §. VI.

Fœtum suffocari posse liquore amnii pag. 320. nro. II. quomodo
id contingere possit pag. 321.

Fœtus in partu difficili ob compressum cranium mortuus cum se-
ctione cadaveris pag. 323. & seqq. ob pressum funem mortuus
pag. 345. ex presso in angusta pelvis apertura superiore, capite
obliquo mortui pag. 347. ex presso in angusta pelvi capite mor-
tuus pag. 348. ex adpresso pelvi capite mortuus pag. 351. mon-
strosus, quomodo educendus pag. 541. §. XXI.

Fœtus exitus quomodo parari, matrisque mors averti possit a) si
via naturalis amplior reddi potest pag. 472. §. V. b) si viam na-
turalem plane superare non licet pag. 473. §. VI.

Fœtum in partu suffocatorum mirabile phænomenon p. 298. seqq.
a mucro suffocatorum observationes pag. 314. seqq.

I N D E X.

Fons pulsatilis pag. 100.

Foramen ouale pag. 85. §. XX. ejus usus ibid. aperitur sub diastole pag. 101. in adultis apertum pag. 287. seqq. an in submersis aqua aperiatur, utrum claudatur pag. 285.

Forcipis commoda & incommoda pag. 201. §. IV. applicatio in quo casu utilis est pag. 203. §. VI. VII.

Fracturæ sensus in partu quid significet pag. 226.

Funiculus umbilicalis pag. 83. §. XVI. ejus insertio in placentam qualis pag. 84. XVII. cur adeo longus sit ibid. ejus insertio in abdomen pag. 103. ejus circa collum infantis contorsio non adeo periculosa est pag. 312. ejus ligatura ex parte matris supervacua est pag. 446. §. VII. neque absolute necessaria ex parte foetus pag. 454. seqq. non ligatus percussus cur non multum sanguinis effundere possit pag. 455. §. XX. seqq. ejus ligatura omissa non semper infanticidii accusat pag. 462. §. XXVIII. seqq.

H.

Hæmorrhagiæ uteri post partum symptomata pag. 147.

Herniæ congenitæ umbilici descriptio pag. 101.

Hippocratis nomen in arte obstetricia nil valet pag. 10.

Hydropis ovarii observatio pag. 275. membranarum foetum cingentium rara observatio pag. 81. §. XIV. effusi liquoris intra membranas & placentam observatio pag. 82. §. XV.

I.

Impedimenta genitalium, quæ sine magno periculo removeri possunt, non requirunt sectionem cæsaream pag. 534. §. VII.

Incrementum extremitatum inferiorum et genitalium infantis nati cur adeo insigne pag. 455. §. XX.

Incuneatio capitis quando contingat p. 538. §. XIV.

Inflammationis uteri signa pag. 214. quomodo in scirrhum abeat pag. 251. §. VII.

Litho.

INDEX.

L.

Lithopedia pag. 403. §. XVI.

Liquor amnii pag. 79. §. XII. 99. ejus usus ibid. num ad nutritio-
nem foetus faciat pag. 80. §. XIII. cuneum quasi constituit in
partu p. 8. ejus nimis matura effusio vitiosum obstaculum indicat
p. 186. experimenta circa illum instituta p. 99.

Lumborum incurvationis ratio p. 25.

M.

Mammarum post conceptionem mutatio pag. 403. §. XXXVIII. seq.

Manus cujusdam deformis descriptio p. 104.

Matris dispositio phthifica partum non retardat pag. 41. ejus cum
intus retento foetu quibus conditionibus vita durare possit, qui-
bus non pag. 471. §. IV.

Maxillæ inferioris lapsus in recens natis, quale signum pag. 309.
nro. VI.

Meconium non oritur a liquore amnii pag. 305. nro. X. sed potius
a bile pag. 330. nro. VI. in partu profluens ut signum malum
pag. 171. 307. nro. I. 304. huius profluxus causa pag. 173.

Medicamenta partum pellentia inania sunt pag. 181.

Membranæ foetum cingentes pag. 75. §. IV. 443. §. III. illarum de-
scriptio pag. 76. §. VI. seqq.

Menstruationis tempus pag. 380. §. XVI. in nonnullis inature inci-
dit pag. 381. g). praemature ibid. (h). finis pag. 383. §. XVIII.

Menstrua nimis copiosa in quibus observentur pag. 388. §. XXII.
quid inde sequatur ibid. cessantium incommoda pag. 384. quo-
modo se habeant in foeminis rusticis pag. 388. §. XXI.

Morbi graviditatis speciem æmulantes, quales pag. 409. §. XLVI.

a) menstrua retenta pag. 409 §. XLVII. seqq. eorum discrimen
a graviditate p. 410. §. XLVI. b) hydrops & tympania pag. 411.
§. XLVIII. quomodo discernatur a graviditate pag. 412. §. XLIX.

Morborum matris in infantes propagatio, quomodo fiat pag. 113.

I N D E X.

- Mors ex nimiiis partus doloribus quomodo contingat** pag. 476.
 §. IX. quomodo his occurrendum sit *ibid.* §. X. ex partu diu protracto pag. 477. §. XI. foetu intus mortuo pag. 478. §. XII. quomodo tunc mors contingat & quæ sint remedia pag. 478.
 §. XIII. si quid, quod in partu excerni debuisset in utero remanet pag. 479. §. XIV. præsertim placenta, quomodo tunc succurrendum pag. 480. §. XV. ubi substantia uteri dilaceratur pag. 481.
 §. XVI. si puerpera ipsa pariendi laborem supprimit pag. 482.
 §. XVII. quænam remedia hic locum habere possint pag. 483.
 §. XVII. mors ex violationibus genitalium gravioribus pag. 484.
 §. XIX. in quibus remediis tunc spes quædam supersit pag. 485.
 §. XX. mors a foetus perverso situ pag. 485. §. XXI. si funesti morbi tempore partus accidunt pag. 486. §. XXII.
- Mors puerperarum in partu plerumque culpa hominum contingit, raro ex necessitate naturæ** pag. 487. §. XXIV.
- Mortis causæ generales** pag. 467. §. I. speciatim parientium *ibid.* & seqq.
- Motus embryonis primus ad tempus in graviditate æstimandum fallax est** p. 47. 406. §. XLII. cur primis mensibus vel nullus vel vix perceptibilis sit & cur dein evadant validiores p. 406. §. XLII. primis mensibus non dat signum vitæ pag. 426. §. XII. quomodo optime percipi queat pag. 427. §. XIV.
- Motus embryonis deficiens tempore effusi liquoris amnii non semper mortem portendit** pag. 186.
- Mucus in ore faucibusque infantum unde?** p. 219. nro. I.
- Musculi abdominales faciunt ad partum** pag. 8.

N.

Nævi, non omnes sunt tales a plebeiis pro iis habiti pag. 118. sæpe a plebeia phantasia cum rebus quibusdam comparantur *ibid.* finguntur quoque ob fraudem *ibid.* sic dicti nævi post partum sæpe demum oriuntur pag. 127.

Nævo-

I N D E X.

Nævorum maternorum in infantibus origo non est a sanguine matris pag. 113. neque ex metastasi ibid. neque ex animi adfectu pag. 115. neque a desiderio vehementi pag. 121. illorum causæ referri possunt vel ad momentum conceptionis vel ad iam formati embryonis vicissitudines pag. 123. 124. 126.

Nervorum commercium inter uterum & placentam nullum est pag. 112.

O.

Obstetricans eruditus optime uterum præ ceteris cognoscere potest, ut & orificii uteri conditionem & mutationem pag. 6. 7.

Orificii uteri conditio a congressu pag. 397. §. XXXII. veterum de hac re opinio pag. 396. §. XXXII.

P.

Partus historia generalis pag. 8. 418. §. III. naturalis terminus cur non sit semper idem pag. 32. serotini num dentur? pag. 40. sunt casus rariores ibid. ut pluriuum lentiores & difficiliores sunt pag. 41. ejusmodi casus sectione cæsarea absoluendus ibid. immaturus non difficilior maturo est pag. 43. huius signa pag. 44.

Partus difficilis ex prolapso capite cum extrema manu pag. 133. medela ibid. ex prolapso brachio sinistro pag. 134. medela ibid. ex prolapsis manu sinistra, pede dextro & facie pag. 136. medela ibid. ex prolapsu brachii p. 138. medela per dissectionem ibid. ex prolapso brachio cum fune conduplicato corpore factus pag. 145. ob pelvim angustiam & uterum obliquum pag. 153. ob humeros latos pag. 161. medela ibid. ob occiput ex obliquo utero prolapsum pag. 163. medela per versionem pag. 165. ex prolapsa facie pag. 169. medela per vectem pag. 170. ex prolapsa facie pag. 172. medela per forcipem ibid. ex duplici per funem colli strictura pag. 174. ex fune collum stringente, angustissimo sinu, capite magno & male sito pag. 177. medela pag. 180. ex propendente fune, capite amplo & oblique sito pag. 183. mede.

I N D E X.

- medela per perforatorium & forcipem pag. 185. ex fune collum stringente pag. 187. medela pag. 188. ob faciem præuiam pag. 191. medela ibid. ob caput incuneatum pag. 189. operatio pag. 190. ob peluim depressam, caput obliquum, funem collo circumpositum pag. 209. medela pag. 210. ob capitis parum obliqui molem pag. 214. medela pag. 215. ob caput magnum, obliquum, inique situm, pelvim angustam & humeros male locatos pag. 217. medela pag. 218. cum prolapsu cervicis uteri pag. 229. medela p. 230. causa huius prolapsus pag. 231. lentus propter foetus mortem pag. 150. propter orificium uteri collum embryonis stringens pag. 167. ob capitis molem pag. 206. medela pag. 207. facilis, infecuta hæmorrhagia uteri lethali pag. 146.
- Partus si absolvi nequit propter paragomphosin pag. 474. §. VII. quomodo tunc succurrendum pag. 475. §. VIII.
- Partus foemini non adeo metuendus est pag. 491 §. I. II. unde metus iste ortus p. 493. §. III.
- Perforatorium quando indicatur pag. 204. §. VIII. p. 538. §. XIV. 539. §. XVI. XVII. 540. §. XVIII.
- Phthisis non oritur a penuria succi nutritii, sed errore loci pag. 41. phthificæ matris proles cur tam frequenter torosa pag. 42. casus aliquot ibid.
- Placenta pag. 75. §. V. 441. §. I. ejus usus pag. 443. §. IV. fere duplex adsumi potest pag. 76. nexus cum utero qualis pag. 111. 447. §. VIII. ejus solutio quomodo fiat a natura pag. 9.
- Pulmonum in foetu ratio pag. 86. §. XXII. in aqua subsidentia quale signum pag. 301.
- Pulsus quid pag. 453. §. XVIII. si cessavit in funiculo umbilicali ligatura non opus est pag. 461. §. XXVII.
- Puris natura gelatinosa pag. 241. ejus effectus & origo ibid. & seqq.

R.

- Respiratio prima quomodo fit pag. 301. non fit ab æere in pulmones irruente pag. 302. 309. nro. IV. IX, seqq. respirationis impedimenta

I N D E X.

ta p. 311. num foetus capite natus vel adhuc in vagina respiret p. 313.
Reclinatio parturientium partum non promovet p. 521.

S.

Sanguinis missio in partu lentiore bona p. 181. copiosi ex utero effusi sequela p. 246. nro. 3. venosi e venis umbilicalibus iter in foetum p. 84. §. XIX. ab aere color p. 354.

Sanitas in quo consistat p. 249. §. I.

Scirrhi uterini causæ p. 252. §. VIII. signa p. 253. §. IX. seqq. diagnosis a graviditate p. 258. §. XIII. prognosis p. 259. §. XVI. cura p. 260. §. XVII. observatio anatomica p. 262. §. XVIII. sanati observatio p. 267. §. XX.

Sectio cæsarea quando indicatur p. 204. §. IX. 485. §. XX. 532. §. V. & seqq. non institui debet in paragonphosi p. 542. §. XXIV. neque in hydrocephalo ibid. §. XXV. neque ob foetum monstruosum p. 543. §. XXVII. neque in hydrope foetus ascite a. 554. §. XXVIII. neque ob brachium prævium & incuneatum ibid. §. XXIX.

Sectionis cæsareæ vel ferramentorum adplicationis contraindiantia p. 475. §. VIII.

Sectio infantis ut plurimum supervacua est p. 497. §. VI. valde periculosa p. 498. §. VI. 501. §. X. 522. §. XXVI. 523. §. XXVII. quando tamen indicatur pag. 525. §. XXVIII. 537. §. XII. 541. §. XXI. XXII. 542. §. XXIII.

Signa foetus durante partu in utero mortui p. 174. funis circa foetum voluti p. 176. uteri obliqui p. 186. gangrænæ uteri p. 190. 192. 195. 246. nro. 4. foetus ante partum mortui p. 303. nro. VIII. graviditatis in quibus casibus scienda p. 358. foetus vivi aut mortui sunt dubia p. 424. §. VIII. graviditatis a) a motu desumpta p. 427. §. XIV. b) ab expanso sensim abdomine p. 430. §. XVII. c) ex mammis p. 431. §. XVIII. mortui apud veteres p. 428. §. XV. vivi aut mortui in partu p. 433. §. XX. seqq.

Situs infantis an per omnem graviditatem sit idem p. 49. §. XVII. qualis

))((

I N D E X.

- qualis ut plurimum p. 74. §. III. ultimo graviditatis tempore capite ad os uteri non a doloribus est p. 61. §. XXIII.
- Spiritus retentio facit ad partum pag. 8.
- Sterilitas stricte sic dicta quid pag. 359. §. I. ex quibus causis oriatur pag. 360. §. II. seqq.
- Stridor ossiculorum cranii in partu quid significet p. 175. 436. §. XXV.
- Submersorum sive pota aqua sectio p. 337. 338. cum pota aqua sectiones p. 340. 341. eorum mors p. 339. nro. 3.
- Suspensi qua morte moriantur p. 290. seqq.

T.

- Tempus motus infantis varium esse demonstrant Tab. 34. & seqq.
- Terminus partus maturi est noni mensis finis p. 39. animationis foetus quando incipiat p. 424. §. IX. vitalitatis quando incipiat ibid. p. X.
- Tremor frigusque ut signa subsequantium dolorum ad partum p. 143.
- Tumor & sugillatio in capite foetus violentiam matris non denotant p. 303. nro. VIII.

U.

- Ulcus uteri & reliquorum pelvis viscerum p. 235. ulcerosa circa uterum receptacula p. 236. ulcus enorme abdominis & uteri a gravidæ percussione p. 238. renibus circumfusa & a partu exasperata p. 243.
- Urachus revera est canalis p. 89. §. XXVII. eius usus ignoratur p. 91. §. XXXI. 442. §. II. descriptio p. 90. §. XXVIII. 442. §. II. in brutis ibid.
- Uteri post partum status p. 9. segmentum quomodo in exploratione a capite dignosci queat p. 50. §. XVIII. uteri & capitis in graviditate mutationum tabulæ p. 52. §. XX. ex illis deductæ conclusiones p. 59. §. XXI. seqq. uteri sani signa p. 143. uterus gravidus cur antrorsum protensus p. 25. seqq.

Vagina

INDEX

V.

- Vagina cur extra axin pelvis locetur p. 26.
- Vasa uteri & placenta non sunt anastomosibus iuncta p. 78. §. X. seqq. p. 79. 444. §. VI. 446. §. VII. umbilicalia in homine quot p. 83. §. XVI. 441. §. I. in brutis quot p. 84. §. XVII. facillime ex interna quasi mutatione coalescunt p. 456. §. XXII.
- Vectis in quibus casibus uti illo liceat p. 506. §. XIV. non semper sufficit ad deprimendum caput p. 181.
- Versio quid p. 504. §. XII. præstantissimum & primarium in partu difficili adnuncium p. 499. §. VIII. felicissimum p. 500. IX. quomodo optime instituitur p. 505. §. XIII. in quibus casibus p. 506. a) capite inique sito ibid. §. XIV. b) in hydrocephalo p. 507. §. XIV. c) manu, cubito vel toto brachio prolapso p. 507. §. XV. d) foetu transversim sito p. 510. §. XVI. e) flexis genibus procumbente infante p. 511. §. XVII. f) clunibus præviis p. 512. §. XVIII. ejus adminicula quænam p. 514. §. XX. 1) balnea, unctiones, fomentationes p. 515. §. XX. XXI. quando necessaria ib. & p. 516. 2) dolorum sedatio p. 517. §. XXII. quæ ad hunc scopum faciunt ibid. 3) fascia p. 518. §. XXIII.
- Veterum de sede spermatis muliebris opinio p. 393. §. XXVIII.
- Viragines quænam sint p. 385. §. XX. a conceptione exceptæ ibid. menstrua non patiuntur ibid. ratio p. 387. §. XXI.



ERRA.

ERRATA.

<i>pag.</i>	<i>lin.</i>	<i>loco.</i>	<i>lege.</i>
34	1	MECICA	MEDICA.
73	10	distinquendum	distinquendum
80	penult.	tumpuntur	rumpuntur
82	13	extremisatibus	extremitatibus
85	6	transi	transire
108	3	dissertationes	dissertationis
ibid.	11	therebinthinæ	terebinthinæ
109	15	therebint inæ	terebinthinæ
ibid.	21	demonstratam	demonstratum
110	11	ia	in
ibid.	22	infumpunt	infundunt
ibid.	25	remosos	remotos
ibid.	26	therebinthinæ	terebinthinæ
ibid.	27	placentæ	placenta
ibid.	28	arteriorum	arteriarum
ibid.	-	perficiens	perficiens
ibid.	29	massulus	massulas
ibid.	-	inuterum	in uterum
112	30	In	Id
ibid.	31	principiorom	principiorum
124	24	embryones	embryonis
126	20	floreaut	floreant.
128	5	oleas	aleas
135	18	lateant	lateant.
140	23	ffexum	flexum
147	ult.	aiis	aliis
157	6	Tenujus	Tenuius
159	ult.	n orbo	morbo
163	7	humcros	humeros
172	3	nyctimeron	nychthemeron
174	2	nyctimeron	nychthemeron
181	2	abdomen	abdomen
187	23	corolla	corona
188	16	elebantur	elabantur
192	4	humani	humano
200	12	nyctimeron	nychthemeron
213	11	tenujus	tenuius
237	3	deficit	deficit
ibid.	7	fere	fere

<i>pag.</i>	<i>lin.</i>	<i>loco.</i>	<i>leg.</i>
238	7	syntomate	symptomate
243	17	tentum	lentum
263	4	coalcrunt	coaluerunt
264	1	Cellulorum	Cellularum
286	16	propingua	propinqua
303	19	aequae	æque
306	26	medulæ	medullæ
312	9	his	bis
329	7	sensum	sensim
330	6	sensum	sensim
334	3	certam	certum
341	12	factæ	factæ
349	27	reliquisque	reliquisque
352	11	jejuvi	ieiuni
ibid.	16	Stromanum	S romanum
ibid.	18	tagit	tangit
367	23	pedisseque	pedisseque
376	27	angustarum	angustarum
388	12	pathematibus	pathematibus
ibid.	25	ab imprægnatione diisse	imprægnatione rediisse.
394	6	post verbum <i>liquoris</i> adde: remaneat: de quo argumen- to recte iudicat	
402	3	post verbum <i>ingenium</i> adde: &	
410	9	menstruæ	menstrua
ibid.	17	eiusdam	cuiusdam
412	18	ferum	ferum
418	17	propullaque	propulsaque
ibid.	20	insolitam	insolitam
ibid.	23	refragari	refragari
419	9	ferro	ferro
ibid.	—	post verbum <i>munitas</i> deleatur:	
ibid.	12	fucussu	successu
420	4	sensum	sensim
ibid.	—	exemit	exemitis
ibid.	11	phatmoco	pharmaco
ibid.	26	manibus	manibus
ibid.	27	declinis	declinis
421	12	fœni grævi	fœni græci
ibid.	20	protrurfos	protrufos
ibid.	22	coxas	coxas
ibid.	23	alciores	altiores

((((((

ibid.

<i>pag.</i>	<i>lin.</i>	<i>loco.</i>	<i>lege.</i>
ibid.	24	bi	hi
ibid.	25	alteriores	altiores
ibid.	26	retrursus	retrusus
421	31	Quicumque	Quicumque
ibid.	--	focus	fœtus
422	8	desidere	desidere
ibid.	13	scapellum	scalpellum
423	4	venesectione	venasectione
ibid.	22	vesrito	vertito
ibid.	23	Scapellum	Scalpellum
424	11	Doctore;	Doctores
428	28	inter verb. <i>pituita & alba</i>	deleatur a.
429	17	ipfa	ipfa
430	1	tenuior	tenuior
ibid.	19	g-aviditatis	graviditatis
432	16	examinare	examinare
434	21	exurgit	exurgit
ibid.	23	dubibemus	dubitemus
435	10	post verb. <i>Neque</i>	deleatur cum
ibid.	16	intelligere	intelligere
436	ult.	putor	putor
437	4	hæres	hæret
ibid.	6	fœtusque	fœtusque
444	9	deficientem	deficientem
447	10	subtilissimum	subtilissimum
450	16	potissimum	potissimum
451	8	proscriptum sit	proscriptum sit
ibid.	19	negocium	negotium
452	20	superare	superare
455	15	masculos	musculos
456	21	pulsus	pulsus
457	15	volude	volupe
459	7	Iale	tale
467	10	syncopa	syncope
ibid.	19	apopoplexia	apoplexia
468	9	quæ	quo
470	11	utrum	uterum
471	9	spacium	spatium
473	18	deleatur per	
482	penult.	exoptantus	exoptandus
483	6	femora	femora

<i>pag.</i>	<i>in.</i>	<i>loco.</i>	<i>pag.</i>
ibid.	8	horarum	horarum
ibid.	9	tantum	tantum
484	5	pacatis	pacatis
486	13	æstu	æstu
ibid.	25	Physico-Medidorum	Physico-Medicarum
493	9	observatione	observatione
494	16	Satis	fatis
495	penult.	veteras	veteres
ibid.	--	multas	multos
496	13	scriptis	scriptis
497	22	Nummam	Nummam
500	1	Luciana	Lucina
ibid.	2	ferat	ferat
ibid.	12	ruunt	ruant
ibid.	17	quipem	quidem
ibid.	23	attendo	attento
501	2	dominatione	denominatione
ibid.	18	deleatur: <i>neque sinistrum euentum</i>	
ibid.	23	fiquidem	fiquidem
502	9	laborantes	laborantes
ibid.	12	lanitate	laniate
503	19	adducandis	adducendis
505	11	manui	manui
506	10	coxigis	coecygis
509	20	braccium	brachium
515	2	finem	finem
516	26	saluti	soluti
519	ult.	pueruli	pueruli
522	16	hacce	hæcce
523	10	es	esse
525	1	ponteratione	ponderatione
529	9	puerpera	puerpera
532	14	fætu	fætu
536	17	haut	haud
537	10	haut	haud
538	22	lauaturam	levaturam
541	10	Quandocunque	Quando.

* * *

152

